



אלגברה לינארית 2 א

מערכי שיעור

תשע"ב

נערך על ידי

דן הרן

עדכון אחרון: 15.5.2012

אלגברה לינארית 2 כוללת בדרך כלל את החלקים הבאים:

- (א) פירוק של פולינומים מעל שדות (פרקים 1-3).
- (ב) לכסון של מטריצות והצגה אלכסונית של העתקות לינאריות (פרקים 4, 6).
- (ג) צורות קנוניות של מטריצות ושל העתקות (פרקים 7 - 9).
- (ד) מרחבי מכפלה פנימית (פרק 10).
- (ה) העתקות לינאריות במרחבי מכפלה פנימית ולכסון אוניטרי (פרק 11).
- (ו) תבניות בילינאריות ומשפט סילבסטר (פרק 12).
- (ז) שניוניות (פרק 13).

למרות השמות השונים, כל הנושאים האלה קשורים ברעיון מרכזי אחד אותו ננסה להסביר כעת.

יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית. אם \mathcal{B} בסיס של V , אז ל- T מתאימה מטריצה $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$. תכונות רבות של T נוכל לחשב מתוך המטריצה הזאת. אך המטריצה תלויה בבחירת הבסיס. לכן אם נבחר בסיס טוב, נקבל מטריצה פשוטה יחסית שקל לעשות חישובים אתה, למשל, מטריצה אלכסונית.

חלק ב' מתעסק בדיוק בשאלה מתי ואיך ניתן לעשות זאת ואיזו מטריצה אלכסונית תתקבל.

חלק ג' עונה בעצם על השאלה, מה קורה באופן כללי, כאשר לא בהכרח אפשר לקבל מטריצה אלכסונית. נראה שיש משפחה מסוימת של מטריצות (צורות קנוניות) שאפשר, על ידי בחירת בסיס מתאים, להגיע לאחת ורק אחת (במובן מסוים) מהן. ברצוני להודות לפרופ' אשר בן-ארצי על תרומתו לפישוט חלק זה.

חלק ד' אינו בדיוק שייך לכאן מבחינה רעיונית (ולפעמים הוא נלמד בחלקו באלגברה לינארית 1); הוא הכנה לחלק הבא. בחלק זה נרחיב את המושג של מרחב וקטורי באשר נוספים אליו מושגים כמו אורך הוקטור וניצבות של וקטורים, כפי שהם מוכרים לנו מן הגיאומטריה.

כעת נוכל לשאול לאיזה מטריצה $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ נוכל להגיע אם נדרוש שהבסיס \mathcal{B} מורכב מוקטורים בעלי אורך 1 ניצבים זה לזה. בזה עוסק חלק ה'.

חלקים ו', ז', אינם עוסקים בהעתקות לינאריות, אלא בעצמים אלגבריים או גיאומטריים שגם אותם אפשר לייצג על ידי מטריצות, והמטריצה תלויה בבחירת בסיס. שוב נשאל לאיזו מטריצה נוכל להגיע ועד כמה מטריצה זו יחידה. במיוחד בחלק ז' נענה על השאלה, מהי הצורה הגיאומטרית המיוצגת במישור או במרחב התלת ממדי על ידי משואה ממעלה 2.

אך חלקים ב', ג' תלויים בידע טכני על פירוק פולינומים מעל שדות, ולכן נפתח את הלימוד בחלק א', שלכאורה אינו שייך לאלגברה לינארית. (למען הסר ספק, גם חומר זה הינו למבחן...)

כאמור, הקורס יתנהל לפי חוברת זו. מלבדה אין ספר אשר מתאים במדויק לקורס, אך יש ספרים רבים שמתאימים לחלקים שונים של הקורס:

● ש. עמיצור, *אלגברה א'*, אקדמון. מכיל את רוב החומר, אך בסימונים מיוחדים לספר זה (בהרכבת העתקות הראשונה שפועלת היא השמאלית, וכו').

● *אלגברה לינארית* של האוניברסיטה הפתוחה.

חוברות אלו הן ברמה קצת נמוכה יותר ממה שנדרש לנו, אך הן קריאות מאד ומתאימות ללימוד עצמי.

● Hoffman, Kunze, *Linear Algebra*, Prentice Hall, 2nd edition, 1971

ספר קלאסי בנושא, רוב הספרים האחרים מבוססים במידה זו או אחרת עליו. לא קל לקריאה.

● פרנק איירס, *המטריצות*, סדרת שאום, Frank Ayres, *Matrices*, Schaum Series,

● סיימור ליפשיץ, *אלגברה לינארית*, סדרת שאום. Seymour Lipschuts, *Linear Algebra*, Schaum

Series.

שני הספרים האלה מכילים הרבה תרגילים (פתורים). החומר התיאורטי מאורגן בנספחים ובתרגילים. יצאו

בהוצאות אחדות. לצערי, בהוצאות מסוימות יש פתרונות שגויים לתרגילים.

בפרק זה אנו מתחילים ללמוד על פולינומים. אוסף כל הפולינומים מעל שדה מסוים הוא מבנה אלגברי שנקרא חוג. טענות מסוימות על פולינומים אפשר להכליל לחוגים או לחוגים עם תכונות מסוימות. לכן נלמד קצת על חוגים באופן כללי.

הגדרה 1.1: חוג (ring) הנו קבוצה R , עליה מוגדרות שתי פעולות: חיבור (+) וכפל (\cdot או ללא סמון), אשר מקימים את החוקים הבאים:

- (0ח) קשירות החיבור: לכל $a, b \in R$ קיים $c \in R$ יחיד כך ש- $a + b = c$.
- (1ח) כלל הצירוף לחיבור: $(a + b) + c = a + (b + c)$ לכל $a, b, c \in R$.
- (2ח) כלל החילוף של החיבור: $a + b = b + a$ לכל $a, b \in R$.
- (3ח) קיום איבר אפס: קיים איבר יחיד ב- R המסומן ב- 0 והמקיים $a + 0 = a$ לכל $a \in R$.
- (4ח) קיום איבר נגדי: לכל $a \in R$ קיים איבר יחיד $-a \in R$ כך ש- $a + (-a) = 0$.
- (0כ) קשירות הכפל: לכל $a, b \in R$ קיים $c \in R$ יחיד כך ש- $ab = c$.
- (1כ) כלל הצירוף לכפל: $(ab)c = a(bc)$ לכל $a, b, c \in R$.
- (2כ) כללי פילוג: $a(b + c) = ab + ac$ ו- $(a + b)c = ac + bc$ לכל $a, b, c \in R$.

הגדרה 1.2:

- (א) חוג R ייקרא חוג עם יחידה אם יש בו איבר 1 המקיים $a1 = a = a1$ לכל $a \in R$.
- (ב) חוג R ייקרא חילופי אם $ab = ba$ לכל $a, b \in R$.
- (ג) חוג חילופי עם יחידה שונה מאפס ייקרא תחום שלמות אם לכל $a, b \in R$ שונים מ- 0 מתקיים $ab \neq 0$.

דוגמאות 1.3: (א) \mathbb{Z} הוא תחום שלמות.

(ב) $2\mathbb{Z}$ (=קבוצת המספרים הזוגיים) הוא חוג חילופי ללא יחידה.

(ג) כל שדה הוא תחום שלמות. בפרט \mathbb{Q} (שדה המספרים הרציונליים), \mathbb{R} (שדה המספרים הממשיים), \mathbb{C} (שדה

המספרים המרוכבים) ו- \mathbb{F}_p (השדה בעל p איברים, כאשר p ראשוני) הם חוגי שלמות.

(ד) עבור כל מספר טבעי n , $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ הוא חוג חילופי עם יחידה. זהו שדה אם ורק אם n הנו מספר ראשוני.

(ה) יהי R חוג (לאו דוקא חילופי). חוג הפולינומים מעל R מסומן ב- $R[X]$ ומוגדר כקבוצת כל הבטויים הפורמליים

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$$

שבהם שיכים ה- a_i ל- R וכמעט כולם (=פרט למספר סופי) שווים לאפס. חיבור וכפל מוגדרים על ידי

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i\right) + \left(\sum_{i=0}^{\infty} b_i X^i\right) &= \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) X^i \\ \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i\right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j X^j\right) &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{i+j=k} a_i b_j X^k \end{aligned}$$

איבר האפס של $R[X]$ הוא $\sum_{i=0}^{\infty} 0X^i$.

נהוג להזניח $+0X^i$ מהסכומים האינסופיים ולרשום את הפולינומים כסכומים סופיים: $\sum_{i=0}^n a_i X^i$. כמו כן נהוג לכתוב X במקום X^1 , ו- $a_0 X^0$ במקום a_0 . אם יש ב- R יחידה, נהוג לכתוב X^i במקום $1X^i$. הדבר עלול לכאורה לגרום לבלבול, כי, למשל, לביטוי $X + X^2$ שתי משמעויות: האחת: סכום ב- $R[X]$ של הפולינומים X ו- X^2 , והשנייה: הפולינום $0X^0 + 1X^1 + 1X^2 + 0X^3 + \dots$. באופן דומה aX אפשר להבין כפולינום $0X^0 + aX^1 + 0X^2 + \dots$ או כמכפלה של הפולינומים a ו- X ; שוב, שני הביטויים שווים.

האיברים a_i נקראים **מקדמי הפולינום**. אם $a_n \neq 0$, המקדם a_n של $\sum_{i=0}^n a_i X^i$ נקרא **המקדם העליון**. אם $a_n = 1$ אומרים **שהפולינום מתוקן**. שים לב שהפולינום $X = 0X^0 + 1X^1 + 0X^2 + 0X^3 + \dots$ מתחלף בכפל עם כל איברי $R[X]$. את איברי $R[X]$ נהוג לסמן על ידי אותיות לטיניות קטנות, למשל f , או גם על ידי $f(X)$, אם רוצים להדגיש את התלות של f ב- X .

המעלה $\deg(f)$ של פולינום $f = \sum_{i=1}^n a_i X^i$ מוגדרת כך: $\deg(f) = \max\{i \mid a_i \neq 0\}$, אם $f \neq 0$, ואילו $\deg 0 = -\infty$. המעלה מקימת את הכללים הבאים (הוכחתם מושארת כתרגיל):

$$\deg(f + g) \leq \max(\deg(f), \deg(g)) \quad (1)$$

(2) $\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g)$. יתר על כן, אם R הוא תחום שלמות, מתקים שוויון ולכן גם $R[X]$ הוא תחום שלמות.

(ו) אם R חוג (לא בהכרח חילופי!), יהי $M_n(R)$ **חוג המטריצות מסדר $n \times n$ מעל R** , עם החיבור: $(A + B)_{ij} = (A)_{ij} + (B)_{ij}$ והכפל: $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n (A)_{ik}(B)_{kj}$, לכל $1 \leq i, j \leq n$. (כאן $(A)_{ij}$ מסמן את הרכיב ה- (i, j) של A ב- R). בדרך כלל $M_n(R)$ איננו חילופי, אפילו אם R חילופי. אם R חוג עם יחידה, גם $M_n(R)$ חוג עם יחידה; היחידה בו היא

$$I = I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

בפרט אפשר להתבונן בחוג המטריצות $M_n(R[X])$ מעל חוג הפולינומים $R[X]$. הרכיבים של כל מטריצה כזו הם פולינומים עם מקדמים ב- R .

באופן דומה אפשר להתבונן בחוג $M_n(R)[X]$. איברי חוג זה הם פולינומים שמקדמיהם מטריצות.

(ז) יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . נסמן ב $L_F(V)$ את קבוצת כל ההעתקות הלינאריות $T: V \rightarrow V$ (הנקראות גם אנדומורפיזמים של V). קבוצה זו מהווה חוג ביחס לחיבור, ולכפל המוגדר כהרכבה של העתקות, $(TS)(v) = T(S(v))$. לחוג זה יש יחידה (העתקת הזהות של V) שנסמנה ב- 1 או ב- 1_V , אם רוצים לצין את V . אם $\dim(V) \geq 2$ אז $L_F(V)$ אינו חילופי. גם כאן אנו יכולים לבנות את החוג $L_F(V)[X]$ של פולינומים ב- X שמקדמיהם העתקות לינאריות מ- V ל- V . ■

הגדרה 1.4: הומומורפיזם. יהיו R ו- S שני חוגים. העתקה $\varphi: R \rightarrow S$ תקרא הומומורפיזם אם היא שומרת על החיבור ועל הכפל. כלומר $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ ו- $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. בפרט מקבלים ש- $\varphi(0) = 0$ ו- $\varphi(-a) = -\varphi(a)$. אם R ו- S הם חוגים עם יחידה, נניח תמיד ש- $\varphi(1) = 1$. הומומורפיזם חד חד ערכי ועל ייקרא איזומורפיזם.

דוגמה 1.5: (א) יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי n מעל שדה F ויהי \mathcal{B} בסיסו. ההעתקה $L_F(V) \rightarrow M_n(F)$ אשר מתאימה להעתקה לינארית $T: V \rightarrow V$ את המטריצה שלה $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ ביחס לבסיס \mathcal{B} , היא איזומורפיזם של חוגים. (זה נלמד באלגברה לינארית 1, גם אם לא הוגדרו שם חוגים.)

(ב) יהי R חוג עם יחידה ויהי $\alpha \in R$. אם $f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i \in R[X]$, נגדיר $f(\alpha) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \alpha^i$ (באשר $\alpha^0 = 1$). בכך הגדרנו העתקת ההצבה $\varphi: R[X] \rightarrow R$ על ידי $\varphi(f) = f(\alpha)$. האם הומומורפיזם?

טענה 1.6: יהי R חוג עם יחידה, יהי $\alpha \in R$ ותהי $\varphi: R[X] \rightarrow R$ ההצבה $f \mapsto f(\alpha)$. יהיו $f, g \in R[X]$.

$$\varphi(f+g) = \varphi(f) + \varphi(g) \quad (1)$$

$$\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g) \quad (2)$$

$$\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g) \quad (3)$$

$$f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i, g = \sum_{i=0}^{\infty} b_i X^i \in R[X] \text{ נניח}$$

(1)

$$\begin{aligned} \varphi(f+g) &= \varphi\left(\sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) X^i\right) = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) \alpha^i = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \alpha^i + \sum_{i=0}^{\infty} b_i \alpha^i \\ &= f(\alpha) + g(\alpha) = \varphi(f) + \varphi(g) \end{aligned}$$

(בעיקר) בגלל חוק הפילוג ב- R .

(2)

$$\begin{aligned} \varphi(fg) &= \varphi\left(\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j X^j\right)\right) = \varphi\left(\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) X^k\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) \alpha^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \alpha^k\right) \end{aligned}$$

ואילו

$$\varphi(f)\varphi(g) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \alpha^i\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j \alpha^j\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=k} a_i \alpha^i b_j \alpha^j\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \alpha^k\right)$$

■ (3) נובע מ-(2). נשים לב ש- $\varphi(1) = 1$.

דוגמה 1.7: יהי R חוג לא חילופי עם יחידה. יש $\alpha, a \in R$ כך ש- $a\alpha \neq \alpha a$. אז

$$\varphi(X \cdot a) = \varphi(aX) = a\alpha \neq \alpha a = \varphi(X)\varphi(a)$$

■ כלומר, במקרה זה φ אינה שומרת כפל ובפרט איננה הומומורפיזם.

עוד דוגמה להומומורפיזם (קצת מסובכת, אך נחוצה בהמשך):

טענה 1.8: יהי R חוג נגדי $M_n(R[X]) \rightarrow M_n(R[X])$ על ידי φ :

$$\left(\varphi\left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu}\right)\right)_{ij} = \sum_{\mu=0}^{\infty} (A_{\mu})_{ij} X^{\mu}$$

לכל $1 \leq i, j \leq n$. אז φ איזומומורפיזם חוגים.

כך, למשל, אם $R = \mathbb{Z}$ ו- $n = 2$,

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X^2\right) = \begin{pmatrix} 2+7X & 1+X^2 \\ -3+X & X \end{pmatrix}$$

הוכחה:

(i) φ חח"ע: אכן, אם

$$\varphi\left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu}\right) = \varphi\left(\sum_{\mu=0}^{\infty} B_{\mu} X^{\mu}\right)$$

$$\sum_{\mu=0}^{\infty} (A_{\mu})_{ij} X^{\mu} = \sum_{\mu=0}^{\infty} (B_{\mu})_{ij} X^{\mu}$$

לכל i, j מכאן לכל μ

$$.i, j \quad \text{לכל} \quad (A_{\mu})_{ij} = (B_{\mu})_{ij}$$

כלומר לכל μ מתקיים $A_{\mu} = B_{\mu}$. ובפרט

$$\cdot \sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu} = \sum_{\mu=0}^{\infty} B_{\mu} X^{\mu}$$

(ii) φ על: אכן, תהי $C \in M_n(R[X])$ ויהי $C = c_{ij}^{(0)} + c_{ij}^{(1)} X + \dots$. זהו איבר של $R[X]$, לכל $1 \leq i, j \leq n$. נגדיר, לכל $0 \leq \mu < \infty$, $A_{\mu} \in M_n(R)$ על ידי $(A_{\mu})_{ij} = c_{ij}^{(\mu)}$, לכל $1 \leq i, j \leq n$. אם μ גדול מספיק, אז $c_{ij}^{(\mu)} = 0$ לכל $1 \leq i, j \leq n$, ולכן $A_{\mu} = 0$. ומכאן ש- $\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu}$ ואיבר של $M_n(R)[X]$ מתקיים

$$\left(\varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu} \right) \right)_{ij} = \sum_{\mu=0}^{\infty} c_{ij}^{(\mu)} X^{\mu} = (C)_{ij}$$

ומכאן $\varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu} \right) = C$

(iii) φ שומרת חיבור: אם $\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu}, \sum_{\mu=0}^{\infty} B_{\mu} X^{\mu} \in M_n(R[X])$ אז

$$\begin{aligned} \left(\varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu} + \sum_{\mu=0}^{\infty} B_{\mu} X^{\mu} \right) \right)_{ij} &= \left(\varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} (A_{\mu} + B_{\mu}) X^{\mu} \right) \right)_{ij} = \sum_{\mu=0}^{\infty} (A_{\mu} + B_{\mu})_{ij} X^{\mu} \\ &= \sum_{\mu=0}^{\infty} ((A_{\mu})_{ij} + (B_{\mu})_{ij}) X^{\mu} = \sum_{\mu=0}^{\infty} (A_{\mu})_{ij} X^{\mu} + \sum_{\mu=0}^{\infty} (B_{\mu})_{ij} X^{\mu} \\ &= \left(\varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu} \right) \right)_{ij} + \left(\varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} B_{\mu} X^{\mu} \right) \right)_{ij} = \left(\varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu} \right) + \varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} B_{\mu} X^{\mu} \right) \right)_{ij} \end{aligned}$$

לכל i, j ולכן

$$\varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu} + \sum_{\mu=0}^{\infty} B_{\mu} X^{\mu} \right) = \varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu} \right) + \varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} B_{\mu} X^{\mu} \right)$$

אז $\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu}X^{\mu}, \sum_{\nu=0}^{\infty} B_{\nu}X^{\nu} \in M_n(R[X])$ שומר כפל: אם φ (iv)

$$\begin{aligned} \varphi\left(\left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu}X^{\mu}\right)\left(\sum_{\nu=0}^{\infty} B_{\nu}X^{\nu}\right)\right) &=^{(1)} \varphi\left(\sum_{\mu=0}^{\infty} \sum_{\nu=0}^{\infty} A_{\mu}B_{\nu}X^{\mu+\nu}\right) \\ &=^{(2)} \sum_{\mu=0}^{\infty} \sum_{\nu=0}^{\infty} \varphi(A_{\mu}B_{\nu}X^{\mu+\nu}) \\ \varphi\left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu}X^{\mu}\right)\varphi\left(\sum_{\nu=0}^{\infty} B_{\nu}X^{\nu}\right) &=^{(2)} \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} \varphi(A_{\mu}X^{\mu})\right)\left(\sum_{\nu=0}^{\infty} \varphi(B_{\nu}X^{\nu})\right) \\ &=^{(1)} \sum_{\mu=0}^{\infty} \sum_{\nu=0}^{\infty} \varphi(A_{\mu}X^{\mu})\varphi(B_{\nu}X^{\nu}) \end{aligned}$$

[(1) בגלל חוק הפילוג; (2) - בגלל ש- φ שומר חיבור] ולכן די להוכיח, לכל $\mu, \nu \geq 0$ כי

$$\varphi(A_{\mu}B_{\nu}X^{\mu+\nu}) = \varphi(A_{\mu}X^{\mu})\varphi(B_{\nu}X^{\nu})$$

לשם פשטות נכתוב A במקום A_{μ} ו- B במקום B_{ν} . נראה את המשוואה האחרונה:

$$\begin{aligned} (\varphi(AX^{\mu})\varphi(BX^{\nu}))_{ij} &= \sum_{k=1}^n (\varphi(AX^{\mu}))_{ik} (\varphi(BX^{\nu}))_{kj} = \sum_{k=1}^n (A)_{ik} X^{\mu} (B)_{kj} X^{\nu} = \\ \sum_{k=1}^n (A)_{ik} (B)_{kj} X^{\mu+\nu} &= \left(\sum_{k=1}^n (A)_{ik} (B)_{kj}\right) X^{\mu+\nu} = (AB)_{ij} X^{\mu+\nu} = (\varphi(ABX^{\mu+\nu}))_{ij} \end{aligned}$$

■ לבסוף נשים לב שאם יש יחידה $1 \in R$, אז $\varphi(1) = 1$.

הגדרה 1.9: תת חוג. תת קבוצה S של חוג R תכונה תת חוג אם היא מכילה את איבר האפס, סגורה תחת חיבור, לקיחת איבר נגדי וכפל. במקרה זה מהוה S חוג ביחס לחיבור והכפל המושרים מ- R .

דגמאות 1.10: (א) \mathbb{Z} הוא תת חוג של \mathbb{Q} .

(ב) $2\mathbb{Z}$ הוא תת חוג של \mathbb{Z} שאינו מכיל את איבר היחידה.

(ג) אם R חוג, אז $S = \{a_0 + 0X + 0X^2 + \dots \mid a_0 \in R\}$ הוא תת חוג של $R[X]$. ברור שההעקקה

$a_0 \mapsto a_0 + 0X + 0X^2 + \dots$ היא איזומורפיזם $R \rightarrow S$. אנו נזהה את S עם R ונאמר כי R תת חוג של $R[X]$.

(ד) אם R חוג, אז $\left\{ \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in R \right\}$ הוא תת חוג של $M_n(R)$. שוב, הוא איזומורפי ל- R , על ידי

$$\alpha \mapsto \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix}. M_n(R)$$

(ה) אם R הוא חוג חילופי עם יחידה R מטריצה, אזי

$$R[A] = \{a_0 I_n + a_1 A + a_2 A^2 + \dots \mid 0 \text{ כמעט כולם}, a_i \in R\}$$

הוא תת חוג של $M_n(R)$. אין לבלבל את $R[A]$ עם חוג הפולינומים מעל R , כי A אינו משתנה. הואיל וחזקות שונות של A מתחלפות זו עם זו בכפל, $R[A]$ הנו חוג חילופי.

משפט 1.11: יהי R תחום שלמות. אז קיים שדה כך ש- R תת חוג של שדה זה. בפרט אם F שדה, אז $F[X]$ תחום שלמות ולכן תת חוג של איזשהו שדה.

הוכחה: (הוכחה זו לא טובא בהרצאה וניתנת כאן רק לשם השלמת התמונה.)

נגדיר יחס שקילות על אסף הזוגות $\{(a, b) \in R^2 \mid b \neq 0\}$:

$$(a, b) \sim (a', b') \iff ab' = a'b$$

נסמן את מחלקת השקילות של (a, b) ב- $\frac{a}{b}$. נסמן את אסף כל מחלקות השקילות ב- $\text{Quot}(R)$. נגדיר חיבור וכפל על $\text{Quot}(R)$ בדרך הרגילה:

$$\frac{a}{b} + \frac{a'}{b'} = \frac{ab' + a'b}{bb'} \qquad \frac{a}{b} \cdot \frac{a'}{b'} = \frac{aa'}{bb'}$$

הגדרות אלו אינם תלויות במיצגים והופכות את $\text{Quot}(R)$ לשדה. שדה זה נקרא **שדה המנות** של R . ההעסקה $a \mapsto \frac{a}{1}$ היא הומומורפיזם חד-חד ערכי של R לתוך $\text{Quot}(R)$. נזהה את a עם $\frac{a}{1}$ כדי לראות את R כתת חוג של $\text{Quot}(R)$. אם L הוא שדה כלשהו המקיף את R אזי L מקיף גם את $\text{Quot}(R)$. במלים אחרות, $\text{Quot}(R)$ הנו השדה הקטן ביותר המקיף את R .

בפרט שדה המנות של \mathbb{Z} הוא \mathbb{Q} . עבור שדה כלשהו F , שדה המנות של $F[X]$ הוא **שדה הפונקציות**

הרציונליות מעל F :

$$\blacksquare \quad F(X) = \left\{ \frac{f(X)}{g(X)} \mid f, g \in F[X], g \neq 0 \right\}$$

הגדרה 2.1: יהי R חוג עם יחידה, ויהי $a \in R$. איבר $b \in R$ יקרא הופכי של a אם

$$ab = 1 = ba$$

■ יקרא הפיך אם יש לו הופכי. נסמן ב- R^\times את קבוצת האיברים ההפיכים של R .

הערה 2.2: אם ל- a יש הופכי אז הוא יחיד (ואז הוא יסומן a^{-1}). אכן, אם $b, c \in R$ מקיימים $ab = 1 = ba$,

■ $ac = 1 = ca$ אז $b = b1 = b(ac) = (ba)c = 1c = c$.

תרגיל 2.3: יהי R חוג עם יחידה ויהיו $f, g \in R[X]$ שונים מאפס. אם המקדם העליון של g הפיך ב- R , אז $\deg fg = \deg f + \deg g$.

משפט 2.4 (חילוק עם שארית): יהי R חוג עם יחידה ויהיו $f, g \in R[X]$,

$$g = b_m X^m + \dots + b_1 X + b_0, \quad b_m \in R^\times$$

אז

(א) קיימים $q, r \in R[X]$ יחידים כך ש-

$$f = gq + r, \quad \deg r < \deg g = m$$

(ב) קיימים $q', r' \in R[X]$ יחידים כך ש-

$$f = q'g + r', \quad \deg r' < \deg g = m$$

הוכחה של (א): קיום. באינדוקציה על $\deg f$. אם $\deg f < m$ (ובפרט אם $f = 0$), ניקח $r = f$, $q = 0$. נניח כעת כי $\deg f = n \geq m$, נאמר,

$$f = a_n X^n + \dots + a_0, \quad a_n \neq 0$$

וטענת הקיום נכונה לכל הפולינומים ממעלה $n > m$. אז

$$f = g \cdot (b_m^{-1} a_n X^{n-m}) + f_1$$

$$\begin{aligned} f_1 &= f - g \cdot (b_m^{-1} a_n X^{n-m}) = a_n X^n + \dots + a_0 - (b_m X^m + \dots + b_0)(b_m^{-1} a_n X^{n-m}) \\ &= a_n X^n + \dots + a_0 - (a_n X^n + \dots + b_0 b_m^{-1} a_n X^{n-m}) \\ &= (a_n - a_n) X^n + (a_{n-1} - b_{m-1} b_m^{-1} a_n) X^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

ומכאן $\deg f_1 < n$. לכן לפי הנחת האינדוקציה יש $q_1, r \in R[X]$ כך ש-

$$f_1 = gq_1 + r, \quad \deg r < m$$

נסמן $q = b_m^{-1} a_n X^{n-m} + q_1$. אז $f = g \cdot (b_m^{-1} a_n X^{n-m}) + gq_1 + r = gq + r$ יחידות. נניח כי בנוסף ל- q, r יש גם $q_0, r_0 \in R[X]$ כך ש-

$$f = gq_0 + r_0, \quad \deg r_0 < \deg g = m$$

אז

$$g(q - q_0) = r_0 - r$$

אם $q = q_0$ אז מכאן נובע שגם $r = r_0$. אילו היה $q - q_0 \neq 0$, אז לפי התרגיל

$$\deg g \leq \deg g + \deg(q - q_0) = \deg g \cdot (q - q_0) = \deg r - r_0 \leq \max(\deg r_0, \deg r) < \deg g$$

■ סתירה. לכן $q = q_0$.

2.5: יהי R חוג עם יחידה, יהי $\alpha \in R$ ויהי $f \in R[X]$. אז $f(\alpha) = 0$ אם ורק אם קיים $q \in R[X]$ כך

$$f = q(X) \cdot (X - \alpha) \text{ ש-}$$

הוכחה: לפי משפט 2.4(ב), עם $g = X - \alpha$, יש $q', r' \in R[X]$ יחידים כך ש-

$$f = q'(X) \cdot (X - \alpha) + r', \quad \deg r' < \deg(X - \alpha) = 1$$

כעת $\deg r' \leq 0$ פירושו ש- $r' \in R$ (ולכן $r'(\alpha) = r'$ כמובן). נציב α בשני האגפים של המשוואה

$$f(\alpha) = q'(\alpha) \cdot (\alpha - \alpha) + r' = r' \text{ ונקבל } f = q'(X) \cdot (X - \alpha) + r'$$

בכפל עם מקדמי $X - \alpha$, הם $-\alpha, 1$, ולכן לפי טענה 1.6(2) ההצבה שומרת כפלי! מכאן

$$f = q'(X) \cdot (X - \alpha) + f(\alpha) \quad (1)$$

כעת, אם $f(\alpha) = 0$, אז (1) היא ההצגה המבוקשת.

להיפך, אם יש $q \in R[X]$ כך ש- $f = q(X) \cdot (X - \alpha)$, אז מהיחידות בחילוק עם שארית נובע $q' = q$

■ וגם $f(\alpha) = 0$.

הגדרה 2.6: יהי R חוג קומוטטיבי ויהיו $a, b \in R$. נאמר ש" a מחלק b ב" R ", ונסמן $a|b$, אם יש $c \in R$ כן ש" $b = ac$ ". ■

מסקנה 2.7: יהי F שדה, יהי $\alpha \in F$ ויהי $f \in F[X]$. אזי: α שורש של f אם ורק אם $(X - \alpha) | f$ ב" $F[X]$.

משפט 2.8: יהי F שדה ויהי $f \in F[X]$ ממעלה n . אז ל- f לכל היותר n שרשים שונים ב" F .

הוכחה: באינדוקציה על n . אם $n = 0$ אז $f \in F^\times$ ומתקיים $f(\alpha) = f \neq 0$ לכל $\alpha \in F$, כלומר ל- f אין שורש ב" F . נניח $n > 0$.

נניח כי הטענה נכונה לכל פולינום ממעלה $n - 1$. אם ל- f אין שורש ב" F , אז סיימנו. אם יש לו שורש $\alpha \in F$ אז לפי המסקנה לעיל $f = (X - \alpha)g$, באשר $g \in F[X]$. לפי תרגיל 2.3, g ממעלה $n - 1$. לפי הנחת האינדוקציה יש ל- g לכל היותר $n - 1$ שרשים שונים ב" F . קל לראות ששרשי f הם בדיוק שרשי g ו- α , לכן ל- f לכל היותר n שרשים שונים ב" F . ■

מסקנה 2.9: יהי F שדה, יהי $f \in F[X]$ ממעלה $n \geq 0$, ויהי $c \in F^\times$ המקדם העליון שלו. נניח כי ל- f יש n שרשים שונים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ב" F . אזי

$$f = c(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$$

הוכחה: יהי

$$g := c(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n) \in F[X]$$

ברור ש- g פולינום ממעלה n , עם מקדם עליון c . לכן $f - g \in F[X]$ ממעלה $\geq n - 1$. אולם $(f - g)(\alpha_i) = f(\alpha_i) - g(\alpha_i) = 0$ לכל $1 \leq i \leq n$, כלומר לפולינום $f - g$ לפחות n שרשים שונים ב" F . לפי המשפט זה יתכן רק אם $f - g = 0$, כלומר $f = g$. ■

הגדרה 2.10: פולינום ממעלה ראשונה נקרא **פולינום לינארי**. ■

הגדרה 2.11: שדה F נקרא **סגור אלגברית** אם לכל $f \in F[X]$ ממעלה $0 < n$ יש שורש (לפחות אחד) ב" F . ■

דוגמה 2.12: \mathbb{C} סגור אלגברית. (ללא הוכחה! "המשפט היסודי של אלגברה".)

\mathbb{Q}, \mathbb{R} אינם סגורים אלגברית: ל- $X^2 + 1$ אין שורש בהם.

משפט 2.13: (ללא הוכחה) לכל שדה F קיים שדה סגור אלגברית כך ש- F הוא שדה חלקי שלו.

משפט 2.14: יהי F שדה סגור אלגברית ויהי $f \in F[X]$ ממעלה $n \geq 0$. אזי קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ (לאו דווקא שונים זה מזה) וקיים $c \in F^\times$ כך ש-

$$f = c(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$$

הוכחה: באינדוקציה על n . אם $n = 0$ אז $f = c \in F^\times$ מהצורה המבוקשת. נניח $n > 0$ ונניח נכונות לכל פולינום ממעלה $n - 1$. ל- f יש שורש $\alpha_n \in F$ (כי F סגור אלגברית). לכן $(X - \alpha_n) \mid f$ ב- $F[X]$, כלומר, יש $g \in F[X]$ כך ש-

$$f = (X - \alpha_n)g$$

ברור ש- g ממעלה $n - 1$, ולכן לפי הנחת האינדוקציה יש $c \in F^\times, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in F$ כך ש-

$$g = c(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_{n-1})$$

$$\blacksquare \quad f = c(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_{n-1})(X - \alpha_n)$$

הגדרה 3.1: יהי חוג עם יחידה. קבוצה $I \subseteq R$ נקראת **אידיאל** של R אם

(א) $0 \in I$;

(ב) אם $a, b \in I$ אז גם $a + b \in I$.

(ג) אם $a \in I$ ו- $r \in R$ אז $ra, ar \in I$. ■

שים לב: אם $a \in I$ אז $-a = (-1)a \in I$.

דוגמאות 3.2:

(1) אם R חוג קומוטטיבי עם יחידה ו- $a \in R$ אז קל לראות ש-

$$(a) := \{ra \mid r \in R\} = \{b \in R \mid a|b\}$$

הוא אידיאל של R אשר מכיל את a . אידיאל מהצורה (a) נקרא **ראשי**.

(2) אם $\varphi: R \rightarrow S$ הומומורפיזם של חוגים, אז

$$\text{Ker } \varphi := \{r \in R \mid \varphi(r) = 0\}$$

אידיאל ב- R . (בדוק! צריך לדעת ש- $\varphi(0) = 0$).

משפט 3.3: יהי F שדה. אז כל אידיאל ב- $R = F[X]$ הוא ראשי. יתר על כן: אם $I \neq \{0\}$, אז

(א) קיים $g \in F[X]$ מתוקן **יחיד כן** ש- $I = (g)$.

(ב) g הוא הפולינום המתוקן היחיד ב- I ממעלה $m := \min(\deg h \mid h \in I \setminus \{0\})$.

הוכחה: יהי $I \subseteq R$ אידיאל. אם $I = \{0\}$ אז $I = (0)$ ראשי. אחרת יש $g \in I \neq 0$ ממעלה m .

טענה: $I = (g) := \{rg \mid r \in R\}$.

ואכן, ההכלה " \supseteq " נובעת מכך ש- $g \in I$, ו- I סגור תחת הכפל באברי R . להיפך, יהי $f \in I$. לפי משפט החילוק עם

שארית יש $r \in R$ כך ש-

$$f = gq + r, \quad \deg r < \deg g = m$$

כעת, $f, g \in R$, לכן $r = f - gq = f + (-q)g \in I$. לפי הגדרת m יוצא: $r = 0$. לכן $f = gq \in (g)$.

בה"כ g מתוקן: אם $c \in F^\times$ המקדם העליון של g , אז $c^{-1}g \in I$ מתוקן, ומאותה המעלה.

היחידות ב- (a) : אם גם g' מתוקן, $I = (g) = (g')$, אז $g' \in (g)$ ולכן $g'|g$. באופן דומה $g|g'$. מכאן,

היות ו- g, g' מתוקנים, $g = g'$.

היחידות ב- (b) : אם גם $g' \in I$ ממעלה m , אז לפי ההוכחה $I = (g')$, ולכן לפי (א) $g' = g$. ■

הגדרה 3.4: יהי R תחום שלמות. יהי $q \in R$ לא הפיך.

(א) נקרא אי פריק אם לכל $a, b \in R$ מתקיים: אם $q = ab$ אז $b \in R^\times$ או $a \in R^\times$.

(ב) נקרא ראשוני אם לכל $a, b \in R$ מתקיים: אם $q|ab$ אז $q|b$ או $q|a$. ■

תרגיל 3.5: יהי R תחום שלמות.

(א) יש כלל הצמצום ב- R : אם $ac = bc$ ו- $c \neq 0$ אז $a = b$.

(ב) יהיו $a, b \in R$ שונים מ-0. אם $a|b$ וגם $b|a$ אז $b = ua$ באשר $u \in R^\times$.

תרגיל 3.6: יהי R תחום שלמות, $q \in R$.

(א) אם q ראשוני אז הוא אי פריק.

(ב) אם q אי פריק, $u \in R^\times$, אז גם qu אי פריק.

משפט 3.7: יהי R תחום שלמות בו כל אידאל ראשי. יהי $q \in R$ אי פריק. אז q ראשוני.

הוכחה: יהיו $a, b \in R$ כך ש- $q|ab$. הקבוצה

$$I = \{c \in R \mid q|cb\}$$

היא אידאל ב- R (בדוק!) ולכן יש $c_0 \in R$ כך ש- $I = (c_0)$.

$a \in I$, לכן יש $r \in R$ כך ש- $a = rc_0$.

$q \in I$ (כי $q|qb$), לכן יש $u \in R$ כך ש- $q = uc_0$. היות ו- q אי פריק, c_0 הפיך או u הפיך. במקרה הראשון

■ $1 = c_0^{-1}c_0 \in I$, כלומר $q|b$. במקרה השני $a = rc_0 = (ru^{-1})q$ ולכן $a = qc$. ■

משפט 3.8: יהי F שדה ויהי $R = F[X]$. יהי $\{q_i\}_{i \in I}$ האוסף של כל הפולינומים האי פריקים המתוקנים (=בעלי מקדם

עליון 1) ב- R . אז לכל $f \in R$ יש $0 \neq c \in R^\times = F^\times$ יחיד ו- $m_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, לכל $i \in I$, כמעט כולם 0, יחידים,

כך ש-

$$f = c \prod_{i \in I} q_i^{m_i} \quad (*)$$

הוכחה: (א) קיום ההצגה (*): קודם שני מקרים פרטיים. אם f הפיך, אז $f = f \prod_{i \in I} q_i^0$ היא ההצגה שלו. אם f

אי פריק, ו- $c \in F^\times$ המקדם העליון שלו, אז $c^{-1}f$ מתוקן וגם אי פריק, לפי תרגיל 3.6(ב). לכן $c^{-1}f = q_{i_0}$, עבור

איזה $i_0 \in I$ ואז $f = cq_{i_0}$ היא ההצגה (*). שלו.

נניח בשלילה שיש $f \in R$ שאין לו הצגה (*), ונבחר אותו ממעלה מזערית. לפי האמור לעיל, f

אינו הפיך ואינו אי פריק. לכן $f = f_1 f_2$ באשר $f_1, f_2 \in R$ לא הפיכים. בפרט $\deg f_1, \deg f_2 \geq 1$ ומכאן

$\deg f_1, \deg f_2 < \deg f$ (כי $\deg f_1 + \deg f_2 = \deg f$). לכן גם ל- f_1 וגם ל- f_2 הצגות (*); אבל מכפלת ההצגות האלה נותנת הצגה (*) עבור f , סתירה.

(ב) יחידות ההצגה (*): נניח כי בנוסף ל- (*) מתקיים גם

$$f = d \prod_{i \in I} q_i^{n_i} \quad (**)$$

באשר $d \in R^\times = F^\times$ ו- $n_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, כמעט כולם 0.

מתוך (*) ברור ש- c הוא המקדם העליון של f . מתוך (**) ברור ש- d הוא המקדם העליון של f . לכן $c = d$

$$\text{ומכאן גם } \prod_{i \in I} q_i^{m_i} = \prod_{i \in I} q_i^{n_i}$$

נניח בשלילה שיש $j \in I$ כך ש- $m_j \neq n_j$, ובה"כ (מטעמי סימטריה) $m_j < n_j$. נצמצם את השוויון

האחרון ב- $q_j^{m_j}$:

$$\prod_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} q_i^{m_i} = q_j^{n_j - m_j} \prod_{\substack{i \in I \\ i \neq j}} q_i^{n_i}$$

באגף ימין מופיע q_j כגורם, לכן $q_j \mid \prod_{i \in I, i \neq j} q_i^{m_i}$. אבל לפי משפט 3.7, q_j ראשוני, לכן יש $i \in I, i \neq j$, כך

ש- $q_j \mid q_i$. כלומר $q_i = q_j u$, באשר $u \in R$. כעת q_i אי פריק, לכן $u \in R^\times = F^\times$. אבל q_i, q_j מתוקנים, לכן

$$\blacksquare \quad u = 1. \text{ מכאן } q_i = q_j, \text{ בסתירה ל- } i \neq j.$$

תרגיל 3.9: יהי E תת שדה של שדה F ויהיו $f, g \in E[X]$. נניח כי $f \mid g$ ב- $F[X]$. הוכח ש- $f \mid g$ ב- $E[X]$.

תרגיל 3.10: יהי F שדה סגור אלגברית ויהי $f \in F[X]$ מתוקן (בפרט שונה מ-0). אז אי פריק $f = X - \alpha \iff$

באשר $\alpha \in F$.

תרגיל 3.11: יהיו $b, c \in \mathbb{R}$ כך ש- $b^2 - 4c < 0$. הוכח ש- $f = X^2 + bX + c$ אי פריק ב- $\mathbb{R}[X]$.

משפט 3.12: יהי $f \in \mathbb{R}[X]$ מתוקן. אז אי פריק אם ורק אם

$$(א) \quad f = X - \alpha, \text{ באשר } \alpha \in \mathbb{R}; \text{ או}$$

$$(ב) \quad f = X^2 + bX + c, \text{ באשר } b, c \in \mathbb{R} \text{ כך ש- } b^2 - 4c < 0.$$

הוכחה: אם f מהצורה (א), ברור שהוא אי פריק. אם הוא מהצורה (ב) הוא אי פריק לפי תרגיל 3.11.

להיפך, נניח כי f מתוקן ואי פריק. אז $f \in \mathbb{C}[X]$, לכן לפי משפט 2.14,

$$f = c(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$$

באשר $c \in \mathbb{C}^\times$ ו- $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$; כאן $c = 1$, כי f מתוקן. נעיר ש- $n \geq 1$, כי f אינו הפיך.

מתקיים $f(\alpha_1) = 0$. נראה שגם $f(\overline{\alpha_1}) = 0$ (הגג מסמן את ההצמדה המרוכבת). ואכן, אם $f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$, באשר $a_0, a_1, \dots \in \mathbb{R}$, אז

$$f(\overline{\alpha_1}) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \overline{\alpha_1}^i = \sum_{i=0}^{\infty} \overline{a_i \alpha_1^i} = \overline{\sum_{i=0}^{\infty} a_i \alpha_1^i} = \overline{f(\alpha_1)} = \overline{0} = 0$$

כי ההצמדה שומרת כפל וחיבור.

לכן יש $1 \leq j \leq n$ (לא בהכרח יחיד) כך ש- $\overline{\alpha_1} = \alpha_j$. כעת תיתכנה שתי אפשרויות:

(1) $\overline{\alpha_1} = \alpha_1$, כלומר $\alpha_1 \in \mathbb{R}$. אז $(X - \alpha_1) | f$ ב- $\mathbb{R}[X]$ כי $f(\alpha_1) = 0$, ומכאן $X - \alpha_1 = f$, בגלל ש- f אי פריק ומתוקן (בדוק!).

(2) $\overline{\alpha_1} \neq \alpha_1$ (ובפרט $\text{Im } \alpha_1 \neq 0$). אז $\overline{\alpha_1} = \alpha_j$, באשר $j > 1$. מכאן

$$q := (X - \alpha_1)(X - \alpha_j) = (X - \alpha_1)(X - \overline{\alpha_1}) = X^2 + bX + c$$

באשר $b = -(\alpha_1 + \overline{\alpha_1})$, $c = \alpha_1 \overline{\alpha_1} \in \mathbb{R}$ ולכן

$$b^2 - 4c = (\alpha_1 + \overline{\alpha_1})^2 - 4\alpha_1 \overline{\alpha_1} = (\alpha_1 - \overline{\alpha_1})^2 = (2i \text{Im } \alpha_1)^2 = -4(\text{Im } \alpha_1)^2 < 0$$

כעת $q | f$ ב- $\mathbb{C}[X]$, לכן לפי תרגיל 3.9, גם ב- $\mathbb{R}[X]$ ומכאן $f = q$, כי f אי פריק ומתוקן. ■

המשפט הבא שימושי כאשר רוצים לפרק פולינום ב- $\mathbb{Q}[X]$ לגורמים:

למה 3.13 (למה של גאוס): אם $f \in \mathbb{Z}[X]$ מתוקן, ויש $g, h \in \mathbb{Q}[X]$ מתוקנים כך ש- $f = gh$, אז $g, h \in \mathbb{Z}[X]$.

מסקנה 3.14: יהי $f \in \mathbb{Z}[X]$ מתוקן, ויהי $\alpha \in \mathbb{Q}$ שרשו. אז $\alpha \in \mathbb{Z}$.

הוכחה: $f(\alpha) = 0$, לכן $(X - \alpha) | f$ ב- $\mathbb{Q}[X]$, כלומר יש $h \in \mathbb{Q}[X]$ כך ש- $f = (X - \alpha)h$. ברור ש- h מתוקן, לכן, לפי למה 3.13, $X - \alpha \in \mathbb{Z}[X]$, כלומר, $\alpha \in \mathbb{Z}$. ■

הגדרה 3.15: יהיו $f_1, \dots, f_k \in F[X]$, באשר F שדה. פולינום מתוקן $d \in F[X]$ ייקרא מחלק משותף של f_1, \dots, f_k , אם $d | f_1, \dots, f_k$ ב- $F[X]$. מחלק משותף של f_1, \dots, f_k ייקרא הגדול ביותר ויסומן $\text{gcd}(f_1, \dots, f_k)$, אם הוא מתחלק בכל מחלק משותף d' של f_1, \dots, f_k , כלומר,

■ אם $d' | d$ או $d' | f_1, \dots, f_k$.

דוגמה 3.16: $f_1 \neq 0, k = 1$, אז $\text{gcd}(f_1) = c^{-1} f_1$, באשר c המקדם העליון של f_1 . ■

לכן אם נסמן $h_i = g_{i-1}$, $h_i = g_i - h_i q_{i-1}$ אז

$$\blacksquare \quad .d = g_{i-1}f_{i-1} + h_{i-1}f_i \quad (*_{i-1})$$

פולינומים f_1, f_2 נקראים זרים אם $\gcd(f_1, f_2) = 1$.

תרגיל 3.19: יהי F שדה, ויהיו $f_1, f_2, f_3 \in F[X]$ שונים מאפס. אם $f_1|f_2f_3$ ו- f_1 זרים אז $f_1|f_3$.

הוכחה: לפי ההנחה יש $q \in F[X]$ כך ש- $qf_1 = f_2f_3$. לפי למה 3.18 יש $g, h \in F[X]$ כך ש- $1 = gf_1 + hf_2$. לכן

$$f_3 = (gf_1 + hf_2)f_3 = f_1gf_3 + hf_2f_3 = gf_1f_3 + hf_2f_3 = (gf_3 + hf_2)f_1$$

מתחלק ב- f_1 . \blacksquare

תרגיל 3.20: יהי F שדה, ויהיו $f, g \in F[X]$ שונים מאפס,

$$f = c \prod_{i \in I} q_i^{n_i}, \quad c \in F^\times \quad g = d \prod_{i \in I} q_i^{m_i}, \quad d \in F^\times$$

הפירוקים שלהם לגורמים אי פריקים ב- $F[X]$ אזי

$$.i \in I \text{ לכל } m_i \leq n_i \Leftrightarrow F[X] \text{ ב-} g|f$$

הוכחה: " \Rightarrow ": יהי $h = cd^{-1} \prod_{i \in I} q_i^{n_i - m_i}$, אז $h \in F[X]$ ו- $hg = f$. לכן $g|f$.

" \Leftarrow ": יהי $h \in F[X]$ כך ש- $hg = f$. אז $h \neq 0$, לכן יש לו הצגה

$$h = u \prod_{i \in I} q_i^{k_i}, \quad u \in F^\times, k_i \geq 0$$

וברור ש- $f = hg = ud \prod_{i \in I} q_i^{m_i + k_i}$. מהיחידות של ההצגה נובע $m_i + k_i = n_i$ לכל $i \in I$, בפרט

$$\blacksquare \quad .n_i - m_i = k_i \geq 0$$

הערה 3.21: אם יודעים לפרק שני פולינומים $f_1, f_2 \in F[X]$ שונים מאפס לגורמים אי פריקים ב- $F[X]$, נאמר

$$\begin{aligned} f_1 &= c_1 \prod_{i \in I} q_i^{m_i}, & c_1 &\in F^\times, m_i \geq 0 \\ f_2 &= c_2 \prod_{i \in I} q_i^{n_i}, & c_2 &\in F^\times, n_i \geq 0 \end{aligned} \quad (1)$$

אז לפי תרגיל 3.20 אפשר למצוא את $d = \gcd(f_1, f_2)$ באופן הבא:

$$.d = \prod_{i \in I} q_i^{\min(m_i, n_i)}$$

אכן, אם $d \in F[X]$ מתוקן, אז

$$d = \prod_{i \in I} q_i^{k_i}$$

באשר $k_i \geq 0$ לכל $i \in I$ וכמעט כל k_i הוא אפס. לפי תרגיל 3.20,

$$k \leq \min(m_i, n_i) \iff k_i \leq m_i, n_i \iff d|f_1, f_2$$

■ מכאן ברור ש- d גדול ביותר כזה אם ורק אם $k = \min(m_i, n_i)$.

הגדרה 3.22: יהי F שדה ויהיו $f_1, \dots, f_k \in F[X]$. פולינום מתוקן $m \in F[X]$ ייקרא **כפולה משותפת** של f_1, \dots, f_k , אם $f_1, \dots, f_k | m$ ב- $F[X]$. כפולה משותפת של f_1, \dots, f_k תיקרא **הקטנה ביותר**, ותסומן $\text{lcm}(f_1, \dots, f_k)$, אם היא מחלקת כל כפולה משותפת m' של f_1, \dots, f_k , כלומר,

■ אם m' מתוקן ו- $f_1, \dots, f_k | m'$ אז $m | m'$.

הערה 3.23: יהיו f_1, f_2 כמו במשוואה (1) של הערה 3.21. אז $m = \prod_{i \in I} q_i^{\max(m_i, n_i)}$. ההוכחה - כמו בהערה

■ הקודמת.

הערה 3.24: יהי F שדה ויהיו $f_1, f_2 \in F[X]$ מתוקנים. יהי d המחלק המשותף הגדול ביותר ותהי m הכפולה המשותפת הקטנה ביותר שלהם. אז $dm = f_1 f_2$.

אכן, יהיו נתונים על ידי (1). הם מתוקנים, לכן $c_1 = c_2 = 1$. אז $d = \prod_{i \in I} q_i^{\min(m_i, n_i)}$

■ ו- $m = \prod_{i \in I} q_i^{\max(m_i, n_i)}$. אבל $\max(m_i, n_i) + \min(m_i, n_i) = m_i + n_i$, ומכאן המסקנה.

הגדרה 4.1: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית, ויהי $\lambda \in F$ סקלאר. הקבוצה

$$V_\lambda = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\}$$

תקרא **המרחב העצמי של T השייך ל- λ** . וקטור $v \in V$ ייקרא **וקטור עצמי של T** (eigenvector) השייך ל- λ , אם $T(v) = \lambda v$, כלומר $v \in V_\lambda$. (בד"כ דורשים גם $v \neq 0$, אך אנו לא נעשה זאת כאן.) הסקלאר λ ייקרא **ערך עצמי** (eigenvalue) של T אם יש $v \in V$ כך ש- $T(v) = \lambda v$, כלומר, אם $V_\lambda \neq 0$. ■

דוגמה 4.2: תהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ נתונה על ידי $T((a, b)) = (a, -b)$. אז 1 ערך עצמי של T ו- $(x, 0)$ וקטור עצמי ששייך לו, לכל $x \in \mathbb{R}$. כמו כן, -1 ערך עצמי של T , ו- $(0, y)$ וקטור עצמי ששייך לו, לכל $y \in \mathbb{R}$. ■

באופן דומה:

הגדרה 4.3: יהי F שדה ותהי $A \in M_n(F)$, ויהי $\lambda \in F$ סקלאר. אז

$$V_\lambda = \{v \in F^n \mid Av = \lambda v\}$$

המרחב עצמי של A השייך ל- λ . וקטור $v \in F^n$ וקטור עצמי של A השייך ל- λ אם $Av = \lambda v$. כמו כן $\lambda \in F$ **ערך עצמי של A** , אם יש $v \in F^n$ כך ש- $Av = \lambda v$. ■

למה 4.4: יהי V מרחב וקטורי מעל F , ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית. יהי $\lambda \in F$. יהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V . תהי $A = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \in M_n(F)$ אזי

(א) $v \in V$ הוא וקטור עצמי של T השייך ל- λ אם ורק אם $[v]_{\mathcal{B}} \in F^n$ הוא וקטור עצמי של A השייך ל- λ .

(ב) λ הוא ערך עצמי של T אם ורק אם λ ערך עצמי של A .

הוכחה: נזכור שההעתקה $V \rightarrow F^n$ הנתונה על ידי $[v]_{\mathcal{B}}$ היא איזומורפיזם. יהי $\lambda \in F$ ויהי $v \in V$. אז $[\lambda v]_{\mathcal{B}} = \lambda [v]_{\mathcal{B}}$ (לפי האמור לעיל). כמו כן $[T(v)]_{\mathcal{B}} = A[v]_{\mathcal{B}}$ ולכן

$$A[v]_{\mathcal{B}} = \lambda [v]_{\mathcal{B}} \iff [T(v)]_{\mathcal{B}} = [\lambda v]_{\mathcal{B}} \iff T(v) = \lambda v$$

ו- $[v]_{\mathcal{B}} \neq 0 \iff v \neq 0$. מכאן בקלות המסקנה. ■

בפרט λ הוא ערך עצמי של A אם ורק אם λ ערך עצמי של T_A , באשר $T_A: F^n \rightarrow F^n$ מוגדרת על ידי

$$T_A(v) = Av \quad (\text{כי } A \text{ היא המטריצה של } T_A \text{ לפי הבסיס הסטנדרטי}).$$

(א) יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית, $\lambda \in F$ אז $V_\lambda = \text{Ker}(T - \lambda 1_V)$. ברט V_λ תת מרחב של V . לכן λ הוא ערך עצמי של T אם ורק אם ההעתקה $T - \lambda 1_V$ אינה חח"ע.

(ב) יהי F שדה, $A \in M_n(F)$, $\lambda \in F$. אז V_λ הוא מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית של משוואות לינאריות $(A - \lambda I)X = 0$. לכן λ ערך עצמי של A אם ורק אם $\det(A - \lambda I) = 0$.

הוכחה: (א) יהי $v \in V$ אז

$$v \in V_\lambda \iff T(v) = \lambda v \iff (T - \lambda 1_V)(v) = 0 \iff v \in \text{Ker}(T - \lambda 1_V)$$

לכן $V_\lambda = \text{Ker}(T - \lambda 1_V)$. כעת λ הוא ערך עצמי של T אם ורק אם $V_\lambda \neq \{0\}$ אם ורק אם ההעתקה $T - \lambda 1_V$ אינה חח"ע.

(ב) באופן דומה λ הוא ערך עצמי של A אם ורק אם למטריצה $A - \lambda I_n$ מאפס לא טריביאלי, כלומר

$$\det(A - \lambda I_n) = 0 \quad \blacksquare$$

מטריצה $A \in M_n(F)$ נקראת **אלכסונית** אם $(A)_{ij} = 0$ לכל $i \neq j$, כלומר

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

פעולת החיבור והכפל בין מטריצות אלכסוניות פשוטות יותר:

תרגיל 4.6: יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in F$ אז

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n + \beta_n \end{pmatrix},$$

$$\cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha_1^{-1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n^{-1} \end{pmatrix} \text{ ואם } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F^\times$$

משפט 4.7: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור שלו. תהי העתקה

לינארית. אז $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$ אם ורק אם v_i וקטור עצמי של T השייך ל- λ_i , לכל $i = 1, \dots, n$ אם זה קורה אז $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ערכים עצמיים של T .

הוכחה:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = ([T(v_1)]_{\mathcal{B}}, \dots, [T(v_n)]_{\mathcal{B}})$$

$$\cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = (\lambda_1 \mathbf{e}_1, \dots, \lambda_n \mathbf{e}_n) = (\lambda_1 [v_1]_{\mathcal{B}}, \dots, \lambda_n [v_n]_{\mathcal{B}})$$

לכן $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$ אם ורק אם $[T(v_j)]_{\mathcal{B}} = \lambda_j [v_j]_{\mathcal{B}}$ לכל $1 \leq j \leq n$ אם ורק אם (בגלל שההעתקה $[v]_{\mathcal{B}} \mapsto [T(v)]_{\mathcal{B}}$ היא איזומורפיזם) $T(v_j) = \lambda_j v_j$ לכל $1 \leq j \leq n$. מכאן השקילות. הטענה האחרונה של המשפט נובעת מכך ש- v_1, \dots, v_n שונים מאפס, כי הם אברי בסיס. ■

מסקנה 4.8: להעתקה לינארית $T: V \rightarrow V$ יש הצגה אלכסונית אם ורק אם ל- V יש בסיס המורכב מוקטורים עצמיים של T .

מסקנה 4.9: יהי F שדה ותהי $A \in M_n(F)$. אם יש $P \in M_n(F)$ הפיכה כך ש- $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$, אז עמודותיה v_1, \dots, v_n של בסיס של F^n המורכב מוקטורים עצמיים של A , כאשר v_j שייך ל- λ_j , לכל $1 \leq j \leq n$. להיפך, אם יש בסיס כזה ונגדיר $P = (v_1, \dots, v_n) \in M_n(F)$, אז $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

הוכחה: תהי $P \in M_n(F)$ הפיכה, ויהיו $v_1, \dots, v_n \in F^n$ עמודותיה. אז בלתי תלויים לינארית מעל F , ובפרט בסיס של F^n . מתקיים (לכל $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$)

$$AP = A(v_1, \dots, v_n) = (Av_1, \dots, Av_n)$$

$$P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = P(\lambda_1 e_1, \dots, \lambda_n e_n) = (\lambda_1 P e_1, \dots, \lambda_n P e_n) = (\lambda_1 v_1, \dots, \lambda_n v_n)$$

לכן

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \iff AP = P(\lambda_1 e_1, \dots, \lambda_n e_n)$$

$$\iff A(v_1, \dots, v_n) = (\lambda_1 v_1, \dots, \lambda_n v_n)$$

$$\iff 1 \leq j \leq n \text{ לכל } Av_j = \lambda_j v_j$$

■ מכאן המסקנה.

משפט 4.10: יהי V מרחב וקטורי, $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית, v_1, \dots, v_m וקטורים עצמיים של T השונים מאפס והשייכים לערכים עצמיים $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, בהתאמה. נניח ש- $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ שונים זה מזה. אז v_1, \dots, v_m בלתי תלויים לינארית מעל F .

הוכחה: באינדוקציה על m . עבור $m = 1$ זה ברור: $v_1 \neq 0$, לכן v_1 בת"ל. נניח נכונות עבור $m - 1$ וקטורים. יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in F$ כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{m-1} v_{m-1} + \alpha_m v_m = 0 \quad (1)$$

נפעיל T על שני האגפים ונקבל

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \dots + \alpha_{m-1} \lambda_{m-1} v_{m-1} + \alpha_m \lambda_m v_m = 0 \quad (2)$$

נכפיל את (1) ב" λ_m ונחסיר אותה מ" (2):

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_m) v_1 + \dots + \alpha_{m-1} (\lambda_{m-1} - \lambda_m) v_{m-1} = 0$$

לפי הנחת האינדוקציה v_1, \dots, v_{m-1} בלתי תלויים לינארית, לכן, לכל $1 \leq i \leq m - 1$, $\alpha_i (\lambda_i - \lambda_m) = 0$; היות ו- $\lambda_i - \lambda_m \neq 0$, יוצא $\alpha_i = 0$. אם נציב זאת ב" (1), נקבל $\alpha_m v_m = 0$, ומכאן $\alpha_m = 0$, כי $v_m \neq 0$. ■

מסקנה 4.11: יהי V מרחב וקטורי, $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ערכים עצמיים של T , שונים זה מזה. לכל $1 \leq i \leq n$ תהי $v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{ik_i}$ סדרה של וקטורים בלתי תלויים לינארית ב" V_{λ_i} . אזי הסדרה

$$v_{11}, v_{12}, \dots, v_{1k_1}, v_{21}, v_{22}, \dots, v_{2k_2}, \dots, v_{n1}, v_{n2}, \dots, v_{nk_n}$$

בלתי תלויה לינארית.

הוכחה: יהיו $\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1k_1}, \alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2k_2}, \dots, \alpha_{n1}, \alpha_{n2}, \dots, \alpha_{nk_n} \in F$ כך ש-

$$(\alpha_{11} v_{11} + \dots + \alpha_{1k_1} v_{1k_1}) + \dots + (\alpha_{n1} v_{n1} + \dots + \alpha_{nk_n} v_{nk_n}) = 0 \quad (3)$$

נסמן

$$w_i = \alpha_{i1} v_{i1} + \dots + \alpha_{ik_i} v_{ik_i}, \quad i = 1, \dots, n \quad (4)$$

אז $w_i \in V_{\lambda_i}$, כי V_{λ_i} תת מרחב של V ו- $v_{ij} \in V_{\lambda_i}$ לכל j . את (3) אפשר לרשום כך

$$w_1 + w_2 + \dots + w_n = 0 \quad (3')$$

אם $w_1 = w_2 = \dots = w_n = 0$ אז לפי (4)

$$\alpha_{i1} v_{i1} + \dots + \alpha_{ik_i} v_{ik_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

ומכאן $0 = \alpha_{ik_i} = \dots = \alpha_{i1}$, כי v_{i1}, \dots, v_{ik_i} בלתי תלויים לינארית, ואז סיימנו.

נניח בשלילה ש" w_1, \dots, w_n לא כולם אפס. יהיו w_{j_1}, \dots, w_{j_m} השונים מאפס מתוכם. לפי המשפט

הקודם הם בלתי תלויים לינארית. אבל לפי (3')

$$1w_{j_1} + \dots + 1w_{j_m} = 0$$

■ סתירה.

לקוח מתוך


Kurt Bryan, Tanya Leise, *The \$25,000,000,000 Eigenvector*, SIAM Review **48** (2006), 569–581.

כאשר מחפשים ביטוי באינטרנט, המחשב מוצא את כל האתרים שמכילים אותו ואז צריך להציג אותם. סוד ההצלחה של מנוע החיפוש של Google הוא בכך שהוא היה הראשון להציג את האתרים לפי סדר החשיבות שלהם. אם נניח שחשיבות האתר היא מספר ממשי אי שלילי (גדול יותר, ככל שהאתר חשוב יותר), כיצד לייחס לאתר מספר זה? חשיבות של אתר תיקבע לפי הפניות (לינקים) אליו מאתרים אחרים. (כיצד בדיוק – בהמשך.)

נראה את האינטרנט כגרף מכוון: קדקדיו $1, \dots, n$ הם אתרים. קשתות הם זוגות (i, j) עבור כל הפניה מאתר i לאתר j . חשיבות אתר i תסומן על ידי מספר ממשי $x_i \geq 0$.

דוגמה 5.1:

אתר 1 מפנה לאתרים 2, 3, 4;
 אתר 2 מפנה לאתרים 3, 4;
 אתר 3 מפנה לאתרים 1;
 אתר 4 מפנה לאתרים 1, 3.



הגדרה 5.2: ננסה להגדיר x_i . (בכל הגישות מזניחים הפניות מאתר לעצמו!)

(א) הגדרה פשוטה מאד: $x_i =$ מספר ההפניות אל i . בדוגמה לעיל, $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 3, x_4 = 2$.

חסרון: הפניות מכל האתרים שוות ערך; רצוי שהפניה מאתר חשוב ל- i תתרום יותר ל- x_i . נשפר:

(ב) $x_i = \sum_{j \in L_i} x_j$, באשר $L_i \subseteq \{1, \dots, n\}$ קבוצת האתרים המפנים אל i .

חסרונות: אגף ימין תלוי באגף שמאל; אתר משפיע על ידי יצירת הפניות לאתרים רבים – לא הוגן. נשפר:

(ג) $x_i = \sum_{j \in L_i} x_j / n_j$, באשר n_j מספר ההפניות שיוצאות מאתר j (לרשת כולה). אמנם גם כאן אגף ימין

תלוי באגף שמאל, אך זוהי בעצם מערכת של n משוואות ב- n נעלמים שאולי אפשר לפתור. בדוגמה לעיל:

$$x_1 = x_3/1 + x_4/2$$

$$x_2 = x_1/3$$

$$x_3 = x_1/3 + x_2/2 + x_4/2$$

$$x_4 = x_1/3 + x_2/2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ ו- } v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \text{ באשר } v = Av$$

כלומר, $v \in V_1(A)$ הוא וקטור עצמי של A השייך לערך עצמי $\lambda = 1$.

חישוב נותן פתרון $v = (12, 4, 9, 6)^t$ יחיד עד כדי כפל בסקלר.

שים לב שאתר 3 חשוב פחות (למרות שיש אליו יותר הפניות) מאתר 1. מדוע? (כנראה בגלל שהוא מפנה

לאתר 1 וזה עושה את 1 לחשוב מאד.)

נכליל מהדוגמה למקרה הכללי:

הגדרה 5.3: (א) מטריצת הקישוריות של הרשת היא מטריצה $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ המוגדרת על ידי

$$a_{ij} = \frac{\text{מספר ההפניות מאתר } j \text{ לאתר } i}{\text{מספר ההפניות מאתר } j \text{ לשאר האתרים}} \quad (1)$$

(ב) וקטור החשיבות היא עמודה $v = (x_1, \dots, x_n)^t \in \mathbb{R}^n$, כך ש- $v \neq 0$ וקטור עצמי של A השייך

$$\text{ל-} \lambda = 1, \text{ ו-} x_i \geq 0 \text{ לכל } i. \text{ נהוג לנרמל אותו כך ש-} \sum_i x_i = 1.$$

הערות 5.4: (א) כדי שב- (1) לא נחלק באפס, נניח שמכל אתר יוצאות איזשהן הפניות.

(ב) כזכור, מזניחים הפניות מאתר לעצמו. לכן $a_{ii} = 0$ לכל i .

(ג) האם v קיים ויחיד? כלומר: האם $\dim V_1(A) = 1$ ואם כן, האם יש $v \in V_1(A)$ בעל רכיבים אי שליליים? ■

הגדרה 5.5: מטריצה $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ נקראת

(א) סטוכסטית לפי עמודות אם $a_{ij} \geq 0$ לכל i, j ו- $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1$ לכל j ;

(ב) סטוכסטית לפי עמודות חיובית אם $a_{ij} > 0$ לכל i, j ו- $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1$ לכל j . ■

תרגיל 5.6: מטריצת הקישוריות היא סטוכסטית לפי עמודות.

טענה 5.7: אם $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ סטוכסטית לפי עמודות, אז $V_1(A) \neq 0$, ובפרט $\dim V_1(A) \geq 1$.

הוכחה: די להוכיח כי 1 ערך עצמי של A , כלומר, $\det(A - 1 \cdot I) = 0$, כלומר, (למשל) שורות של $A - I$

תלויות לינארית. ואכן, סכום הרכיבים בעמודה ה- j של $A - I$ הוא $\sum_{i=1}^n a_{ij} - 1 = 0$, כלומר, סכום השורות

של $A - I$ הוא 0. ■

האם $\dim V_1(A) \leq 1$? לא בהכרח:

דוגמה 5.8: נניח $A = \text{Diag}(A_1, A_2)$, באשר A_1, A_2 סטוכסטיות לפי עמודות. אז גם A סטוכסטית לפי

עמודות. לכן יש $v_i \neq 0$ כך ש- $A_i v_i = v_i$, עבור $i = 1, 2$. אבל אז $\begin{pmatrix} v_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ בלתי תלויים לינארית

ושניהם וקטורים עצמיים של A השייכים ל-1.

האם יתכן ש- A כזאת תהיה מטריצת קישוריות?

כן, זה קורה כאשר האינטרנט מחולק לשתי רשתות נפרדות שאין הפניות הדדיות ביניהן. וזה יתכן.

מצד שני, אם A חיובית, זה אינו קורה:

משפט 5.9: תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סטוכסטית לפי עמודות חיובית.

(א) $\dim V_1(A) = 1$

(ב) אם $v \in V_1(A)$ אז $v \neq 0$ אז כל רכיביו בעלי אותו סימן (כולם חיוביים או כולם שליליים).

הוכחה: (ב) יהי $v = (x_1, \dots, x_n)^t \in V_1(A)$ אז יש k כך ש- $x_k \neq 0$. בלי הגבלת הכלליות, $x_k > 0$, אחרת נכפיל v ב- (-1) . צריך להוכיח כי $x_i > 0$ לכל i . מתוך $v = Av$ נקבל $x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$, ולכן $x_j \geq 0$ אם ורק אם $x_j \geq 0$ לכל j . אבל $x_j \geq 0$ כלומר, $x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq a_{ik}x_k > 0$ אבל לכל j .
 (א) לפי (ב) די להוכיח:

טענה: יהיו $u, v \in \mathbb{R}^n$ בלתי תלויים לינארית. אז יש $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך שלוקטור $\alpha u + \beta v$ יש רכיבים חיוביים וגם שליליים.

הוכחה: נסמן $W = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \sum_i (v)_i = 0\}$. זהו תת מרחב של \mathbb{R}^n . אם $w \in W$, אז w יש בהכרח רכיבים חיוביים וגם שליליים. לכן די למצוא $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $\alpha u + \beta v \in W$.
 אם $u \in W$, נקח $\alpha = 1, \beta = 0$ כי $\alpha u + \beta v = u$.

אחרת יהי β סכום רכיביו של u ו- $-\alpha$ סכום רכיביו של v אז $\beta \neq 0$, לכן $\alpha u + \beta v \neq 0$ ומתקיים

$$\sum_{i=1}^n (\alpha u + \beta v)_i = \sum_{i=1}^n \alpha (u)_i + \beta (v)_i = \alpha \sum_{i=1}^n (u)_i + \beta \sum_{i=1}^n (v)_i = \alpha \beta + \beta(-\alpha) = 0$$

משפט 5.10: תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סטוכסטית לפי עמודות. תהי $B = (b_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש- $b_{ij} = 1/n$ לכל i, j ויהי $0 < m < 1$ אז

(א) B סטוכסטית לפי עמודות.

(ב) $M = (1 - m)A + mB$ סטוכסטית לפי עמודות חיובית.

הוכחה: (א) ברור.

(ב) $(M)_{ij} = (1 - m)a_{ij} + m/n \geq m/n > 0$ ואילו

$$\sum_i (M)_{ij} = \sum_i ((1 - m)a_{ij} + m/n) = (1 - m) \sum_i a_{ij} + n \cdot m/n = (1 - m) + m = 1$$

קעת נראה איך אפשר לחשב (באופן מקורב) את וקטור החשיבות:

עבור וקטור $v \in \mathbb{R}^n$ נסמן $\|v\| = \sum_{i=1}^n |(v)_i|$. אז $\|v\| \geq 0$ ומתקיים $\|v\| = 0 \iff v = 0$.

למה 5.11: יהי $n \geq 2$ ותהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה סטוכסטית לפי עמודות חיובית. אז לכל $v \in W$ מתקיים

$$; Av \in W \quad (\text{א})$$

$$\text{באשר } \|Av\| \leq c \|v\| \quad (\text{ב})$$

$$.0 \leq c < 1, c := \max_j (1 - 2 \min_i a_{ij}) \quad (\text{ג})$$

הוכחה: $\sum_{i=1}^n (Av)_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} (v)_j = \sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^n a_{ij}) (v)_j = \sum_{j=1}^n (v)_j = 0$ (א)
 (ג) נקבע $1 \leq j \leq n$ אז $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 1$ אם $a_{kj} = \min_i a_{ij}$ אז

$$.0 \leq \sum_{i \neq k} a_{ij} - a_{kj} = 1 - 2a_{kj} = 1 - 2 \min_i a_{ij} < 1$$

$$.0 \leq c < 1$$
 מכאן

(ב) נסמן $w = Av$ אם $w = 0$, הטענה ברורה. לכן נניח כי $w \neq 0$. לפי (א), $\sum_i (w)_i = 0$. לכן יש k כך ש- $(w)_k > 0$ ויש ℓ כך ש- $(w)_\ell < 0$. יהי $\varepsilon_i = \begin{cases} +1 & (w)_i \geq 0 \\ -1 & (w)_i < 0 \end{cases}$. אז $\varepsilon_k = 1$ ו- $\varepsilon_\ell = -1$. כעת,

$$\|w\| = \sum_{i=1}^n |(w)_i| = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i (w)_i = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \sum_{j=1}^n a_{ij} (v)_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i a_{ij} \right) (v)_j$$

$$\text{נקבע } 1 \leq j \leq n \text{ אז}$$

$$, \sum_i \varepsilon_i a_{ij} = \sum_{i \neq \ell} \varepsilon_i a_{ij} - a_{\ell j} \leq \sum_{i \neq \ell} a_{ij} - a_{\ell j} = 1 - 2a_{\ell j} \leq 1 - 2 \min_i a_{ij} \leq c$$

ובאופן דומה

$$. \sum_i \varepsilon_i a_{ij} = \sum_{i \neq k} \varepsilon_i a_{ij} + a_{kj} \geq \sum_{i \neq k} -a_{ij} + a_{kj} \geq -1 + 2a_{kj} \geq -1 + 2 \min_i a_{ij} \geq -c$$

$$\blacksquare \quad \|w\| \leq c \sum_j (v)_j \leq c \sum_j |(v)_j| = c \|v\|$$

משפט 5.12: יהי $n \geq 2$ ותהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה סטוכסטית לפי עמודות חיובית. יהי $v \in \mathbb{R}^n$ כך ש- $(v)_i \geq 0$ ו- $\|v\| = 1$. יהי $v_0 \in \mathbb{R}^n$ כך ש- $(v_0)_i \geq 0$ לכל i ו- $\|v_0\| = 1$. אז $Av = v$ ו- $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k v_0 - v\| = 0$, כלומר, $v = \lim_{k \rightarrow \infty} A^k v_0$.

הוכחה: (א) יהי $w = v_0 - v$. אז $\sum_i (w)_i = \sum_i (v_0)_i - \sum_i (v)_i = \|v_0\| - \|v\| = 0$. לכן $w \in W$. כעת, $A^k v_0 = A^k(w + v) = A^k w + v$ ולכן $A^k v_0 - v = A^k w$. לפי למה 5.11, $\|A^k w\| \leq c^k \|w\|$. לכן $A^k w \rightarrow 0$ מכאן $A^k v_0 \rightarrow v$.
 \blacksquare

עבור מטריצה $C = (g_{ij}(X)) \in M_n(F[X])$ ועבור $\lambda \in F$ נגדיר $C(\lambda) = (g_{ij}(\lambda)) \in M_n(F)$.

למה 6.1: יהי F שדה ותהי $C = (g_{ij}(X)) \in M_n(F[X])$ אזי

$$; \det(C) \in F[X] \quad (\text{א})$$

$$; d_i = \max_{1 \leq j \leq n} \deg g_{ij} \text{ באשר } \deg(\det(C)) \leq d_1 + \dots + d_n \quad (\text{ב})$$

$$.(\det C)(\lambda) = \det(C(\lambda)) : \lambda \in F \quad (\text{ג})$$

הוכחה: (למדנו * אמנם ללא הוכחה * שיש שדה L כך $F[X] \subseteq L$ תת חוג שלו. לכן $(g_{ij}(X)) \in M_n(L)$

ולכן ל- $\det(g_{ij}(X))$ יש משמעות, וזהו איבר של L . אך עדיין לא ברור מדוע זהו איבר של $F[X]$!

(א) + (ב) + (ג): באינדוקציה על n .

עבור $n = 1$, $C = (g)$, לכן $\det C = g \in F[X]$ ו- $\det(g(\lambda)) = g(\lambda)$ כך שהכל ברור.

עבור $n > 1$ נעשה פיתוח לפי השורה האחרונה

$$, \det(C) = \det(g_{ij}(X)) = \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} g_{nj} \det A_{nj} \quad (1)$$

באשר $A_{nj} \in M_{n-1}(F[X])$ המינור של המקום ה- (n, j) . לפי הנחת האינדוקציה

$$, \det A_{nj} \in F[X] \quad (\text{א})$$

$$; \deg \det A_{nj} \leq d_1 + \dots + d_{n-1} \quad (\text{ב})$$

$$.i, j \text{ לכל } (\det A_{nj})(\lambda) = \det(A_{nj}(\lambda)) \quad (\text{ג})$$

מכאן, לפי (1):

$$; \det(C) \text{ הוא סכום של מכפלות של פולינומים מעל } F, \text{ לכן פולינום מעל } F \quad (\text{א})$$

$$; \deg(\det(C)) \leq \max_j (\deg g_{nj} + \deg \det A_{nj}) \leq d_n + (d_1 + \dots + d_{n-1}) \quad (\text{ב})$$

$$.(\det C)(\lambda) = \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} g_{nj}(\lambda) (\det A_{nj})(\lambda) = \quad (\text{ג})$$

$$\blacksquare = \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} g_{nj}(\lambda) \det(A_{nj}(\lambda)) = \det(C(\lambda))$$

הגדרה 6.2: יהי F שדה ותהי $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(F)$ אזי המטריצה

$$XI_n - A = \begin{pmatrix} X & 0 & \dots & 0 \\ 0 & X & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & X \end{pmatrix} - A = \begin{pmatrix} X - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & X - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & X - a_{nn} \end{pmatrix}$$

ב- $M_n(F[X])$ תקרא המטריצה האופיינית של A , r

$$f_A(X) := \det(XI_n - A) \in F[X]$$

ייקרא הפולינום האופייני של A .

דוגמה 6.3: אם $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ אז $XI_2 - A = \begin{pmatrix} X-1 & -2 \\ -3 & X-4 \end{pmatrix}$ ולכן

$$\blacksquare \quad f_A(X) = (X-1)(X-4) - 2 \cdot 3 = X^2 - 5X - 2$$

למה 6.4: תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$ אז $f_A(X) = c_n X^n + c_{n-1} X^{n-1} + \dots + c_0$ באשר

$$(1) \quad c_n = 1; \text{ כלומר, } f_A(X) \text{ מתוקן ממעלה } n;$$

$$(2) \quad c_{n-1} = -\text{tr } A = -(a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn})$$

$$(3) \quad c_0 = (-1)^n \det A$$

הוכחה: (3): לפי למה 6.1(ג), $c_0 = f_A(0) = \det(0I_n - A) = \det(-A) = (-1)^n \det A$

(1) + (2): באינדוקציה על n .

$$\text{עבור } n = 1, f_A(X) = X - a_{11}$$

עבור $n > 1$ נעשה פיתוח של $B := XI_n - A$ לפי השורה האחרונה

$$f_A(X) = \det(XI_n - A) = (-1)^{n+1}(-a_{n1}) \det B_{n1} + (-1)^{n+2}(-a_{n2}) \det B_{n2} + \dots \\ + (-1)^{n+n-1}(-a_{nn}) \det B_{nn}$$

באשר $B_{ij} \in M_{n-1}(F[X])$ מתקבלת מ- B על ידי מחיקת השורה ה- i והעמודה ה- j . נשים לב:

(א) $B_{nn} = XI_{n-1} - A_{nn}$, באשר A_{ij} מתקבלת מ- A על ידי מחיקת השורה ה- i והעמודה ה- j , ולכן לפי

הנחת האינדוקציה

$$\det B_{nn} = X^{n-1} - (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{n-1, n-1})X^{n-2} + \dots \quad (n-2 >)$$

(ב) ב- B_{nj} , עבור $j < n$, יש בדיוק $n-2$ רכיבים ממעלה 1, וכל היתר ממעלה ≥ 0 . (אכן, ב- $XI_n - A$ יש

בדיוק n רכיבים ממעלה 1 - באלכסון הראשי; כאשר מחקנו שורה n , מחקנו אחד מהם, וכאשר מחקנו עמודה

j , מחקנו אחר. לכן $\deg \det B_{nj} \leq n-2$ לפי למה 6.1(ב).

מכאן

$$f_A(X) = (X - a_{nn})(X^{n-1} - (a_{11} + \dots + a_{n-1, n-1})X^{n-2} + \dots) \quad (n-2 >)$$

$$\blacksquare \quad = X^n - (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{n-1, n-1})X^{n-1} + \dots \quad (n-2 \geq)$$

הוכחה נוספת: תהי $B = XI_n - A$ אז

$$(B)_{ij} = \begin{cases} X - a_{ij} & i \neq j \\ -a_{ij} & i = j \end{cases} \quad \text{באשר } f_A(X) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{Sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (B)_{i\sigma(i)} \quad (2)$$

כיון ש- $(B)_{ij} \in F[X]$ לכל i, j , ברור ש- $f_A(X) \in F[X]$

(2) + (1): אם $\sigma = 1$, אז $\text{Sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (B)_{i\sigma(i)} = 1 \cdot (X - a_{11}) \cdots (X - a_{nn})$ אם $\sigma \neq 1$ יש לפחות שני אינדקסים שונים i עבורם $\sigma(i) \neq i$, ולכן לפחות שנים מהגורמים ב- $\prod_{i=1}^n (B)_{i\sigma(i)}$ ממעלה ≥ 0 , וכל השאר ממעלה ≥ 1 . לכן $\deg \prod_{i=1}^n (B)_{i\sigma(i)} \leq n - 2$. מכאן

$$\begin{aligned} f_A(X) &= (X - a_{11}) \cdots (X - a_{nn}) + \cdots + (n - 2 \geq \text{ממעלה}) \\ &= X^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{n-1, n-1})X^{n-1} + \cdots + (n - 2 \geq \text{ממעלה}) \\ &: (3) \text{ נציב } X = 0 \text{ ב-}(2): \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_0 = f_A(0) &= \sum_{\sigma \in S_n} \text{Sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (B(0))_{i\sigma(i)} = \sum_{\sigma \in S_n} \text{Sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (-a_{i\sigma(i)}) = \\ & \blacksquare \quad (-1)^n \sum_{\sigma \in S_n} \text{Sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)} = (-1)^n \det A \end{aligned}$$

משפט 6.5: יהי F שדה ותהי $A \in M_n(F)$, ויהי $\lambda \in F$ אז λ ערך עצמי של $A \Leftrightarrow f_A(\lambda) = 0$

הוכחה: לפי משפט 4.5, λ ערך עצמי $\Leftrightarrow \det(\lambda I_n - A) = 0$. לפי למה 6.1 (ג) (לחילופין, על ידי הצבת λ ב- (2)),

$$\blacksquare \quad f_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$

מסקנה 6.6: אם $f_A(X) = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n)$, באשר $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ שונים זה מזה, אז A דומה למטריצה אלכסונית.

הוכחה: לכל $1 \leq i \leq n$, λ_i הוא שרש של f_A ולכן ערך עצמי של A . לכן יש $v_i \in V_{\lambda_i} \neq 0$. לפי משפט 4.10,

$$\blacksquare \quad v_1, \dots, v_n \text{ בלתי תלויים לינארית, ולכן בסיס של } F^n. \text{ לפי מסקנה 4.9, } A \text{ דומה לאלכסונית.}$$

משפט 6.7: למטריצות דומות אותו פולינום אופייני.

הוכחה: צריך להוכיח: אם $A, P \in M_n(F)$, ו- P הפיכה אז $f_{P^{-1}AP} = f_A$

ואכן,

$$P^{-1}(XI - A)P = XP^{-1}IP - P^{-1}AP = XI - P^{-1}AP$$

כאשר שוויונות אלה יש להבין כשוויונות של מטריצות מעל שדה L אשר מכיל את $F[X]$. מכאן

$$f_{P^{-1}AP}(X) = \det(XI - P^{-1}AP) = \det P^{-1} \det(XI - A) \det P$$

$$\blacksquare \quad = \det P^{-1} \det P \det(XI - A) = \det I f_A(X) = f_A(X)$$

הגדרה 6.8: הצבת מטריצה בפולינום. אם F שדה, $g = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$, ו- $A \in M_n(F)$, נגדיר

$$g(A) := \sum_{i=0}^{\infty} a_i A^i \in M_n(F)$$

אפשר להבין הגדרה זו כהצבה: F תת חוג של $M_n(F)$ (כאשר מזהים סקלר α עם המטריצה הסקלרית αI_n) ולכן

$$g = \sum_{i=0}^{\infty} a_i I_n X^i \in M_n(F)[X]$$

היא $\sum_{i=0}^{\infty} (a_i I_n) A^i = \sum_{i=0}^{\infty} a_i A^i$ שים לב שמקדמי g (מטריצות סקלריות) מתחלפים עם A .

מתקיים (למשל בגלל תכונות ההצבה – טענה (1.6(3)): אם $f, g \in F[X]$ אז

$$(f + g)(A) = f(A) + g(A) \quad , (fg)(A) = f(A)g(A)$$

בפרט לכל $c \in F$ מתקיים: $(cg)(A) = c(A)g(A) = cg(A)$.

משפט 6.9 (Cayley-Hamilton): תהי $A \in M_n(F)$ אז $f_A(A) = 0$.

הוכחה: נתבונן ב- $XI_n - A \in M_n(F[X])$. אז גם המינורים של $XI_n - A$ הם מטריצות מעל $F[X]$, ולכן,

לפי למה 6.1(א), גם $\text{adj}(XI_n - A) \in M_n(F[X])$. כידוע,

$$\text{adj}(XI_n - A)(XI_n - A) = \det(XI_n - A)I_n = f_A(X)I_n \quad (5)$$

לפי טענה 1.8 ההעתקה $\varphi: M_n(F)[X] \rightarrow M_n(F[X])$ הנתונה על ידי המשוואה

$$\left(\varphi \left(\sum_{\mu=0}^{\infty} A_{\mu} X^{\mu} \right) \right)_{ij} = \sum_{\mu=0}^{\infty} (A_{\mu})_{ij} X^{\mu}$$

$$, XI_n - A = \varphi(X - A) = \varphi(I_n X - AX^0) \quad , f_A(X)I_n = \varphi(f_A(X))$$

כאשר $f_A(X) \in F[X] \subseteq M_n(F)[X]$. כיון ש- φ על, יש פולינום $q(X) \in M_n(F)[X]$ כך ש-

$$\text{adj}(XI_n - A) = \varphi(q(X)) \quad \text{את (5) אפשר לכתוב כך:}$$

$$\varphi(q(X)(X - A)) = \varphi(q(X))\varphi(X - A) = \varphi(f_A(X))$$

לכן, כיון ש- φ חד חד ערכית,

$$q(X)(X - A) = f_A(X) \quad (6)$$

מכאן, לפי מסקנה 2.5 עבור החוג $R = M_n(F)$, מתקיים $f_A(A) = 0$. \blacksquare

מסקנה 6.10: יהי F שדה ותהי $A \in M_n(F)$. קיים פולינום $f \in F[X]$ $0 \neq f$ ממעלה $n \geq 0$ כך ש- $f(A) = 0$.

תרגיל 6.11: יהי F שדה ותהי $A \in M_n(F)$. הראה, מבלי להסתמך על משפט Cayley-Hamilton, שיש $g \in F[X]$ $0 \neq g$ ממעלה $n^2 \geq 0$ כך ש- $g(A) = 0$.

הוכחה: צ"ל: יש $a_0, a_1, \dots, a_{n^2} \in F$, כך שהפולינום $g(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_{n^2}X^{n^2}$ מקיים $g \neq 0$, $g(A) = 0$. כלומר, כך ש- $a_0, a_1, \dots, a_{n^2} \in F$ לא כולם אפס ו- $a_0I + a_1A + \dots + a_{n^2}A^{n^2} = 0$. במלים אחרות, צריך להוכיח: $I, A, \dots, A^{n^2} \in M_n(F)$ תלויות לינארית מעל F .
 וזה אכן נכון, כי $\dim M_n(F) = n^2$. ■

הגדרה 6.12: יהי F שדה ותהי $A \in M_n(F)$. פולינום $m_A(X) \in F[X]$ ייקרא פולינום מזערי של A אם $m_A(A) = 0$, הוא מתוקן ובעל מעלה מזערית מבין כל הפולינומים ב- $F[X]$ המאפסים את A והשוניים מאפס. (פולינומים כאלה קיימים לפי התרגיל או לפי המסקנה.)

למה 6.13: פולינום מזערי של A קיים והוא יחיד. (לכן הוא יקרא הפולינום המזערי של A .)

הוכחה: יהי k השלם הקטן ביותר עבורו יש $f \in F[X]$ $0 \neq f$ ממעלה k כך ש- $f(A) = 0$. אם נחלק את f במקדם העליון שלו, נקבל $m(X) \in F[X]$ מתוקן ממעלה k , כך שגם $m(A) = 0$. לכן m פולינום מזערי של A .
 אם גם $m'(X) \in F[X]$ מתוקן, ממעלה k , כך ש- $m'(A) = 0$, אז $m - m' \in F[X]$ ממעלה $k > 0$ ומתקיים $(m - m')(A) = 0$, ולכן בהכרח $m - m' = 0$, כלומר $m = m'$. ■

הערה: $\deg m_A \geq 1$; $m_A = X - \lambda$ אם ורק אם $A = \lambda I_n$.

משפט 6.14: לכל $f \in F[X]$ מתקיים: $f(A) = 0 \iff m_A | f$. בפרט, $m_A | f_A$.

הוכחה: יש $q, r \in F[X]$ יחידים כך ש-

$$f = qm_A + r, \quad \deg r < \deg m_A$$

מכאן

$$f(A) = q(A)m_A(A) + r(A) = q(A)0 + r(A) = r(A)$$

כעת, אם $m_A | f$ אז $r = 0$ ולכן $f(A) = r(A) = 0$. להיפך, אם $f(A) = 0$ אז $r(A) = 0$; בגלל המזעריות של $\deg m_A$ יוצא ש- $r = 0$. לכן $f = qm_A$, כלומר $m_A | f$. ■

משפט 6.15: תהי $A \in M_n(F)$ או $f_A | m_A^n$ בחוג $F[X]$.

הוכחה: $m_A(X) \in F[X] \subseteq M_n(F)[X]$ לפי מסקנה 2.5 יש $q(X) \in M_n(F)[X]$ כך ש-

$$m_A(X) = q(X)(X - A) \tag{7}$$

יהי $\varphi: M_n(F)[X] \rightarrow M_n(F[X])$ האיזומורפיזם שהוגדר קודם. אז $\varphi(X - A) = XI_n - A$, ויהי $\varphi(m_A(X)) = m_A(X)I_n$. אזי לפי (7)

$$m_A(X)I_n = B(XI_n - A)$$

ניקח דטרמיננטה משני האגפים ונקבל

$$m_A^n = (\det B)f_A(X)$$

היות ולפי למה 6.1 (א), $\det B \in F[X]$, מכאן המסקנה. ■

משפט 6.16: תהי $A \in M_n(F)$. אז ל- f_A ו- m_A אותם גורמים אי פריקים מתוקנים ב- $F[X]$. בפרט, אם

$$f_A = q_1^{k_1} q_2^{k_2} \cdots q_r^{k_r}$$

באשר $q_1, \dots, q_r \in F[X]$ אי פריקים מתוקנים שונים זה מזה, $k_1, \dots, k_r \geq 1$, אז

$$m_A = q_1^{\ell_1} q_2^{\ell_2} \cdots q_r^{\ell_r}$$

באשר $1 \leq \ell_i \leq k_i$ לכל $1 \leq i \leq r$.

הוכחה: יהי $q \in F[X]$ אי פריק מתוקן. אם $q|m_A$ אז $q|f_A$ כי $m_A|f_A$, לפי משפט 6.14. אם $q|f_A$ אז $q|m_A^n$, הוכחה: לפי משפט 6.15. מכאן (היות ו- q ראשוני) $q|m_A$. אם כן, הוכחנו: $q|f_A \iff q|m_A$.

הטענה שניה נובעת מהראשונה ומכך ש- $m_A|f_A$, לפי קריטריון ההתחלקות של תרגיל 3.20. ■

מסקנה 6.17: תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $\lambda \in F$. אז λ ערך עצמי של A אם ורק אם $m_A(\lambda) = 0$.

הוכחה: בסימונים של המשפט הקודם,

■ λ ע"ע של $A \iff f_A(\lambda) = 0 \iff$ יש $1 \leq i \leq r$ כך ש- $q_i(\lambda) = 0 \iff m_A(\lambda) = 0$.

תרגיל 6.18: ותהי $A \in M_3(\mathbb{R})$. הוכח: $A^2 \neq -I_3$.

הוכחה: יהי $f(X) = X^2 + 1$. נניח בשלילה $f(A) = 0$. אז $m_A|f$. אבל f אי פריק, מתוקן, לכן $m_A = f$. מכאן של- m_A אין שרשים ממשיים, לכן ל- A אין ערכים עצמיים ממשיים או, במילים אחרות, ל- f_A אין שרשים ממשיים. אבל $f_A \in \mathbb{R}[X]$ מתוקן ממעלה 3, לכן יש לו שורש ממשי. סתירה. ■

תרגיל 6.19: תהינה $M = \begin{pmatrix} A_1 & B & \cdots & C \\ 0 & A_2 & \cdots & D \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_n \end{pmatrix}$, $M' = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ B' & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ C' & D' & \cdots & A_n \end{pmatrix}$ מעל שדה F , באשר A_1, \dots, A_n מטריצות ריבועיות.

(א) הוכח ש- $\det(M') = \det(M) = \det(A_1) \cdots \det(A_n)$.

(ב) הוכח ש- $f_{M'} = f_M = f_{A_1} \cdots f_{A_n}$.

(ג) אם M מטריצת גושים באלכסון (כלומר, $B = \cdots = C = \cdots = D = 0$), הוכח ש- $\text{rank} M = \sum_i \text{rank} A_i$.

משפט 6.20: תהי $M = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_n \end{pmatrix}$ מטריצת גושים מעל שדה F , באשר A_1, \dots, A_n מטריצות ריבועיות. אזי m_M הוא הכפולה המשותפת הקטנה ביותר של m_{A_1}, \dots, m_{A_n} .

הוכחה: תחילה נשים לב שאם $g(X) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i \in F[X]$ פולינום כלשהו אז לפי מה שידוע לנו על כפל וחיבור של מטריצות של גושים

$$\begin{aligned} g(M) &= \sum_{i=0}^{\infty} a_i M^i = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \begin{pmatrix} A_1^i & & & \mathbf{0} \\ & \ddots & & \\ \mathbf{0} & & & A_n^i \end{pmatrix} = \sum_{i=0}^{\infty} \begin{pmatrix} a_i A_1^i & & & \mathbf{0} \\ & \ddots & & \\ \mathbf{0} & & & a_i A_n^i \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^{\infty} a_i A_1^i & & & \mathbf{0} \\ & \ddots & & \\ \mathbf{0} & & & \sum_{i=0}^{\infty} a_i A_n^i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g(A_1) & & & \mathbf{0} \\ & \ddots & & \\ \mathbf{0} & & & g(A_n) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

לפי כך: $g(A_1) = 0, \dots, g(A_n) = 0 \iff g(M) = 0$.

כלומר: $m_M | g \iff m_{A_1}, \dots, m_{A_n} | g \iff m_M | g$ ובעבור $g = h$ מכאן

■ $m_M = h$ וגם $m_M | h$ כיון ששניהם מתוקנים, $m_M = h$.

בהמשך יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי n מעל שדה F ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית.

הגדרה 6.21: הפולינום האופייני של T הוא הפולינום האופייני של המטריצה $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$, באשר \mathcal{B} בסיס סדור של V . (בפרט $\deg f_T = \dim V$).

הגדרה זו אינה תלויה בבסיס \mathcal{B} : אם \mathcal{A} בסיס סדור אחר של V , אז $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = P^{-1}[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}P$, באשר

$P \in M_n(F)$ הפיכה. לכן $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}, [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ דומות; לפי משפט 6.7 יש להן אותו פולינום אופייני.

הגדרה 6.22: עבור כל $g(X) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i \in F[X]$ מגדירים העתקה לינארית

$$g(T) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i T^i: V \rightarrow V$$

באשר T^0 היא הזהות של V ו- $T^i = \overbrace{T \circ T \circ \dots \circ T}^i$.

בדומה להגדרה 6.8 (מחליפים $M_n(F)$ ב- $L_F(V)$) מתקיים עבור $f, g \in F[X]$

$$(f+g)(T) = f(T) + g(T) \quad (fg)(T) = f(T)g(T) = f(T) \circ g(T)$$

בפרט $f(T) \circ g(T) = g(T) \circ f(T)$, כי $fg = gf$ ובפרט $f(T) \circ T = T \circ f(T)$

טענה 6.23: יהי \mathcal{B} בסיס סדור של V . אז $[g(T)]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = g([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}})$

הוכחה: ההעתקה $S \mapsto [S]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ מתוך $L(V, V)$ לתוך $M_n(F)$ שומרת חיבור, כפל וכפל בסקלר, לכן עבור

$$\blacksquare \quad [g(T)]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i [T^i]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i ([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}})^i = g([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}) \quad \text{מתקיים } g = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$$

משפט 6.24 (משפט Cayley-Hamilton להעתקות): $f_T(T) = 0$.

הוכחה: יהי \mathcal{B} בסיס סדור של V ותהי $C = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$. לפי ההגדרה, $f_T = f_C$. לפי טענה 6.23,

לכן $f_C(C) = 0$ (משפט 6.9) ולפי משפט קיילי-המילטון למטריצות $[f_T(T)]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = f_T(C) = f_C(C)$

$$\blacksquare \quad [f_T(T)]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = 0 \quad \text{ומכאן } f_T(T) = 0$$

הגדרה 6.25: יהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של T . הריבוי האלגברי של λ הוא המעריך k עמו מופיע $(X - \lambda)$ בפירוק של

f_T לחזקות של גורמים אי פריקים שונים. הריבוי הגיאומטרי של λ הוא המימד של $V_{\lambda} = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\}$.

■

למה 6.26: יהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של T . אז הריבוי הגיאומטרי של λ קטן או שווה לריבוי האלגברי של λ .

הוכחה: יהי $r = \dim V_{\lambda} \geq 1$ הריבוי הגיאומטרי של λ ויהי v_1, \dots, v_r בסיס של V_{λ} . נשלים אותו לבסיס

$v_1, \dots, v_r, w_1, \dots, w_s$ של V . אז $r + s = n$. המטריצה של T לפי בסיס זה היא

$$C = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 & & \\ 0 & \lambda & \dots & 0 & & \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot & & * \\ 0 & 0 & \dots & \lambda & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & & \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot & & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_r & A \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

לכן לפי תרגיל 6.19, $f_T(X) = f_C(X) = f_{\lambda I_r}(X) f_B(X) = (X - \lambda)^r f_B(X)$.

משפט 6.27: להעתקה $T: V \rightarrow V$ יש הצגה אלכסונית אם ורק אם f_T הוא מכפלה של גורמים ממעלה אחת ב- $F[X]$

ולכל ערך עצמי של T הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי שלו.

הוכחה: יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in F$ הערכים העצמיים השונים של T ולכל i יהי k_i הריבוי האלגברי של λ_i .

נניח שהתנאי מתקיים, כלומר, $f_T(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{k_i}$, $\dim V_{\lambda_i} = k_i$ לכל i . אם נצרף בסיסים סדורים של $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_r}$ לסדרה אחת, לפי מסקנה 4.11 נקבל סדרה \mathcal{B} בלתי תלויה לינארית של $\sum_{i=1}^r k_i = \deg f_T = \dim V$ וקטורים עצמיים של T . לכן \mathcal{B} בסיס של V ולפי מסקנה 4.8 ל- T הצגה אלכסונית.

להיפך, אם \mathcal{B} בסיס כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix}$, אז $f_T = f_{[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}} = \prod_{j=1}^n (X - \alpha_j)$

מכפלה של גורמים ממעלה 1. לכן $f_T(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{k_i}$. לפי משפט 4.7, אברי \mathcal{B} הם וקטורים עצמיים של T ולכן $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^r \mathcal{B}_i$, באשר $\mathcal{B}_i = \mathcal{B} \cap V_{\lambda_i}$ לכל i . לכל i מתקיים $\mathcal{B}_i \subseteq \mathcal{B}$, לכן $\dim V_{\lambda_j} < k_j$ אילו היה j כך ש- $k_j < \dim V_{\lambda_j}$ לפי למה 6.26.

■ $|\mathcal{B}_i| \leq \dim V_{\lambda_i} \leq k_i$ ולכן $|\mathcal{B}| = \sum_{i=1}^r |\mathcal{B}_i| < \sum_{i=1}^r k_i \leq \deg f_T = \dim V$ בסתירה לכך שבבסיס יש $\dim V$ אברים.

6.28 הגדרה: פולינום $m(X) \in F[X]$ ייקרא **פולינום מזערי של T** אם $m(T) = 0$ הוא מתוקן ובעל מעלה

מזערית מבין כל הפולינומים ב- $F[X]$ השונים מ-0 והמאפסים את T . אם הוא קיים ויחיד, נסמנו m_T .

משפט 6.29: פולינום מזערי של T קיים ויחיד. ביתר דיוק

(א) אם $V = \{0\}$, אז $m_T = 1$.

(ב) אם $V \neq \{0\}$, יהי \mathcal{B} בסיס של V ותהי $C = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$. אז $m_T = m_C$.

הוכחה: (א) לכל $m \in F[X]$ מתקיים $m(T) = 0$, כי אפס היא ההעתקה הלינארית היחידה $V \rightarrow V$.

(ב) יהי $g \in F[X]$. לפי טענה 6.23, $g(T) = 0 \iff [g(T)]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = 0 \iff g(C) = 0$. לכן מתוקן

וממעלה מזערית שמאפס את T אם ורק אם g מתוקן וממעלה מזערית שמאפס את C . מכאן הטענה.

משפט 6.30: למטריצות דומות אותו פולינום מזערי.

הוכחה א': אם $A, B \in M_n(F)$ דומות, קיים מרחב וקטורי V מעל F וקיימת העתקה $T: V \rightarrow V$ וקיימים

בסיסים \mathcal{A}, \mathcal{B} של V כך ש- $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = A, [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = B$. לפי משפט 6.29, $m_A = m_T = m_B$.

הוכחה ב': תהינה $A, P \in M_n(F)$, באשר P הפיכה. אז

$$(P^{-1}AP)^i = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) \cdots (P^{-1}AP) = P^{-1}A^iP$$

לכן לכל $g = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i \in F[X]$ מתקיים

$$g(P^{-1}AP) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i P^{-1}A^iP = P^{-1} \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i A^i \right) P = P^{-1}g(A)P$$

■ לכן $g(A) = 0 \iff g(P^{-1}AP) = 0$. מכאן המסקנה.

תרגיל 6.31: לכל $f \in F[X]$ מתקיים: $f(T) = 0 \iff m_T | f$.

הוכחה: זהו אנלוג של משפט 6.14, ואפשר להוכיח אותו באותו אופן אך אנו נסיק אותו מהמשפט: אם $V = \{0\}$ אז $f(T) = 0$ ו- $1 | f$ לכל $f \in F[X]$, לכן הטענה נכונה. אם $V \neq \{0\}$, יהי \mathcal{B} בסיס של V ותהי $C = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$. לפי טענה 6.23, $[f(T)]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = f(C)$. לכן $f(T) = 0 \iff f(C) = 0$. לפי משפט 6.14, $m_C | f \iff f(C) = 0$.
 אך לפי משפט 6.29 $m_T = m_C$. לכן $m_T | f \iff f(T) = 0$. ■

הגדרה 6.32: מטריצה $A \in M_n(F)$ נקראת **משולשית (עליונה)** אם $(A)_{ij} = 0$ לכל $i > j$, כלומר, A מהצורה

$$\blacksquare \quad A = \begin{pmatrix} a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \\ 0 & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

משפט 6.33: תהי $A \in M_n(F)$ ויהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$. אז יש מטריצה משולשית עליונה $C \in M_n(F)$ עם אלכסון ראשי $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ש- A דומה לה אם ורק אם $f_A(X) = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n)$.

הוכחה: \Leftarrow : נניח כי A דומה ל- C משולשית עליונה עם אלכסון ראשי $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. אז

$$f_A(X) = f_C(X) = \det \begin{pmatrix} X - \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & X - \lambda_n \end{pmatrix} = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n)$$

\Rightarrow : באינדוקציה על n . אם $n = 1$, כל $A \in M_1(F)$ משולשית. נניח $n > 1$. אז $f_A(\lambda_1) = 0$ לכן λ_1 ערך עצמי של A , כלומר, יש $v_1 \in F^n$, $v_1 \neq 0$ כך ש- $Av_1 = \lambda_1 v_1$. נשלים את v_1 לבסיס v_1, v_2, \dots, v_n של F^n ותהי $Q = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in M_n(F)$. אז Q הפיכה, כיון שעמודותיה בלתי תלויות לינארית, ו- $Q^{-1}v_1 = e_1$ כי $Qe_1 = v_1$ ולכן

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= Q^{-1}(Av_1, \dots, Av_n) = Q^{-1}(\lambda_1 v_1, Av_2, \dots, Av_n) = (\lambda_1 e_1, * \cdots *) = \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \cdots * \\ 0 & \\ \vdots & A_1 \\ 0 & \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (8)$$

באשר $A_1 \in M_{n-1}(F)$. מכאן לפי תרגיל 6.19 (ב)

$$(X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n) = f_A(X) = f_{Q^{-1}AQ}(X) = (X - \lambda_1) f_{A_1}(X)$$

ולכן

$$f_{A_1}(X) = (X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_n) \quad (9)$$

לפי הנחת האינדוקציה יש $Q_1 \in M_{n-1}(F)$ הפיכה כך ש-

$$Q_1^{-1}A_1Q_1 = \begin{pmatrix} \lambda_2 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (10)$$

נגדיר $Q_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{pmatrix} \in M_n(F)$ נשים לב ש- $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}$.
 לכן Q_2 הפיכה ו- $Q_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1^{-1} \end{pmatrix}$ מכאן שגם $P = QQ_2$ הפיכה. מתקיים

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= (Q_2^{-1}Q^{-1})A(QQ_2) = Q_2^{-1}(Q^{-1}AQ)Q_2 = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1Q_1 \end{pmatrix} = \\ \blacksquare \quad &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

מסקנה 6.34: אם F שדה סגור אלגברית, אז כל $A \in M_n(F)$ דומה למשולשית.

הוכחה: כיון ש- f_A מתוקן, לפי משפט 2.14, $f_A = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n)$. לכן לפי משפט 6.32, A דומה למשולשית. \blacksquare

מסקנה 6.35: יהי V מרחב וקטורי ממימד n מעל שדה F , תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית ויהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$.
 אז קיים בסיס \mathcal{B} של V כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ משולשית עם אלכסון ראשי $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ אם ורק אם
 $f_T = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n)$

הוכחה: $f_T = f_{[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}} = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n) \Leftrightarrow$
 \Rightarrow יהי \mathcal{A} בסיס כלשהו של V . אז $f_{[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}} = f_T$, לכן לפי המשפט $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ דומה למשולשית C עם אלכסון ראשי
 $\blacksquare \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. אז יש בסיס \mathcal{B} כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = C$.

בסעיף זה יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית. בכל מקום שמוזכר m_T נניח גם ש- V נוצר סופית (ואז m_T מוגדר).

הגדרה 7.1: תת מרחב W של V נקרא **שמורי** T אם $T(W) \subseteq W$, כלומר, אם $T(w) \in W$ לכל $w \in W$. במקרה כזה **הצמצום של T ל- W** , כלומר, ההעתקה $T': W \rightarrow W$ המוגדרת על ידי $T'(w) = T(w)$ לכל $w \in W$, היא העתקה לינארית; היא תסומן $T|_W$. ■

דוגמה 7.2: (א) $V, 0$ הם תת מרחבים שמורי- T לכל T .

(ב) אם λ ערך עצמי של T ו- W תת מרחב של V_λ (למשל, $W = V_\lambda$), אז W הוא שמורי- T ; אכן, אם $w \in W$ אז $T(w) = \lambda w \in W$.

(ג) אם $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ הוא הסיבוב בזווית θ סביב ציר ה- z , אז ציר ה- z ($\text{Sp}(e_3)$) הוא שמורי- T . גם מישורי- (x, y) , כלומר, $\text{Sp}(e_1, e_2)$, הוא שמורי- T . ■

תרגיל 7.3: תהיינה $T, S: V \rightarrow V$ שתי העתקות לינאריות כך ש- $TS = ST$. אז

(א) $\text{Ker}(S), \text{Im}(S)$ הם שמורי- T .

(ב) אם $W \subseteq V$ תת מרחב שמורי- T אז גם $S(W)$ תת מרחב שמורי- T .

(ג) אם $W_1, W_2 \subseteq V$ תת מרחבים שמורי- T אז גם $W_1 \cap W_2$ ו- $W_1 + W_2$ שמורי- T .

מסקנה 7.4: יהי $f \in F[X]$. אז $\text{Ker } f(T), \text{Im } f(T)$ הם תת מרחבים שמורי- T של V .

הוכחה: כפי שהערנו בהגדרה 6.22, $f(T) \circ T = T \circ f(T)$. לכן לפי תרגיל 7.3 (א) נובעת הטענה. ■

הגדרה 7.5: יהי V מרחב וקטורי ויהיו W_1, \dots, W_s תת מרחבים שלו. נאמר ש- V הוא **הסכום הישר** של W_1, \dots, W_s ונכתוב זאת כך: $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$ אם לכל $v \in V$ יש הצגה יחידה מהצורה

$$\blacksquare \quad v = w_1 + \dots + w_s, \quad w_1 \in W_1, \dots, w_s \in W_s$$

משפט 7.6: יהי V מרחב וקטורי ויהיו W_1, \dots, W_s תת מרחבים שלו. לכל $1 \leq i \leq s$ יהי $\mathcal{B}_i = (w_{i1}, \dots, w_{in_i})$ בסיס סדור של W_i (באשר $n_i = \dim W_i$). אזי $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$ אם ורק אם צירוף הבסיסים האלה

$$\mathcal{B} = (w_{11}, \dots, w_{1n_1}, \dots, w_{s1}, \dots, w_{sn_s})$$

הוא בסיס של V .

הוכחה: תרגיל. ראה גם "אלגברה לינארית" של ליפשיץ, תרגיל 10.7. ■

תרגיל 7.7: יהי W תת מרחב שמור- T של V ויהיו $f, g \in F[X]$.

(א) הוכח כי W שמור- $g(T)$.

(ב) הוכח כי $f(T)(W)$ שמור- $g(T)$.

(ג) אם $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$, באשר W_1, \dots, W_s שמורי- T , אז

$$f(T)(V) = f(T)(W_1) \oplus \dots \oplus f(T)(W_s)$$

משפט 7.8: נניח כי $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$. לכל $1 \leq i \leq s$ יהי $\mathcal{B}_i = (w_{i1}, \dots, w_{in_i})$ בסיס של W_i , כך

ש- $\mathcal{B} = (w_{11}, \dots, w_{1n_1}, \dots, w_{s1}, \dots, w_{sn_s})$ בסיס של V .

(א) נרשום את $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ כמטריצת גושים, $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = (A_{ij})$, באשר $A_{ij} \in M_{n_i \times n_j}(F)$ לכל $1 \leq i, j \leq s$. נקבע

$1 \leq j \leq s$. אז W_j שמור- T אם ורק אם $A_{ij} = 0$ לכל $i \neq j$. אם תנאים שקולים אלה מתקיימים, אז

$$A_{jj} = [T|_{W_j}]_{\mathcal{B}_j}^{\mathcal{B}_j}$$

(ב) W_1, \dots, W_s שמורי- T אם ורק אם $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_s \end{pmatrix}$ באשר $A_j \in M_{n_j}(F)$ לכל $1 \leq j \leq s$.

(ג) אם התנאי השקולים ב-(ב) מתקיימים, אז $A_j = [T|_{W_j}]_{\mathcal{B}_j}^{\mathcal{B}_j}$ לכל $1 \leq j \leq s$.

הוכחה: (א) לפי ההגדרה של $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$, $(A_{ij})_{kl}$ הוא המקדם בפיתוח של $T(w_{jl})$, כצירוף לינארי של אברי \mathcal{B} ,

שעומד לפני w_{ik} . לכן $A_{ij} = 0$ לכל $i \neq j$ אם ורק אם $(A_{ij})_{kl} = 0$ לכל k, l ולכל $i \neq j$ אם ורק אם

$$T(W_j) \subseteq W_j \text{ אם ורק אם } T(w_{jl}) \in \text{Sp}(w_{jk} | 1 \leq k \leq n_j) = W_j$$

אם W_j שמור- T ולכן $T|_{W_j}$ מוגדר, אז $([T|_{W_j}]_{\mathcal{B}_j}^{\mathcal{B}_j})_{kl}$ הוא המקדם בפיתוח של $T(w_{jl})$ כצירוף לינארי

של אברי \mathcal{B}_j שעומד לפני w_{jk} . לפי המשפט הראשון של הוכחה, $A_{jj} = [T|_{W_j}]_{\mathcal{B}_j}^{\mathcal{B}_j}$.

■ (ב), (ג) נובעים מ-(א).

מסקנה 7.9: נניח כי $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_s$, באשר W_1, \dots, W_s הם שמורי- T . נסמן $T_i = T|_{W_i}$ לכל

$1 \leq i \leq s$ אז

$$f_T(X) = f_{T_1}(X) \cdots f_{T_s}(X)$$

$$m_T(X) = \text{lcm}(m_{T_1}(X) \cdots m_{T_s}(X))$$

הוכחה: בסימונים של המשפט תהי $A = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$. אז $f_T = f_A, m_T = m_A, f_{T_i} = f_{A_i}, m_{T_i} = m_{A_i}$ ו-

לכל i . לכן צריך להוכיח

$$f_A(X) = f_{A_1}(X) \cdots f_{A_s}(X)$$

$$m_A(X) = \text{lcm}(m_{A_1}(X) \cdots m_{A_s}(X))$$

■ וזה נכון לפי תרגיל 6.19 ומשפט 6.20, כי $A = \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_s \end{pmatrix}$

למה 7.10: יהי $W \subseteq V$ תת מרחב שמור- T . יהי $S = T|_W: W \rightarrow W$ הצמצום של T ל- W . אז

(א) יהי $f \in F[X]$. אז לכל $w \in W$ מתקיים $f(S)(w) = f(T)(w)$. כלומר, $f(T|_W) = f(T)|_W$.

(ב) $m_S | m_T$

הוכחה: (א) תחילה נראה באינדוקציה כי $S^i(w) = T^i(w) \in W$ לכל $i \geq 0$. ואכן, עבור $i = 0$,

$S^0(w) = w = T^0(w)$, לכן $S^0 = 1_W, T^0 = 1_V$. נניח נכונות עבור $i - 1$, אז

$$S^i(w) = S(S^{i-1}(w)) = S(T^{i-1}(w)) = T(T^{i-1}(w)) = T^i(w)$$

מכאן שאם $f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$ אז

$$f(S)(w) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i S^i \right)(w) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i S^i(w) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i T^i(w) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i T^i \right)(w) = f(T)(w)$$

(ב) לפי תרגיל 6.31 די להוכיח כי $m_T(S) = 0$. ואכן, $m_T(S)(w) = m_T(T)(w) = 0(w) = 0$ לכל

■ $w \in W$, כלומר, $m_T(S) = 0$.

משפט 7.11: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית. יהיו $g, h \in F[X]$ זרים (כלומר

המחלק המשותף הגדול ביותר שלהם הוא 1) כך ש- $(gh)(T) = 0$. אז $V = \text{Ker } g(T) \oplus \text{Ker } h(T)$.

הוכחה: היות רי- g, h זרים, יש $r, s \in F[X]$ כך ש- $rg + sh = 1$. מכאן

$$r(T)g(T) + s(T)h(T) = 1_V \quad (1)$$

יהי $v \in V$. לפי (1)

$$v = 1_V(v) = r(T)g(T)(v) + s(T)h(T)(v)$$

אבל $r(T)g(T)(v) \in \text{Ker } h(T)$, כי

$$h(T)r(T)g(T)(v) = r(T)g(T)h(T)(v) = r(T)(gh)(T)(v) = r(T)(0) = 0$$

ובאופן דומה $s(T)h(T)(v) \in \text{Ker } g(T)$. לכן ל- v יש הצגה

$$v = u + w, \quad u \in \text{Ker } g(T), \quad w \in \text{Ker } h(T) \quad (2)$$

נניח שהצגה (2) קיימת ונראה שהיא יחידה. לפי (2)

$$r(T)g(T)(v) = r(T)g(T)(u) + r(T)g(T)(w) = 0 + r(T)g(T)(w)$$

ואם נפעיל את שני האגפים של (1) על w , נקבל

$$.w = 1_V(w) = r(T)g(T)(w) + s(T)h(T)(w) = r(T)g(T)(w) + 0$$

משתי המשוואות האחרונות קיבלנו $w = r(T)g(T)(v)$, כלומר, w נקבע באופן יחיד על ידי v . באופן דומה גם u יחיד. ■

מסקנה 7.12: יהיו $g, h \in F[X]$ מתוקנים וזרים כך ש- $gh = m_T$. נסמן ב- T_1, T_2 את הצמצומים של T ל- $\text{Ker } g(T), \text{Ker } h(T)$ בהתאמה. אז $g = m_{T_1}, h = m_{T_2}$.

הוכחה: $g(T_1) = 0$ כי לכל $u \in \text{Ker } g(T)$ מתקיים $g(T_1)(u) = g(T)(u) = 0$. לכן לפי תרגיל 6.31, $g = rm_{T_1}$, כלומר $g = rm_{T_1}$, באשר $r \in F[X]$; בהכרח r מתוקן. באותו אופן $h = sm_{T_2}$, באשר $s \in F[X]$ מתוקן. כעת, לפי מסקנה 7.9,

$$rsm_{T_1}m_{T_2} = gh = m_T = \text{lcm}(m_{T_1}, m_{T_2}) | m_{T_1}m_{T_2}$$

ומכאן ברור ש- $r|s$, כלומר $r = s = 1$. לכן המסקנה. ■

משפט 7.13 (הפירוק הפרמירי): יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית כך ש- $m_T = g_1 \cdots g_s$ באשר g_1, \dots, g_s מתוקנים וזרים זה לזה. נסמן $W_i = \text{Ker } g_i(T)$, עבור $i = 1, \dots, s$. אז

$$(א) \quad V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s \text{ באשר } W_1, \dots, W_s \text{ שמוריי } T;$$

$$(ב) \quad g_i = m_{T|_{W_i}} \text{ לכל } i = 1, \dots, s$$

הוכחה באינדוקציה על s . אם $s = 1$ אז $W_1 = V$ והכל ברור. נניח נכונות עבור $s - 1$. היות ושני הפולינומים $g_1, g_2 \cdots g_s$ זרים, לפי המשפט הקודם מתקיים $V = W_1 \oplus V'$, באשר $W_1 = \text{Ker } g_1(T)$, $V' = \text{Ker}(g_2 \cdots g_s)(T)$. כמו כן, W_1, V' הם שמוריי T . נסמן $S = T|_{V'}$. לפי המסקנה, $m_S = g_2 \cdots g_s$. $m_{T|_{W_1}} = g_1$

לפי הנחת האינדוקציה $V' = W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$, באשר $W_i = \text{Ker } g_i(S)$ ו- $g_i = m_{S|_{W_i}}$ לכל $i = 2, \dots, s$. מכאן לפי משפט 7.6, $V = W_1 \oplus (W_2 \oplus \cdots \oplus W_s) = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$, יהי $2 \leq i \leq s$. ברור ש- $T|_{W_i} = S|_{W_i}$ ולכן $g_i = m_{T|_{W_i}}$. נותר להוכיח כי $\text{Ker } g_i(S) = \text{Ker } g_i(T)$. אך

$$(g_2 \cdots g_s)(T) = (g_2 \cdots g_{i-1}g_{i+1} \cdots g_s g_i)(T) = (g_2 \cdots g_{i-1}g_{i+1} \cdots g_s)(T)g_i(T)$$

לכן $\text{Ker } g_i(T) \subseteq \text{Ker}(g_2 \cdots g_s)(T) = V'$ לפי 7.10

$$\blacksquare \quad \text{Ker } g_i(T) = \{v \in V' \mid g_i(T)(v) = 0\} = \{v \in V' \mid g_i(S)(v) = 0\} = \text{Ker } g_i(S)$$

השימוש העיקרי של המשפט: אם $m_T = q_1^{r_1} \cdots q_s^{r_s}$, באשר q_1, \dots, q_s אי פריקים מתוקנים שונים,

נקח $g_i = q_i^{r_i}$ אז g_1, \dots, g_s זורים.

מסקנה 7.14 (מטריצה לפי פירוק פרימרי): יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית.

נניח כי $m_T = q_1^{r_1} \cdots q_s^{r_s}$, באשר q_1, \dots, q_s פולינומים אי פריקים מתוקנים שונים $r_1, \dots, r_s \geq 1$ נסמן

$$W_i = \text{Ker } q_i^{r_i}(T) \text{ לכל } i \text{ אזי}$$

(א) צירוף \mathcal{B} של בסיסים $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_s$ של W_1, \dots, W_s , בהתאמה, הוא בסיס של V שמקיים

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \text{Diag}(A_1, \dots, A_s), \text{ באשר } [T|_{W_i}]_{\mathcal{B}_i}^{\mathcal{B}_i} = A_i \text{ לכל } i$$

(ב) יהי \mathcal{B} בסיס של V כן ש־ $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \text{Diag}(A_1, \dots, A_t)$, באשר m_{A_1}, \dots, m_{A_t} חזקות של פולינומים אי פריקים

מתוקנים שונים. נניח כי $A_i \in M_{n_i}(F)$ לכל i . נכתוב את \mathcal{B} כצירוף (שרשור) של סדרות $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_t$, באשר

$$|\mathcal{B}_i| = n_i \text{ לכל } i \text{ אז } t = s \text{ ומתקיים לכל } i, \text{ עד כדי הסדר: } \mathcal{B}_i \text{ בסיס של } W_i, [T|_{W_i}]_{\mathcal{B}_i}^{\mathcal{B}_i} = A_i, m_{A_i} = q_i^{r_i}$$

הוכחה: (א) זה נובע ממשפט 7.13: לפי משפט 7.6, \mathcal{B} אכן בסיס של V . לפי משפט 7.8, $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} =$

$$\text{Diag}(A_1, \dots, A_s), \text{ באשר } [T|_{W_i}]_{\mathcal{B}_i}^{\mathcal{B}_i} = A_i \text{ לכל } i. \text{ מכאן לפי משפט 6.29, } m_{A_i} = m_{T|_{W_i}} = q_i^{r_i}$$

(ב) לפי משפט 6.20, וכיון ש־ m_{A_1}, \dots, m_{A_t} זורים,

$$q_1^{r_1} \cdots q_s^{r_s} = m_T = \text{lcm}(m_{A_1}, \dots, m_{A_t}) = m_{A_1} \cdots m_{A_t}$$

לפי יחידות הפירוק לגורמים אי פריקים $t = s$ ו־ $m_{A_i} = q_i^{r_i}$ עד כדי הסדר. לפי משפט 7.6 מתקיים

$V = \text{Sp}(\mathcal{B}_1) \oplus \cdots \oplus \text{Sp}(\mathcal{B}_t)$ ו־ $\text{Sp}(\mathcal{B}_i)$ הוא שמורת־ T לכל i . לפי משפט 7.8, $[T|_{\text{Sp}(\mathcal{B}_i)}]_{\mathcal{B}_i}^{\mathcal{B}_i} = A_i$. לכן

אם $v \in \mathcal{B}_i$, אז לפי מסקנה 7.10, $q_i^{r_i}(T)(v) = q_i^{r_i}(T|_{\text{Sp}(\mathcal{B}_i)})(v) = 0$, לכן $m_{T|_{\text{Sp}(\mathcal{B}_i)}} = m_{A_i} = q_i^{r_i}$

כלומר, $v \in W_i$, מכאן $\text{Sp}(\mathcal{B}_i) \subseteq W_i$, ובפרט $|\mathcal{B}_i| \leq \dim W_i$. אבל $\sum_i \dim W_i = n = \sum_i |\mathcal{B}_i|$, לכן

$$\blacksquare \quad |\mathcal{B}_i| = \dim W_i \text{ לכל } i. \text{ לכן } \mathcal{B}_i \text{ בסיס של } W_i$$

משפט 7.15: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית. אזי יש בסיס \mathcal{B} של V כן ש־ $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$

אלכסונית אם ורק אם $m_T = (X - \mu_1) \cdots (X - \mu_s)$, באשר $\mu_1, \dots, \mu_s \in F$ שונים זה מזה.

$$\text{הוכחה: נניח } A = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$m_T = m_A = \text{lcm}(m_{(\lambda_1)}, \dots, m_{(\lambda_n)}) = \text{lcm}(X - \lambda_1, \dots, X - \lambda_n)$$

לכן $m_T = (X - \mu_1) \cdots (X - \mu_s)$, באשר μ_1, \dots, μ_s כל האברים השונים בקבוצה $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$.
 להיפך, נניח כי $m_T = (X - \mu_1) \cdots (X - \mu_s)$, באשר $\mu_1, \dots, \mu_s \in F$ שונים זה מזה. לפי משפט 7.13, $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$, באשר

$$W_i = \text{Ker}(T - \mu_i 1_V) = \{v \in V \mid T(v) = \mu_i v\} = V_{\mu_i}$$

זה אומר שאיחוד הבסיסים של $V_{\mu_1}, \dots, V_{\mu_s}$ הוא בסיס של V , לכן ל- V יש בסיס \mathcal{B} מורכב מוקטורים עצמיים של V . מכאן, לפי מסקנה 4.8, $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית. ■

מסקנה 7.16: $A \in M_n(F)$ דומה למטריצה אלכסונית אם ורק אם $m_A(X) = (X - \mu_1) \cdots (X - \mu_s)$ באשר $\mu_1, \dots, \mu_s \in F$ שונים זה מזה.

הוכחה: יש מרחב וקטורי V מעל F , העתקה לינארית $T: V \rightarrow V$, ובסיס \mathcal{C} של V כך ש- $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} = A$. לפי משפט 6.29, $m_T = m_A$.

מטריצה D (כלשהי) דומה ל- A אם ורק אם יש בסיס \mathcal{B} של V כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = D$. לכן A דומה למטריצה אלכסונית אם ורק אם יש בסיס \mathcal{B} של V כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית. לפי משפט 7.15, (ובגלל ש- $m_T = m_A$) זה שקול לתנאי המבוקש על m_A . ■

בסעיף זה יהי V מרחב וקטורי בעל מימד סופי מעל שדה F ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית. (חלק מהחומר נכון גם עבור V בעל מימד אינסופי, אך לא נציין זאת במפורש.)

הגדרה 8.1: יהי $\lambda \in F$.

$$(א) \quad \text{נקראת גוש ז'ורדן מסדר } n \text{ השייך ל-}\lambda \text{ ותסומן } J_n(\lambda) \text{ המטריצה } \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \lambda \end{pmatrix} \in M_n(F)$$

$$(ב) \quad \text{מטריצה מהצורה } J(\lambda) = \begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{n_t}(\lambda) \end{pmatrix} \text{ באשר } n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_t \geq 1 \text{ נקראת מערך ז'ורדן השייך ל-}\lambda \text{ המספר } n_1 \text{ נקרא האינדקס של המערך.}$$

$$(ג) \quad \text{מטריצת ז'ורדן היא מטריצה מהצורה } J = \begin{pmatrix} J(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J(\lambda_s) \end{pmatrix} \text{ באשר } \lambda_1, \dots, \lambda_s \in F \text{ שונים זה מזה ולכל } 1 \leq i \leq s \text{ המטריצה } J(\lambda_i) \text{ היא מערך ז'ורדן השייך ל-}\lambda_i \text{.}$$

בסוף הפרק הזה נוכיח את המשפט המרכזי הבא:

משפט 8.2: נניח $m_T = (X - \lambda_1)^{r_1} \cdots (X - \lambda_s)^{r_s}$ באשר $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in F$ שונים ו- $r_1, \dots, r_s \geq 1$. אז קיימת מטריצת ז'ורדן יחידה (עד כדי סדר מערכיה) J עבורה יש בסיס \mathcal{B} של V כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = J$. (מטריצה זו נקראת צורת ז'ורדן של T). יש s מערכי ז'ורדן, כאשר (עד כדי הסדר) המערך ה- i שייך ל- λ_i ובעל אינדקס r_i .

ממנו נובעת מיידית:

מסקנה 8.3: תהי $A \in M_n(F)$. נניח $m_A = (X - \lambda_1)^{r_1} \cdots (X - \lambda_s)^{r_s}$ באשר $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in F$ שונים ו- $r_1, \dots, r_s \geq 1$. אז קיימת מטריצת ז'ורדן יחידה (עד כדי סדר מערכיה) J דומה ל- A . (מטריצה זו נקראת צורת ז'ורדן של A). יש s מערכי ז'ורדן, כאשר (עד כדי הסדר) המערך ה- i שייך ל- λ_i ובעל אינדקס r_i .

דוגמה 8.4: אם $A \in M_5(F)$ ו- $m_A = X^2(X - 1)^2$, אז צורת ז'ורדן שלה (=מטריצת ז'ורדן שדומה לה) היא

$$, \begin{pmatrix} J_2(0) & 0 & 0 \\ 0 & J_2(1) & 0 \\ 0 & 0 & J_1(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$. \begin{pmatrix} J_2(0) & 0 & 0 \\ 0 & J_1(0) & 0 \\ 0 & 0 & J_2(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמה 8.5: שתי המטריצות הבאות הן מטריצות ז'ורדן שונות (ממש, לא רק עד כדי סדר המערכים).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

לכן אינן דומות, לפי היחידות במסקנה 8.3. אך מתקיים $f_A = f_B = (X - 1)^4$ ו- $m_A = m_B = (X - 1)^2$.

■ זה מראה שהפולינום האופייני והמזערי אינם קובעים את צורת ז'ורדן.

הערה 8.6: העלאה בחזקה של מטריצת ז'ורדן. תחילה תהי

$$.N = J_n(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_n, 0)$$

מכיון ש- $Ne_n = 0, Ne_{n-1} = e_n, \dots, Ne_2 = e_3, Ne_1 = e_2$, קל לראות (באינדוקציה על k) כי

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$N^{n-2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^{n-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

ו- $N^k = 0$ לכל $k \geq n$.

כעת נשים לב ש- $J_n(\lambda) = N + \lambda I_n$, באשר N כמו לעיל. כיון ש- $(\lambda I_n)N = N(\lambda I_n)$, מתקיים

$$J_n(\lambda)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} N^i (\lambda I_n)^{k-i} = \sum_{i=0}^k \lambda^{k-i} \binom{k}{i} N^i = \sum_{i=0}^{\infty} \lambda^{k-i} \binom{k}{i} N^i =$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda^k & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \binom{k}{1} \lambda^{k-1} & \lambda^k & \ddots & & \vdots \\ \binom{k}{2} \lambda^{k-2} & \binom{k}{1} \lambda^{k-1} & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ \binom{k}{n-2} \lambda^{k-(n-2)} & & \binom{k}{1} \lambda^{k-1} & \lambda^k & 0 \\ \binom{k}{n-1} \lambda^{k-(n-1)} & \binom{k}{n-2} \lambda^{k-(n-2)} & \cdots & \binom{k}{1} \lambda^{k-1} & \lambda^k \end{pmatrix}$$

(כאשר יש לזכור ש- $\binom{k}{i} = 0$ עבור $i > k$).

כעת, מטריצת ז'ורדן כלשהי J היא מטריצת גושים באלכסון, כאשר כל גוש מצורה $J_n(\lambda)$ עבור איזה $n \geq 0$

ואיזה $\lambda \in F$. לכן J^k היא מטריצת גושים באלכסון, כאשר כל גוש מצורה $J_n(\lambda)^k$.

בסוף, תהי $A \in M_n(F)$ ונניח שאנו יודעים למצוא $P \in M_n(F)$ הפיכה כך ש- $J = P^{-1}AP$ מטריצת

ז'ורדן (ראה מסקנה 8.3). אז $A = PJP^{-1}$, ולכן

$$A^k = (PJP^{-1})^k = PJ^kP^{-1}$$

■ מכאן, לפי הפסקה הקודמת, נוכל לחשב את A^k , גם עבור k גדול מאד.

מסקנה 8.7: תהי J מטריצת ז'ורדן, יהי $\lambda \in F$ ויהי $k \geq 0$ שלם.

$$\text{rank} J_n(\lambda)^k = n \text{ אם } \lambda \neq 0; \text{rank} J_n(0)^k = \begin{cases} n-k & k \leq n \\ 0 & k > n \end{cases} \quad (\text{א})$$

$$\text{rank}(J - \lambda I)^{k-1} - \text{rank}(J - \lambda I)^k \quad (\text{ב}) \quad k \leq \text{הינם מסדר } k$$

הוכחה: (א) נובע מהערה 8.6.

(ב) נניח תחילה כי J גוש ז'ורדן, $J = J_n(\mu)$, אז $J - \lambda I = J_n(\mu - \lambda)$ גם גוש ז'ורדן. לפי (א),

$$\text{rank}(J - \lambda I)^{k-1} - \text{rank}(J - \lambda I)^k = \begin{cases} 1 & k \leq n \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}, \mu = \lambda \quad (1)$$

באופן כללי $J = \text{Diag}(J_1, \dots, J_m)$, באשר J_1, \dots, J_m גושי ז'ורדן. אז

$$(J - \lambda I)^k = \text{Diag}((J_1 - \lambda I)^k, \dots, (J_m - \lambda I)^k) \text{ לכן } J - \lambda I = \text{Diag}(J_1 - \lambda I, \dots, J_m - \lambda I)$$

לפי תרגיל 6.19(ג), $\text{rank}(J - \lambda I)^k = \sum_i \text{rank}(J_i - \lambda I)^k$ ואותה הנוסחה תקפה עם $k-1$ במקום k . לכן

$$\text{rank}(J - \lambda I)^{k-1} - \text{rank}(J - \lambda I)^k = \sum_i (\text{rank}(J_i - \lambda I)^{k-1} - \text{rank}(J_i - \lambda I)^k)$$

מכאן לפי (1) המסקנה. ■

מסקנה 8.8: תהי J מטריצת ז'ורדן.

$$m_{J_n(\lambda)} = (X - \lambda)^n \quad (\text{א})$$

(ב) נניח שמערכי J שייכים ל- $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in F$ השונים זה מזה והם בעלי אינדקסים r_1, \dots, r_s , בהתאמה. אז

$$m_J = (X - \lambda_1)^{r_1} \dots (X - \lambda_s)^{r_s}$$

(ג) נניח ש- $m_J = (X - \lambda_1)^{r_1} \dots (X - \lambda_s)^{r_s}$, באשר $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in F$ השונים זה מזה ו- $r_1, \dots, r_s \geq 1$.

אז מערכי J שייכים ל- $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, והם בעלי אינדקסים r_1, \dots, r_s , בהתאמה.

הוכחה: (א) תהי $N = J_n(\lambda) - \lambda I$. ראינו בהערה 8.6, כי $N^n = 0$, אך $N, N^2, \dots, N^{n-1} \neq 0$. כלומר,

$(X - \lambda)^n$ מאפס את $J_n(\lambda)$, אך $(X - \lambda)^{n-1}, \dots, (X - \lambda)^2, (X - \lambda)$ לא. לכן $m_{J_n(\lambda)}$ מחלק את

$$m_{J_n(\lambda)} = (X - \lambda)^n, \text{ אך אינו } (X - \lambda), (X - \lambda)^2, \dots, (X - \lambda)^{n-1}. \text{ לכן } m_{J_n(\lambda)} = (X - \lambda)^n$$

(ב) נובע מ-(א) לפי מסקנה 7.9.

(ג) נניח שמערכי J שייכים ל- $\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_t \in F$ שונים זה מזה והם בעלי אינדקסים $\bar{r}_1, \dots, \bar{r}_t$, בהתאמה.

לפי (ב), $m_J = (X - \bar{\lambda}_1)^{\bar{r}_1} \dots (X - \bar{\lambda}_t)^{\bar{r}_t}$, בגלל יחידות הפירוק של m_J לגורמים אי פריקים מתקיים $t = s$

ו- $\lambda_1 = \bar{\lambda}_1, \dots, \lambda_r = \bar{\lambda}_s$, ו- $r_1 = \bar{r}_1, \dots, r_s = \bar{r}_s$, עד כדי הסדר. ■

מסקנה 8.9: אם \mathcal{B} בסיס של V כג ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ $J = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ מטריצת ז'ורדן, אז מספר גושי ז'ורדן של J הוא

$$\text{rank}(T - \lambda 1_V)^{k-1} - 2\text{rank}(T - \lambda 1_V)^k + \text{rank}(T - \lambda 1_V)^{k+1}$$

בפרט, J יחידה, עד כדי סדר מערכיה (כפי שנטען במשפט 8.2).

הוכחה: לפי מסקנה 8.7(ב), מספר גושי ז'ורדן ב- J מסדר k השייכים ל- λ הוא

$$\begin{aligned} & (\text{rank}(J - \lambda I)^{k-1} - \text{rank}(J - \lambda I)^k) - (\text{rank}(J - \lambda I)^k - \text{rank}(J - \lambda I)^{k+1}) = \\ & \text{rank}(J - \lambda I)^{k-1} - 2\text{rank}(J - \lambda I)^k + \text{rank}(J - \lambda I)^{k+1} \end{aligned}$$

אך לכל m שלם מתקיים $(J - \lambda I)^m = ([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} - \lambda[1_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}})^m = [(T - \lambda 1_V)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}]^m$, לכן $\text{rank}(J - \lambda I)^m = \text{rank}(T - \lambda 1_V)^m$. ■

לבסוף נתאר דרך למציאת בסיס \mathcal{B} של V כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ מטריצת ז'ורדן. זה גם יוכיח את הקיום במשפט 8.2.

הגדרה 8.10: סדרה $v_1, \dots, v_n \in V$ נקראת **שושרת ז'ורדן של T השייכת ל- λ** אם

$$T(v_1) = \lambda v_1 + v_2, T(v_2) = \lambda v_2 + v_3, \dots, T(v_{n-1}) = \lambda v_{n-1} + v_n, T(v_n) = \lambda v_n$$

תרגיל 8.11: יהי W תת מרחב שמור- T של V ויהי \mathcal{B} בסיסו. אז $[T|_W]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = J_n(\lambda)$ אם ורק אם \mathcal{B} שרשרת ז'ורדן של T השייכת ל- λ .

הגדרה 8.12: יהי $W \subseteq V$ תת מרחב. סדרה $v_1, \dots, v_k \in V$ נקראת

(א) בתל"מ W (= **בלתי תלויים לינארית מודולו W**) אם לכל $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ מתקיים

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i \in W \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$$

(ב) **פורשת V מודולו W** אם לכל $v \in V$ יש $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ כך ש- $v = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i$.

(ג) **בסיס של V מודולו W** אם היא בתל"מ W וגם פורשת V מודולו W . ■

למה 8.13: יהי w_1, \dots, w_l בסיס של W . אזי

(א) $v_1, \dots, v_k \in V$ בתל"מ $W \iff w_1, \dots, w_l, v_1, \dots, v_k$ בת"ל.

(ב) $v_1, \dots, v_k \in V$ פורשת V מודולו $W \iff w_1, \dots, w_l, v_1, \dots, v_k$ פורשת V .

(ג) $v_1, \dots, v_k \in V$ בסיס של V מודולו $W \iff w_1, \dots, w_l, v_1, \dots, v_k$ בסיס של V .

(ד) אם $\dim V < \infty$, כל סדרה בתל"מ W ב- V ניתנת להשלמה לבסיס של V מודולו W .

(ה) (סדרה בת איבר אחד): $v \in V$ בתל"מ $W \iff v \notin W$.

הוכחה: (א) " \Leftarrow ": נניח כי

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i + \sum_{j=1}^l \beta_j w_j = 0 \tag{8}$$

אז $W = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = -\sum_{j=1}^l \beta_j w_j \in W$ לכן $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$ נציב זאת ב-(8) ונקבל
 $\beta_1 = \dots = \beta_l = 0$ כיון ש- w_1, \dots, w_l בת"ל.

" \Rightarrow ": נניח $\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i \in W$ אז יש $\beta_1, \dots, \beta_l \in F$ כך ש- $\sum_{j=1}^l \beta_j w_j = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i$ במלים
 אחרות, $\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i + \sum_{j=1}^l (-\beta_j) w_j = 0$, לפי הנתון, $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

(ב) " \Leftarrow ": יהי $v \in V$ לפי ההנחה יש $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ כך ש- $\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i \in W$ לכן יש

$\beta_1, \dots, \beta_l \in F$ כך ש- $\sum_{j=1}^l \beta_j w_j = v - \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i$ מכאן $v = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i + \sum_{j=1}^l \beta_j w_j$
 \Rightarrow יהי $v \in V$ נתון שיש $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_l \in F$ כך ש- $v = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i + \sum_{j=1}^l \beta_j w_j$
 מכאן $v - \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = \sum_{j=1}^l \beta_j w_j \in W$
 (ג), (ד) נובעים מ-(א), (ב).

(ה) " \Leftarrow ": נניח (בשלילה) כי $v \in W$ אז $v \neq 0, 1v \in W$ סתירה.

■ " \Rightarrow ": נניח $\alpha v \in W$ אם $\alpha \neq 0$ אז $v = \alpha^{-1}(\alpha v) \in W$ סתירה. לכן $\alpha = 0$

למה 8.14: תהי $N: V \rightarrow V$ העתקה לינארית ויהי $i \geq 1$

$$\{0\} = \text{Ker } N^0 \subseteq \text{Ker } N \subseteq \text{Ker } N^2 \subseteq \dots \quad (\text{א})$$

$$N(v) \in \text{Ker } N^{i-1} \iff v \in \text{Ker } N^i \quad (\text{ב})$$

(ג) אם $v_1, \dots, v_k \in V$ בתל"מ $\text{Ker } N^i$ אז $N(v_1), \dots, N(v_k)$ בתל"מ $\text{Ker } N^{i-1}$.

הוכחה:

(א) ברור.

$$N^{i-1}(N(v)) = 0 \iff N^i(v) = 0 \quad (\text{ב})$$

(ג) נניח $\sum_j \alpha_j N(v_j) \in \text{Ker } N^{i-1}$ אז $N(\sum_j \alpha_j v_j) \in \text{Ker } N^{i-1}$ לפי (ב) מתקיים

$$\sum_j \alpha_j v_j \in \text{Ker } N^i \quad \text{לכן } \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$$

בניה 8.15: נניח $m_T = (X - \lambda_1)^{r_1} \dots (X - \lambda_s)^{r_s}$ באשר $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in F$ שונים זה מזה. לפי

משפט הפירוק הפרימרי (משפט 7.13), $V = \bigoplus_{k=1}^s \text{Ker}(T - \lambda_k 1_V)^{r_k}$, יהי $1 \leq k \leq s$ נסמן

$N = T - \lambda_k 1_V$ ו- $r = r_k$. נמצא בסיס ל- $W_k = \text{Ker } N^r$ שלבים (להלן \vee מסמן שרשור סדרות, כלומר,

$$((a_1, \dots, a_\nu) \vee (b_1, \dots, b_\mu)) = (a_1, \dots, a_\nu, b_1, \dots, b_\mu)$$

1. מצא בסיס \mathcal{B}_r של $\text{Ker } N^r$ מודולו $\text{Ker } N^{r-1}$.

2. אז $N(\mathcal{B}_r) \subseteq \text{Ker } N^{r-1}$ השלם אותה ל-

בסיס $\mathcal{B}_{r-1} \vee N(\mathcal{B}_r)$ של $\text{Ker } N^{r-1}$ מודולו $\text{Ker } N^{r-2}$.

3. אז $N(\mathcal{B}_{r-1}) \vee N^2(\mathcal{B}_r) \subseteq \text{Ker } N^{r-2}$ השלם אותה ל-

בסיס $\mathcal{B}_{r-2} \vee N(\mathcal{B}_{r-1}) \vee N^2(\mathcal{B}_r)$ של $\text{Ker } N^{r-2}$ מודולו $\text{Ker } N^{r-3}$.

.....

$r - 1$ אז $\text{Ker } N^1 \cap N(\mathcal{B}_3) \vee \dots \vee N^{r-3}(\mathcal{B}_{r-1}) \vee N^{r-2}(\mathcal{B}_r) \subseteq \text{Ker } N^2$. השלם אותה ל-

בסיס $\text{Ker } N^1$ מודולו $\text{Ker } N^2$ של $\mathcal{B}_2 \vee N(\mathcal{B}_3) \vee \dots \vee N^{r-3}(\mathcal{B}_{r-1}) \vee N^{r-2}(\mathcal{B}_r)$.

r אז $\text{Ker } N^0 = \{0\}$ בתל"מ $N(\mathcal{B}_2) \vee \dots \vee N^{r-2}(\mathcal{B}_{r-1}) \vee N^{r-1}(\mathcal{B}_r) \subseteq \text{Ker } N$. השלם אותה ל-

בסיס $\text{Ker } N^0$ מודולו $\text{Ker } N$ של $\mathcal{B}_1 \vee N(\mathcal{B}_2) \vee \dots \vee N^{r-2}(\mathcal{B}_{r-1}) \vee N^{r-1}(\mathcal{B}_r)$.

(יתכן $\mathcal{B}_j = \emptyset$ עבור j 'ים אחדים).

צירוף כל הסדרות הנ"ל הוא בסיס \mathcal{B} של $W_k = \text{Ker } N^r$, לפי למה 8.13. אכן, הסדרה האחרונה (יחד עם \emptyset ,

בסיס של $\text{Ker } N^0 = \{0\}$ ולכן גם בלעדיו) היא בסיס של $\text{Ker } N$. לכן הקבוצה הלפני האחרונה יחד עם האחרונה

היא בסיס של $\text{Ker } N^2$. וכן הלאה.

נסדר בסיס זה בסדר הבא (כל \mathcal{B}_j היא סדרה ובמשוואה להלן \vee ו- \vee מסמנים שרשור של סדרות):

$$\mathcal{B} = \bigvee_{v \in \mathcal{B}_r} (v, N(v), \dots, N^{r-1}(v)) \vee \bigvee_{v \in \mathcal{B}_{r-1}} (v, N(v), \dots, N^{r-2}(v)) \vee \dots \\ \dots \vee \bigvee_{v \in \mathcal{B}_2} (v, N(v)) \vee \bigvee_{v \in \mathcal{B}_1} (v)$$

נשים לב ש- $W_k \neq 0$, כי $V_{\lambda_k} \subseteq W_k$, $\{0\} \neq V_{\lambda_k}$. לכן $[N|_{W_k}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ קיימת. מתקיים

$$[N|_{W_k}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \text{Diag}(\overbrace{J_r(0), \dots, J_r(0)}^{|\mathcal{B}_r|}, \overbrace{J_{r-1}(0), \dots, J_{r-1}(0)}^{|\mathcal{B}_{r-1}|}, \dots, \overbrace{J_1(0), \dots, J_1(0)}^{|\mathcal{B}_1|})$$

מכאן

$$[T|_{W_k}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [N|_{W_k} + \lambda_k 1_{V|_{W_k}}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [N|_{W_k}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} + \lambda_k I = \\ = \text{Diag}(\overbrace{J_r(\lambda_k), \dots, J_r(\lambda_k)}^{|\mathcal{B}_r|}, \overbrace{J_{r-1}(\lambda_k), \dots, J_{r-1}(\lambda_k)}^{|\mathcal{B}_{r-1}|}, \dots, \overbrace{J_1(\lambda_k), \dots, J_1(\lambda_k)}^{|\mathcal{B}_1|})$$

לכן המטריצה של T לפי בסיס שהוא צירוף בסיסים כמו \mathcal{B} , לכל $1 \leq k \leq s$, היא מטריצת ז'ורדן. ■

הוכחת משפט 8.2: קיום בסיס \mathcal{B} כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = J := [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ מטריצת ז'ורדן הוכח בבניה 8.15.

יחידות: יהי \mathcal{B} בסיס כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = J := [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ מטריצת ז'ורדן. לפי מסקנה 8.9, מספר גושי ז'ורדן $J_k(\lambda)$ ב- J תלוי רק ב- T

וב- λ , לא ב- \mathcal{B} .

לבסוף, כיון ש- $m_T = m_J$, לפי מסקנה 8.8 (ג) מערכי J שייכים ל- $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ והם מאינדקס r_1, \dots, r_s

בהתאמה, עד כדי הסדר. ■

תרגיל 8.16: תהי J צורת ז'ורדן של T . אז מספר גושי ז'ורדן ב- J השייכים ל- λ הוא הריבוי הגיאומטרי של λ ב- T .

הוכחה: נניח $J = \text{Diag}(J_{n_1}(\lambda_1), \dots, J_{n_s}(\lambda_s)) \in M_n(F)$ (באשר $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ לא בהכרח שונים זה מזה). אז הריבוי הגיאומטרי של λ ב- T הוא

$$\begin{aligned} \dim \text{Ker}(T - \lambda 1_V) &= \dim \text{Ker}(J - \lambda I) = n - \text{rank}(J - \lambda I) = \\ &= \sum_{i=1}^s n_i - \sum_{i=1}^s \text{rank} J_{n_i}(\lambda_i - \lambda) = \sum_{i=1}^s (n_i - \text{rank} J_{n_i}(\lambda_i - \lambda)) \end{aligned}$$

■ ולפי מסקנה 8.7(א), עבור $k = 1$, $n_i - \text{rank} J_{n_i}(\lambda_i - \lambda) = \begin{cases} 1 & \lambda = \lambda_i \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$. מכאן התוצאה.

$$.M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_d(F)$$

שים לב ש- $C_r(X - \lambda)$ היא $J_r(\lambda)$, גוש ז'ורדן מסדר r (הגדרה 8.1).

בדומה למטריצת ז'ורדן נגדיר מטריצת יעקובסון:

(ג) מטריצה מהצורה $C(q) = \begin{pmatrix} C_{n_1}(q) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & C_{n_t}(q) \end{pmatrix}$, באשר $n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_t \geq 1$, נקראת

מערך יעקובסון השייך ל- q . המספר n_1 נקרא האינדקס של המערך.

(ד) מטריצת יעקובסון היא מטריצה מהצורה $C = \begin{pmatrix} C(q_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & C(q_s) \end{pmatrix}$, באשר $q_1, \dots, q_s \in F[X]$

אי פריקים מתוקנים שונים זה מזה ולכל $1 \leq i \leq s$ המטריצה $C(q_i)$ היא מערך יעקובסון השייך ל- q_i . ■

המשפט המרכזי של הפרק, אותו נוכיח בהמשך, הוא:

משפט 9.2: ל- V יש בסיס \mathcal{B} כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ מטריצת יעקובסון. היא יחידה, עד כדי סדר המערכים שלה. (מטריצה זו נקראת צורת יעקובסון או צורה רציונלית של T). אם $m_T = q_1^{r_1} \cdots q_s^{r_s}$, אז במטריצה זו יש s מערכי יעקובסון, כאשר המערך ה- i שייך ל- q_i מאינדקס r_i (עד כדי הסדר).

ממנו נובעת מיידית:

מסקנה 9.3: תהי $A \in M_n(F)$. אז קיימת מטריצת יעקובסון דומה ל- A יחידה, עד כדי סדר המערכים שלה. (מטריצה זו נקראת צורת יעקובסון או צורה רציונלית של A). אם $m_A = q_1^{r_1} \cdots q_s^{r_s}$, אז במטריצה זו יש s מערכי יעקובסון, כאשר המערך ה- i שייך ל- q_i מאינדקס r_i (עד כדי הסדר).

תרגיל 9.4: יהי $q \in F[X]$ מתוקן ממעלה d ותהי $C = C_r(q) \in M_{dr}(F)$. אז $f_C = m_C = f_C$.

הוכחה: תחילה נניח כי $r = 1$. לפי ההגדרה,

$$.f_C = \det(XI_d - C) = \det \begin{pmatrix} X & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & X & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & X & & & \\ \cdot & \cdot & \ddots & \ddots & \cdot & \vdots \\ & & & -1 & X & a_{d-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & X + a_{d-1} \end{pmatrix}$$

נוסיף את השורה האחרונה X -פעמים לשורה הקודמת, וכן הלאה, עד שנוסיף את השורה השניה X -פעמים לראשונה. אז

$$f_C = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & q(X) \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & X^{d-1} + a_{d-1}X^{d-2} + \cdots + a_1 \\ 0 & -1 & 0 & & & \vdots \\ \cdot & \cdot & \ddots & \ddots & \cdot & \vdots \\ & & & -1 & 0 & X^2 + a_{d-1}X + a_{d-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & X + a_{d-1} \end{pmatrix}$$

פיתוח לפי השורה הראשונה נותן

$$f_C = (-1)^{d+1} q(X) \det(-I_{d-1}) = (-1)^{d+1} q(X) (-1)^{d-1} = q(X)$$

כעת, אם r כלשהו, $f_C = q^r$ לפי תרגיל 6.19.

נותר להוכיח כי $m_C = f_C$. כיון ש- f_C, m_C מתוקנים ו- $m_C | f_C$, די להוכיח כי $\deg m_C = \deg f_C$.

■ זה נובע מהתרגיל הבא, קצת כללי יותר.

תרגיל 9.5: תהי $A \in M_n(F)$ בעלת רכיבים שונים מאפס באלכסון הראשון שמתחת לאלכסון הראשי ואפסים מתחתיהם. אז $\deg m_A = n$

הוכחה: יהי $0 \leq k \leq n - 1$.

טענה 1: לעמודה $A^k \mathbf{e}_1$ יש רכיב שונה מאפס בשורה $k + 1$ ואפסים מתחתיו. אכן, עבור $k = 0$: $A^0 \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$ מקיים את הטענה. נניח נכונות עבור $k - 1$. אז יש $a_1, \dots, a_{k-1}, a_k \in F$, באשר $a_k \neq 0$ כך שמתקיים

$$A^{k-1} \mathbf{e}_1 = (a_1, \dots, a_{k-1}, a_k, 0, \dots, 0)^t = a_1 \mathbf{e}_1 + \dots + a_{k-1} \mathbf{e}_{k-1} + a_k \mathbf{e}_k$$

לכן $A^k \mathbf{e}_1 = a_1 A \mathbf{e}_1 + \dots + a_{k-1} A \mathbf{e}_{k-1} + a_k A \mathbf{e}_k$ אך $A \mathbf{e}_1, \dots, A \mathbf{e}_{k-1}, A \mathbf{e}_k$ הן k העמודות הראשונות של A . לפנ הנתון, יש להן אפסים בשורות $n, \dots, k + 2$, וגם אפס בשורה $k + 1$, פרט לעמודה $A \mathbf{e}_k$, לה יש שם רכיב שונה מאפס. לכן $A^k \mathbf{e}_1$ מהצורה המבוקשת.

טענה 2: $A^k \mathbf{e}_1$ אינו צירוף לינארי של $A^0 \mathbf{e}_1, A \mathbf{e}_1, \dots, A^{k-1} \mathbf{e}_1$. אכן, לעמודה $A^k \mathbf{e}_1$ יש בשורה $k + 1$ רכיב שונה מאפס, בעוד שלעמודות $A^0 \mathbf{e}_1, A \mathbf{e}_1, \dots, A^{k-1} \mathbf{e}_1$, ולכן גם לכל צירוף לינארי שלהם, יש שם 0.

טענה 3: $\deg m_A = n$. אכן, $m_A | f_A$, לכן $\deg m_A \leq \deg f_A = n$. יהי $m_A = \sum_{i=0}^d a_i X^i$, באשר $a_d = 1$. אז $m_A(A) = \sum_{i=0}^d a_i A^i = 0$ ולכן $\sum_{i=0}^d a_i A^i \mathbf{e}_1 = 0$. מכאן $A^d \mathbf{e}_1 = \sum_{i=0}^{d-1} -a_i A^i \mathbf{e}_1$. לפי טענה 2 זה לא יתכן אם $d \leq n - 1$. לכן $\deg m_A = d \geq n$. ■

מסקנה 9.6: תהי C מטריצת יעקובסון. יהיו C_1, \dots, C_s המערכים שלה, באשר C_i שייך ל- q_i מאינדקס r_i , לכל i . אז

$$m_C = q_1^{r_1} \cdots q_s^{r_s}$$

הוכחה: נקבע $1 \leq i \leq s$. אז $C_i = \text{Diag}(C_{n_1}(q), \dots, C_{n_t}(q))$ באשר $r_i = n_1 \geq \dots \geq n_t$. לפי משפט 6.7 ותרגיל 9.4, $m_{C_i} = \text{lcm}(m_{C_{n_1}(q)}, \dots, m_{C_{n_t}(q)}) = \text{lcm}(q^{n_1}, \dots, q^{n_t}) = q^{r_i}$. לפי משפט 6.7, $m_C = \text{lcm}(m_{C_1}, \dots, m_{C_s}) = q_1^{r_1} \cdots q_s^{r_s}$. ■

הערה 9.7: סימון. מעתה יהי $q \in F[X]$ כמו בהגדרה 9.1, ממעלה d . תהי $N = q(T)$. אז לכל $v \in V$

$$T^d(v) = - \sum_{i=0}^{d-1} a_i T^i(v) + N(v) \quad (1)$$

עבור $v \in V$ נסמן $\tilde{v} = (v, T(v), \dots, T^{d-1}(v))$ ועבור סדרה $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_k)$ של וקטורים ב- V נסמן $\tilde{\mathcal{A}} = (v_1, \dots, v_k, T(v_1), \dots, T(v_k), \dots, T^{d-1}(v_1), \dots, T^{d-1}(v_k))$. לכל i, j מתקיים $T^i N^j = N^j T^i$ כי $f(T)g(T) = g(T)f(T)$ באשר $f = X^i, g = q^j$. לכן $N(\tilde{\mathcal{A}}) = \widetilde{N(\mathcal{A})}$. ■

תרגיל 9.8: יהי W תת מרחב שמור- T של V ויהי \mathcal{D} בסיסו. יהי v האיבר הראשון של \mathcal{D} . נסמן

$$\mathcal{B}' = (\tilde{v} \vee \widetilde{N(v)} \vee \dots \vee \widetilde{N^{r-1}(v)}) \quad \text{ו} \quad \mathcal{B} = \overbrace{(v, N(v), \dots, N^{r-1}(v))}^{\mathcal{D}}$$

$v \in \text{Ker } N^r$ ו- $\mathcal{D} = \mathcal{B}'$ אם ורק אם $[T|_W]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{D}} = C_r(q)$ (א)

(ב) אם \mathcal{B}' בסיס של W ו- $v \in \text{Ker } N^r$ אז גם \mathcal{B} בסיס של W ו- $[N|_W]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \text{Diag}(\overbrace{J_r(0), \dots, J_r(0)}^d)$

הוכחה: נתבונן במלבן הבא של $d \times r$ וקטורים ב- V :

$$\begin{array}{cccc} v & N(v) & \dots & N^{r-1}(v) \\ T(v) & T(N(v)) & \dots & T(N^{r-1}(v)) \\ T^2(v) & T^2(N(v)) & \dots & T^2(N^{r-1}(v)) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ T^{d-1}(v) & T^{d-1}(N(v)) & \dots & T^{d-1}(N^{r-1}(v)) \end{array} \quad (2)$$

אז \mathcal{B}' מתקבל אם לוקחים את אברי המלבן עמודה אחרי עמודה, ואילו \mathcal{B} מתקבל אם לוקחים את אברי המלבן שורה אחרי שורה. לכן ברור שאם \mathcal{B}' בסיס אז גם \mathcal{B} בסיס.

(א) בדיקה ישירה, בעזרת (1).

(ב) $\text{Ker } N^r$ שמור- T^i . כל שורה במלבן (2) היא שרשרת ז'ורדן מאורך r של N השייכת ל-0. לפי

תרגיל 8.11 נובעת הטענה. ■

נכליל את התרגיל:

מסקנה 9.9: יהי W תת מרחב שמור- T של V ויהי \mathcal{B}' בסיס של W . אז

$$[T|_W]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'} = \text{Diag}(\overbrace{C_r(q), \dots, C_r(q)}^{\ell_r}, \overbrace{C_{r-1}(q), \dots, C_{r-1}(q)}^{\ell_{r-1}}, \dots, \overbrace{C_1(q), \dots, C_1(q)}^{\ell_1}) \quad (\text{א})$$

אם ורק אם לכל $1 \leq i \leq r$ יש סדרה $\mathcal{A}_i \subseteq \text{Ker } N^i$ מאורך ℓ_i כך ש-

$$\mathcal{B}' = \bigvee_{v \in \mathcal{A}_r} (\tilde{v} \vee \widetilde{N(v)} \vee \dots \vee \widetilde{N^{r-1}(v)}) \vee \bigvee_{v \in \mathcal{A}_{r-1}} (\tilde{v} \vee \widetilde{N(v)} \vee \dots \vee \widetilde{N^{r-2}(v)}) \vee \dots \vee \bigvee_{v \in \mathcal{A}_1} \tilde{v}$$

(ב) אם \mathcal{B}' כמו ב-(א) אז

$$\mathcal{B} := \bigvee_{v \in \mathcal{A}_r} \widetilde{(v, N(v), \dots, N^{r-1}(v))} \vee \bigvee_{v \in \mathcal{A}_{r-1}} \widetilde{(v, N(v), \dots, N^{r-2}(v))} \vee \dots \vee \bigvee_{v \in \mathcal{A}_1} \tilde{v}$$

גם בסיס של W ו- $[N|_W]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ הוא מערך ז'ורדן:

$$[N]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \text{Diag}(\overbrace{J_r(0), \dots, J_r(0)}^{d\ell_r}, \overbrace{J_{r-1}(0), \dots, J_{r-1}(0)}^{d\ell_{r-1}}, \dots, \overbrace{J_1(0), \dots, J_1(0)}^{d\ell_1})$$

למה 9.10: יהי W תת מרחב שמור- T של V . תהי $\mathcal{A} \subseteq V$ סדרה. נניח כי q אי פריק, $q^\ell(T) = 0$, $q(T)(\mathcal{A}) \subseteq W$ ו-

(א) יהי $v \in V$ כך ש- $\tilde{v} \vee \tilde{\mathcal{A}}$ בתל"מ W . אז $\tilde{v} \vee \tilde{\mathcal{A}}$ בתל"מ W .

(ב) אם $\tilde{\mathcal{A}}$ בתל"מ W , יש $\mathcal{B} \subseteq V$ כך ש- $\tilde{\mathcal{A}} \vee \tilde{\mathcal{B}}$ בסיס של V מודולו W .

הוכחה: (א) נניח $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_{k-1})$ ונסמן $v_k = v$. יהי $a_{ij} \in F$ כך ש-

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=0}^{d-1} a_{ij} T^j(v_i) \in W \quad (3)$$

עלינו להוכיח כי $a_{ij} = 0$ לכל j, i . אך די להוכיח כי $a_{kj} = 0$ לכל j , כי אז $\sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=0}^{d-1} a_{ij} T^j(v_i) \in W$

ומכאן, כיון ש- $\tilde{\mathcal{A}}$ בתל"מ W , גם $a_{ij} = 0$ לכל j ולכל $i \leq k-1$.

נניח שלילה. לכל $1 \leq i \leq k$ יהי $f_i = \sum_{j=0}^{d-1} a_{ij} X^j \in F[X]$. אז $f_k \neq 0$, $\deg f_k < d = \deg q$.

כיון ש- q אי פריק, q, f_k זרים, ולכן גם q^ℓ, f_k זרים. אז יש $g_k, h_k \in F[X]$ כך ש- $g_k q^\ell + h_k f_k = 1$. מכאן

$$v = 1_V(v) = g_k(T)q^\ell(T)(v) + h_k(T)f_k(T)(v) = h_k(T)f_k(T)(v) \quad (4)$$

כמו כן לפי החילוק עם שארית לכל $1 \leq i \leq k-1$ יש $a'_{ij} \in F$ ו- $g_i \in F[X]$ כך שמתקיים
 $h_k f_i = g_i q + \sum_{j=0}^{d-1} a'_{ij} X^j$, לפי (3), $\sum_{i=1}^k f_i(T)(v_i) \in W$, וכיון ש- W שמור- T ,

$$W \ni h_k(T) \left(\sum_{i=1}^k f_i(T)(v_i) \right) = \sum_{i=1}^k h_k(T) f_i(T)(v_i) = \\ \sum_{i=1}^{k-1} g_i(T) q(T)(v_i) + \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=0}^{d-1} a'_{ij} T^j(v_i) + h_k(T) f_k(T)(v)$$

כיון ש- $W \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}(T)q(T)$, המחובר הראשון באגף ימין בתוך W ; לפי (4), המחובר האחרון הוא v , לכן

$$\sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=0}^{d-1} a'_{ij} T^j(v_i) + 1v \in W$$

ו- $1 \neq 0$, סתירה להנחה $\widetilde{\mathcal{A}} \vee (v)$ בתל"מ W .

(ב) צריך למצוא $\mathcal{B} \subseteq V$ כך ש- $\widetilde{\mathcal{A}} \vee \widetilde{\mathcal{B}}$ בתל"מ W מרבית, ז.א., בתל"מ W ומקיימת

$$\dim V = \dim W + |\widetilde{\mathcal{A}}| + |\widetilde{\mathcal{B}}| = \dim W + d|\mathcal{A}| + d|\mathcal{B}|$$

כלומר, $n_{\mathcal{A}} = \frac{1}{d}(\dim V - \dim W) - |\mathcal{A}| = |\mathcal{B}|$. ההוכחה באינדוקציה על $n_{\mathcal{A}}$.

אם $n_{\mathcal{A}} = 0$, ניקח $\mathcal{B} = \emptyset$.

אם $n_{\mathcal{A}} > 0$, אז אינה בתל"מ W מרבית, כלומר, יש $v \in V$ כך ש- $\widetilde{\mathcal{A}} \vee (v)$ בתל"מ W . לפי (א), $\widetilde{\mathcal{A}} \vee \widetilde{v}$ בתל"מ W . כלומר, $\widetilde{\mathcal{A}} \vee \widetilde{v}$ בתל"מ W (שתי הסדרות זהות, עד כדי הסדר). אבל $n_{\mathcal{A} \vee (v)} = n_{\mathcal{A}} - 1$, לכן לפי הנחת האינדוקציה יש \mathcal{B}' כך ש- $\widetilde{\mathcal{A}} \vee \widetilde{v} \vee \widetilde{\mathcal{B}'}$ בתל"מ W מרבית. אז $\mathcal{B} = \mathcal{B}' \vee (v)$ מקיימת את הדרישה. ■

קעת נוכיח מקרה פרטי של משפט 9.2:

משפט 9.11: נניח כי $m_T = q^r$ באשר $q \in F[X]$ פולינום אי פריק מתוקן ממעלה d . אז יש מטריצת יעקובסון יחידה C עבורה יש בסיס \mathcal{B}' של V (לא בהכרח יחיד) כך ש- $[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}$. יתר על כן, C מערך יעקובסון בעל אינדקס r השייך ל- q .

הוכחה: נסמן $N = q(T)$. תחילה נראה ש- $m_N = X^r$. אכן, $m_T = q(T) = 0$, לכן $N^r = q(T)^r = m_T(T) = 0$, אכן, $m_N = X^r$. מכאן $m_N | X^r$, לכן $m_N = X^{r'}$ עבור $r' \leq r$. אם $r' < r$, אז $q^{r'}$ מאפס את T , והוא ממעלה נמוכה יותר מן m_T , בסתירה למזעריות של m_T . לכן $m_N = X^r$.

קיום: נשתמש בבניה 8.15 עבור N , אך נראה שאפשר לבחור את \mathcal{B}_i כך ש- $\widetilde{\mathcal{A}}_i = \mathcal{B}_i$ עבור איזה \mathcal{A}_i .

יהי $j \geq 0$. אז $N(\text{Ker } N^j) \subseteq \text{Ker } N^{j-1}$. לפי תרגיל 7.3, $\text{Ker } N^j$ שמור- T .

לפי הערה 9.7, אם $\mathcal{A} \subseteq V$ סדרה אז $N^j(\widetilde{\mathcal{A}}) = \widetilde{N^j(\mathcal{A})}$.

לפי למה 9.10(ב) (עם $\mathcal{A} = \emptyset$, $V = \text{Ker } N^r$, $W = \text{Ker } N^{r-1}$)

יש $\mathcal{B}_r \subseteq \text{Ker } N^r$ כך ש- $\widetilde{\mathcal{A}}_r$ מקיימת

1. $\mathcal{B}_r \subseteq \text{Ker } N^r$ בסיס של $\text{Ker } N^r$ מודולו $\text{Ker } N^{r-1}$.

"אז $N(\mathcal{B}_r) \subseteq \text{Ker } N^{r-1}$ בתל"מ $\text{Ker } N^{r-2}$. (ציטוט מתוך בניה 8.15). אז $N(\mathcal{B}_r) = \widetilde{N(\mathcal{A}_r)}$.

יש לפי למה 9.10(ב) (עם $\mathcal{A} = N(\mathcal{A}_r)$, $W = \text{Ker } N^{r-2}$, $V = \text{Ker } N^{r-1}$, $\ell = r-1$)

יש $\mathcal{B}_{r-1} \subseteq \text{Ker } N^{r-1}$ כך ש- $\widetilde{\mathcal{A}}_{r-1}$ מקיימת

2. $\mathcal{B}_{r-1} \vee N(\mathcal{B}_r) \subseteq \text{Ker } N^{r-1}$ בסיס של $\text{Ker } N^{r-1}$ מודולו $\text{Ker } N^{r-2}$.

"אז $N(\mathcal{B}_{r-1}) \vee N^2(\mathcal{B}_r) \subseteq \text{Ker } N^{r-2}$ בתל"מ $\text{Ker } N^{r-3}$. (ציטוט מתוך בניה 8.15). אז

$$N(\mathcal{B}_{r-1}) \vee N^2(\mathcal{B}_r) = N(\widetilde{\mathcal{A}}_{r-1}) \vee \widetilde{N^2(\mathcal{A}_r)}$$

לפי למה 9.10(ב) (עם $\mathcal{A} = N(\mathcal{A}_{r-1}) \vee N^2(\mathcal{A}_r)$, $W = \text{Ker } N^{r-3}$, $V = \text{Ker } N^{r-2}$, $\ell = r-2$)

יש $\mathcal{B}_{r-2} \subseteq \text{Ker } N^{r-2}$ כך ש- $\widetilde{\mathcal{A}}_{r-2}$ מקיימת

3. $\mathcal{B}_{r-2} \vee N(\mathcal{B}_{r-1}) \vee N^2(\mathcal{B}_r) \subseteq \text{Ker } N^{r-2}$ בסיס של $\text{Ker } N^{r-2}$ מודולו $\text{Ker } N^{r-3}$.

וכן הלאה (באינדוקציה).

לפי בניה 8.15

$$\begin{aligned} \mathcal{B} := & \bigvee_{v \in \mathcal{B}_r} (v, N(v), \dots, N^{r-1}(v)) \vee \bigvee_{v \in \mathcal{B}_{r-1}} (v, N(v), \dots, N^{r-2}(v)) \vee \dots \\ & \dots \vee \bigvee_{v \in \mathcal{B}_2} (v, N(v)) \vee \bigvee_{v \in \mathcal{B}_1} (v) \end{aligned}$$

הוא בסיס של $V = \text{Ker } N^r$ והמטריצה של N לפי בסיס זה היא מערך ז'ורדן השייך ל-0. נסדר אותו בסדר הבא:

$$\mathcal{B}' = \bigvee_{v \in \mathcal{A}_r} (\tilde{v} \vee \widetilde{N(v)} \vee \dots \vee \widetilde{N^{r-1}(v)}) \vee \bigvee_{v \in \mathcal{A}_{r-1}} (\tilde{v} \vee \widetilde{N(v)} \vee \dots \vee \widetilde{N^{r-2}(v)}) \vee \dots \vee \bigvee_{v \in \mathcal{A}_1} \tilde{v}$$

אז לפי מסקנה 9.9(א),

$$[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'} = \text{Diag}(\overbrace{C_r(q), \dots, C_r(q)}^{|\mathcal{A}_r|}, \overbrace{C_{r-1}(q), \dots, C_{r-1}(q)}^{|\mathcal{A}_{r-1}|}, \dots, \overbrace{C_1(q), \dots, C_1(q)}^{|\mathcal{A}_1|})$$

יחידות: יהי \mathcal{B}' בסיס כך ש- $[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}$ $C := [T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}$ מטריצת יעקובסון. אז $m_C = m_T = q^r$, לכן לפי מסקנה 9.6, C

מערך יעקובסון מאינדקס r השייך ל- q :

$$[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'} = \text{Diag}(\overbrace{C_r(q), \dots, C_r(q)}^{\ell_r}, \overbrace{C_{r-1}(q), \dots, C_{r-1}(q)}^{\ell_{r-1}}, \dots, \overbrace{C_1(q), \dots, C_1(q)}^{\ell_1})$$

לפי מסקנה 9.9, יש בסיס \mathcal{B} אחר כך ש-

$$[N]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \text{Diag}(\overbrace{J_r(0), \dots, J_r(0)}^{d\ell_r}, \overbrace{J_{r-1}(0), \dots, J_{r-1}(0)}^{d\ell_{r-1}}, \dots, \overbrace{J_1(0), \dots, J_1(0)}^{d\ell_1})$$

לפי היחידות של צורת ז'ורדן (מסקנה 8.9) סדרת המספרים $d\ell_1, \dots, d\ell_r$, ולכן גם הסדרה ℓ_1, \dots, ℓ_r , נקבעת באופן יחיד. ■

הוכחת משפט 9.2: קיום ההצגה: יהי

$$m_T = q_1^{r_1} \cdots q_s^{r_s}$$

הפירוק של הפולינום המזערי של T לחזקות של גורמים אי פריקים מתוקנים שונים, כאשר $r_i \geq 1$ לכל i . לפי משפט הפירוק הפרימרי, $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$, באשר $W_i = \text{Ker } q_i^{r_i}(T)$ ו- $q_i^{r_i}$ לפי משפט 7.6 לכל i . לפי משפט 9.11 יש לכל W_i בסיס \mathcal{B}_i כך ש- $[T|_{W_i}]_{\mathcal{B}_i}^{\mathcal{B}_i} = C_i := [T|_{W_i}]_{\mathcal{B}_i}^{\mathcal{B}_i}$, מערך יעקובסון השייך ל- $q_i^{r_i}$. לפי משפט 7.8 הצירוף \mathcal{B} של $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_s$ הוא בסיס של V ולפי משפט 7.8, $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \text{Diag}(C_1, \dots, C_s)$ מטרצת יעקובסון. **יחידות ההצגה:** אם $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \text{Diag}(C_1, \dots, C_t)$, באשר C_1, \dots, C_t מערכי יעקובסון השייכים לחזקות של פולינומים אי פריקים מתוקנים שונים, אז לפי מסקנה 9.6, m_{C_1}, \dots, m_{C_t} חזקות של פולינומים אי פריקים שונים. לכן לפי מסקנה 7.14 (ב), $t = s$ ויש בסיס \mathcal{B}_i של $W_i = \text{Ker } q_i^{r_i}(T)$ כך ש- $[T|_{W_i}]_{\mathcal{B}_i}^{\mathcal{B}_i} = C_i$ לכל i . לפי משפט 9.11, C_i יחידה. ■

תרגיל 9.12: תהי $A \in M_n(F)$ אז

$$f_A = f_{A^t} \quad (\text{א})$$

$$m_A = m_{A^t} \quad (\text{ב})$$

(ג) אם A דומה ל- B אז A^t דומה ל- B^t .

הוכחה: (א) $f_{A^t} = \det(XI_n - A^t) = \det((XI_n - A)^t) = \det(XI_n - A) = f_A$ (א)

(ב) אם $g = \sum_{i=0}^m c_i X^i \in F[X]$ כלשהו, אז $g(A^t) = (g(A))^t$. אכן,

$$(g(A))^t = \left(\sum_{i=0}^m c_i A^i \right)^t = \sum_{i=0}^m c_i (A^i)^t = \sum_{i=0}^m c_i (A^t)^i = g(A^t)$$

בפרט, $g(A^t) = 0$ אם ורק אם $g(A) = 0$. מכאן נובע ש- $m_A = m_{A^t}$.

(ג) לפי ההנחה יש P הפיכה כך ש- $P^{-1}AP = B$. אז $P^t A^t (P^{-1})^t = B^t$. לכן די להוכיח ש- P^t הפיכה

$$\blacksquare \quad (P^{-1})^t P^t = I_n^t = I_n, \text{ ואכן, } PP^{-1} = I_n, \text{ ולכן } (P^t)^{-1} = (P^{-1})^t$$

(נסמן ב- \sim יחס הדמיון).

תרגיל 9.13: תהי $A \in M_n(F)$ אז $A \sim A^t$. (כל מטריצה ריבועית דומה למטריצה המוחלפת שלה).

הוכחה: די להניח כי A מטריצת יעקובסון. אכן, לפי מסקנה 9.3 יש מטריצת יעקובסון C כך ש- $A \sim C$, לפי

תרגיל 9.12, $A^t \sim C^t$ אם $C \sim C^t$, אז, כיון שדמיון מטריצות הוא יחס שקילות, $A \sim A^t$.

די להניח כי A גוש יעקובסון. אכן, $A = \text{Diag}(C_1, \dots, C_t)$, באשר C_1, \dots, C_t גושי יעקובסון. אם

לכל i יש P_i הפיכה כך ש- $P_i^{-1}C_iP_i = C_i^t$, אז $P := \text{Diag}(P_1, \dots, P_t)$ מקיימת

$$P^{-1}AP = \text{Diag}(P_1^{-1}C_1P_1, \dots, P_t^{-1}C_tP_t) = \text{Diag}(C_1^t, \dots, C_t^t) = A^t$$

נניח, אם כן, כי $A = C_r(q)$. לפי תרגיל 9.4, $m_A = q^r$, לפי תרגיל 9.12, $m_{A^t} = q^r$. תהי B צורת יעקובסון

של A^t , אז $A^t \sim B$ ולכן גם $m_B = q^r$. לפי מסקנה 9.6, ב- B יש גוש $C_r(q)$. אבל A, B מאותו הסדר,

ו- $A = C_r(q)$, לכן $A = B$. כלומר, $A \sim A^t$. ■

תרגיל 9.14: יהיו $F \subseteq F'$ שני שדות. תהיינה $A, B \in M_n(F)$ דומות מעל F' . אז הן דומות גם מעל F .

בפרק זה יהיה $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$.

נזכור שלכל $z \in \mathbb{C}$ קיים הצמוד שלו \bar{z} והערך המוחלט שלו $|z|$ המוגדרים על ידי

$$x, y \in \mathbb{R}, \quad |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \overline{x + iy} = x - iy$$

התכונות הבסיסיות:

$$(א) \quad \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$$

$$(ב) \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

$$(ג) \quad \bar{z} z = |z|^2$$

$$(ד) \quad \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

$$(ה) \quad z \text{ ממשי אם ורק אם } z = \bar{z}$$

$$(ו) \quad z = 0 \text{ אם ורק אם } |z| = 0$$

$$(ז) \quad \overline{\bar{z}} = z$$

הגדרה 10.1: יהי V מרחב וקטורי מעל F . מכפלה פנימית על V היא העתקה $V \times V \rightarrow F$ שמתאימה לכל זוג

(u, v) של וקטורים ב- V סקלר $\langle u, v \rangle \in F$ כך שמתקיים לכל $u, v, v' \in V$ ולכל $\alpha \in F$

$$(1) \quad \langle u, v + v' \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, v' \rangle$$

$$(2) \quad \langle u, \alpha v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$$

$$(3) \quad \overline{\langle v, u \rangle} = \langle u, v \rangle$$

$$(4) \quad \langle v, v \rangle > 0 \text{ לכל } v \in V, v \neq 0. \text{ (שים לב: לפי (3), } \langle v, v \rangle \in \mathbb{R} \text{)}$$

דוגמה 10.2: (א) המכפלה הסטנדרטית, נקראת גם סקלרית: $V = F^n$, ונגדיר $\langle u, v \rangle_{\text{st}} = \bar{u}^t v$, כלומר,

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \right\rangle_{\text{st}} = (\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \bar{a}_1 b_1 + \bar{a}_2 b_2 + \dots + \bar{a}_n b_n = \sum_{i=1}^n \bar{a}_i b_i$$

נבדוק שהתכונה (4) בהגדרה מתקיימת: נניח $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ לא כולם אפס. אז

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \right\rangle_{\text{st}} = \sum_{i=1}^n \bar{a}_i a_i = \sum_{i=1}^n |a_i|^2 > 0$$

כי $|a_i|^2 \geq 0$ ו- $|a_i|^2 > 0$ אם $a_i \neq 0$.

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \right\rangle = 2\bar{a}_1 b_1 + \bar{a}_1 b_2 + \bar{a}_2 b_1 + \bar{a}_2 b_2, V = F^2 \quad (\text{ב})$$

נבדוק את התכונה (4) בהגדרה:

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \right\rangle &= 2\bar{a}_1 a_1 + \bar{a}_1 a_2 + \bar{a}_2 a_1 + \bar{a}_2 a_2 = (\bar{a}_1 + \bar{a}_2)(a_1 + a_2) + \bar{a}_1 a_1 \\ &= |a_1 + a_2|^2 + |a_1|^2 > 0 \end{aligned}$$

כאשר $a_2 \neq 0$ או $a_1 + a_2 \neq 0$, כלומר, כאשר $a_1 \neq 0$ או $a_2 \neq 0$.

למה 10.3:

$$\langle u + u', v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u', v \rangle \quad (1)$$

$$\langle \alpha u, v \rangle = \bar{\alpha} \langle u, v \rangle \quad (2)$$

$$\langle 0, v \rangle = \langle u, 0 \rangle = 0 \quad (3)$$

הגדרה 10.4:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} \quad (1)$$

$$\langle v, u \rangle = 0 \text{ זה שקול ל-} \langle u, v \rangle = 0 \text{ אם } u \perp v \text{ נכתוב } -u \perp v \text{ אם } \langle u, v \rangle = 0 \text{ זה שקול ל-} \langle v, u \rangle = 0 \quad (2)$$

$$\text{סדרה } u_1, u_2, \dots, u_n \in V \text{ נקראת אורתוגונלית אם } u_i \perp u_j \text{ לכל } i \neq j \quad (3)$$

$$\text{סדרה } u_1, u_2, \dots, u_n \in V \text{ נקראת אורתונורמלית אם היא אורתוגונלית ו-} \|u_i\| = 1 \text{ לכל } i \text{ במלים אחרות,} \quad (4)$$

$$\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

דוגמה 10.5: הבסיס הסטנדרטי e_1, e_2, \dots, e_n של F^n הינו אורתונורמלי ביחס למכפלה הסטנדרטית.

הערה 10.6: יהי $V = \mathbb{R}^2$ עם המכפלה הסטנדרטית. נראה את אברי V כחצים מהראשית. אם $A = (a_1, a_2)$ אז

לפי משפט פיתגורס אורכו של \vec{OA} הוא $\sqrt{a_1^2 + a_2^2}$, כלומר, הנורמה של \vec{OA} . כמו כן, תהי גם $B = (b_1, b_2)$.

אז, שוב לפי משפט פיתגורס, \vec{OA}, \vec{OB} מאונכים זה לזה אם ורק אם $AB^2 = OA^2 + OB^2$, כלומר,

$$(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 = (a_1^2 + a_2^2) + (b_1^2 + b_2^2)$$

$$\langle \vec{OA}, \vec{OB} \rangle_{st} = 0$$

באופן דומה האורך והניצבות ב- \mathbb{R}^3 $V = \mathbb{R}^3$ ביחס למכפלה הסטנדרטית הם האורך והניצבות המוכרים לנו

מגיאוטרסה.

למה 10.7 (למת האיפיון): תהי סדרה אורתוגונלית במרחב מכפלה פנימית V . יהיו

$$u = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n, \quad v = b_1 u_1 + \dots + b_n u_n \in V$$

$$a_i = \langle u_i, u \rangle \text{ או } \|u_i\| = 1 \text{ לכל } i, \text{ ובפרט, } a_i = \frac{\langle u_i, u \rangle}{\|u_i\|^2} \text{ או } \|u_i\| \neq 0 \text{ בפרט, } a_i \|u_i\|^2 = \langle u_i, u \rangle \quad (\text{א})$$

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \bar{a}_i b_i \text{ אז } \|u_i\| = 1 \text{ לכל } i, \text{ בפרט, אם } \langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \bar{a}_i b_i \|u_i\|^2 \quad (\text{ב})$$

$$\|u\|^2 = \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \|u_i\|^2 \text{ אז } \|u_i\| = 1 \text{ לכל } i, \text{ בפרט, אם } \|u\|^2 = \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \|u_i\|^2 \quad (\text{ג})$$

$$\langle u_i, u \rangle = a_1 \langle u_i, u_1 \rangle + a_2 \langle u_i, u_2 \rangle + \dots + a_n \langle u_i, u_n \rangle = a_i \langle u_i, u_i \rangle = a_i \|u_i\|^2 \quad (\text{א}) \text{ הוכחה:}$$

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \bar{a}_i b_j \langle u_i, u_j \rangle = \sum_{i=1}^n \bar{a}_i b_i \|u_i\|^2 \quad (\text{ב})$$

■ (ג) הצב $v = u$ בחלק הקודם.

מסקנה 10.8: יהי \mathcal{B} בסיס אורתונורמלי של מרחב מכפלה פנימית V . יהיו $u, v \in V$ אז $\langle [u]_{\mathcal{B}}, [v]_{\mathcal{B}} \rangle_{\text{st}}$

משפט 10.9: סדרה אורתוגונלית u_1, u_2, \dots, u_n שאבריה שונים מאפס הינה בלתי תלויים לינארית מעל F .

■ **הוכחה:** נניח $a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n = 0$. לפי הלמה $a_i = \frac{\langle u_i, 0 \rangle}{\|u_i\|^2} = 0$ לכל i .

בניה 10.10 (תהליך Gram-Schmidt למציאת בסיס אורתוגונלי):

נתונה סדרה v_1, v_2, \dots, v_n ב- V . נמצא סדרה אורתוגונלית u_1, u_2, \dots, u_n ב- V כך שמתקיים:

$$1 \leq k \leq n, \text{Sp}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \text{Sp}(u_1, u_2, \dots, u_k) \quad (1^k)$$

$$1 \leq k \leq n, v_k \in \text{Sp}(v_1, v_2, \dots, v_{k-1}) \text{ אם ורק אם } u_k = 0 \quad (2^k)$$

בפרט

$$F \text{ מעל } v_1, v_2, \dots, v_n \text{ שונים מאפס אם ורק אם } u_1, u_2, \dots, u_n \text{ בלתי תלויים לינארית מעל } F \quad (3)$$

$$V \text{ של } v_1, v_2, \dots, v_n \text{ בסיס של } V \text{ אז } u_1, u_2, \dots, u_n \text{ בסיס של } V \quad (4)$$

הבניה: תחילה נשים לב ש- (3) נובע מ- (2) ו- (4) נובע מ- (1).

נבנה באינדוקציה על k את הסדרה כך שיתקיימו תנאים $(1^k), (2^k)$, וכן

$$u_1, u_2, \dots, u_k \text{ אורתוגונלית.} \quad (0^k)$$

עבור $k = 1$ נגדיר $u_1 = v_1$ אז $(0^1), (1^1)$ ברוורים; $(2^1): v_1 \in \text{Sp}(\emptyset)$ אז $u_1 = v_1 = 0 \iff v_1 = 0$.

נניח באינדוקציה שכבר בנינו u_1, u_2, \dots, u_k שמקיימים את $(0^k), (1^k), (2^k)$. נגדיר

$$(*) \quad u_{k+1} = v_{k+1} - (c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_k u_k)$$

$$\text{באשר } c_i = \begin{cases} \frac{\langle u_i, v_{k+1} \rangle}{\|u_i\|^2} & u_i \neq 0 \\ 0 & u_i = 0 \end{cases} \quad 1 \leq i \leq k$$

$$\text{אז } c_i \|u_i\|^2 = \langle u_i, v_{k+1} \rangle \text{ לכל } 1 \leq i \leq k$$

נוכיח את $(0^{k+1}), (1^{k+1}), (2^{k+1})$:

$$(0^{k+1}) \quad u_1, u_2, \dots, u_k, u_{k+1} \text{ אורתוגונלית: די להוכיח } \langle u_i, u_{k+1} \rangle = 0 \text{ לכל } 1 \leq i \leq k \text{ ואכן}$$

$$\langle u_i, u_{k+1} \rangle = \langle u_i, v_{k+1} \rangle - \sum_{j=1}^k c_j \langle u_i, u_j \rangle = \langle u_i, v_{k+1} \rangle - c_i \|u_i\|^2 = 0$$

(1^{k+1}) לפי (*) ולפי (1^k):

$$\text{Sp}(u_1, u_2, \dots, u_k, u_{k+1}) = \text{Sp}(u_1, u_2, \dots, u_k, v_{k+1}) = \text{Sp}(v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1})$$

(2^{k+1}) אם $u_{k+1} = 0$ אז לפי (*)

$$v_{k+1} = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_k u_k \in \text{Sp}(u_1, u_2, \dots, u_k) = \text{Sp}(v_1, v_2, \dots, v_k)$$

להיפך, אם $v_{k+1} \in \text{Sp}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \text{Sp}(u_1, u_2, \dots, u_k)$ אז $v_{k+1} = \sum_{i=1}^k a_i u_i$ עבור

איזה $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$. לפי למת האפיון 10.7 (א), אם $a_i \neq 0$ אז $u_i \neq 0$. לפי (*), $u_{k+1} = 0$

■

דוגמה 10.11: נעשה תהליך גרם-שמידט ב- \mathbb{R}^3 על $v_1 = (0, 3, 4), v_2 = (1, 2, 1), v_3 = (0, 0, 2)$ לפי המכפלה הסטנדרטית.

$$(א) \quad \|u_1\|^2 = 0^2 + 3^2 + 4^2 = 25, \quad u_1 = v_1 = (0, 3, 4)$$

$$(ב) \quad \langle u_1, v_2 \rangle_{st} = 0 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 10$$

$$u_2 = (1, 2, 1) - \frac{10}{25}(0, 3, 4) = (1, 2, 1) - (0, \frac{6}{5}, \frac{8}{5}) = (1, \frac{4}{5}, \frac{-3}{5}) = \frac{1}{5}(5, 4, -3)$$

$$\|u_2\|^2 = \frac{25}{25} + \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 2$$

$$(ג) \quad \langle u_1, v_3 \rangle_{st} = 0 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 = 8, \quad \langle u_2, v_3 \rangle_{st} = 1 \cdot 0 + \frac{4}{5} \cdot 0 + \frac{-3}{5} \cdot 2 = \frac{-6}{5}$$

$$u_3 = (0, 0, 2) - \frac{8}{25}(0, 3, 4) - \frac{-6}{25}(1, \frac{4}{5}, \frac{-3}{5}) = \frac{1}{25}(15, -12, 9)$$

מסקנה 10.12: יהי V מרחב מכפלה פנימית נוצר סופית. אז יש לו בסיס אורתונורמלי.

הוכחה: ל- V יש בסיס v_1, v_2, \dots, v_n . לפי המשפט הקודם יש לו בסיס אורתונורמלי u_1, u_2, \dots, u_n . קל לבדוק

$$\blacksquare \quad \text{כי } \frac{1}{\|u_1\|}u_1, \frac{1}{\|u_2\|}u_2, \dots, \frac{1}{\|u_n\|}u_n \text{ סדרה אורתונורמלית.}$$

הערה 10.13: המשמעות הגיאומטרית של תהליך גרם-שמידט. נתבונן בנוסחה (*). נסמן

$$u = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_k u_k, \quad U = \text{Sp}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \text{Sp}(u_1, u_2, \dots, u_k)$$

אז $u \in U, v_{k+1} = u_{k+1} + u$ ו- u_{k+1} ניצב לכל הוקטורים ב- U (ראה תרגיל 10.19 בהמשך).

נניח כי $V = \mathbb{R}^3$ ו- U הוא מישור או ישר דרך הראשית. אז

(א) u הוא ההיטל של v_{k+1} על U ,

(ב) u_{k+1} הוא החץ מאיזושהי נקודה ב- U , ניצב ל- U אל הקצה של v_{k+1} . בפרט אורכו $\|u_{k+1}\|$ הוא המרחק בין

U לנקודת הקצה של v_{k+1} .

תרגיל 10.14: מצא את מרחק של הנקודה $(0, 0, 2)$ מהמישור $U = \text{Sp}((0, 3, 4), (1, 2, 1))$

פתרון: בדוגמה 10.11 עשינו תהליך גרם-שמידט על $v_1 = (0, 3, 4), v_2 = (1, 2, 1), v_3 = (0, 0, 2)$. מצאנו ש- $u_3 = \frac{1}{25}(15, -12, 9)$. לכן $||u_3||^2 = \frac{1}{25^2}(225 + 144 + 81) = \frac{1}{25^2}(450) = \frac{18}{25}$. המרחק המבוקש הוא $||u_3|| = \sqrt{\frac{18}{25}} = \frac{3}{5}\sqrt{2}$. ■

תרגיל 10.15: אם מבצעים תהליך גרם-שמידט על v_1, \dots, v_r ו- v_{r+1}, \dots, v_n סדרה אורתוגונלית, אז $u_1 = v_1, u_2 = v_2, \dots, u_r = v_r$.

הוכחה: באינדוקציה: לפי הבניה, תמיד $u_1 = v_1$.

נניח $u_1 = v_1, \dots, u_k = v_k$, באשר $1 \leq k < r$. אז $u_{k+1} = v_{k+1} - (c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_k u_k)$.
 באשר $c_i = \begin{cases} \frac{\langle v_i, v_{k+1} \rangle}{||v_i||^2} = 0 & u_i \neq 0 \\ 0 & u_i = 0 \end{cases}$ לכן $u_{k+1} = v_{k+1}$. ■

מסקנה 10.16: יהי V מרחב מכפלה פנימית נוצר סופית. תהי v_1, \dots, v_r סדרה אורתוגונלית, שאיבריה שונים מאפס. אז אפשר להשלימה לבסיס אורתוגונלי של V .

הוכחה: לפי משפט 10.9, v_1, \dots, v_r בלתי תלויה לינארית. לכן ניתן להשלימה לבסיס $v_1, \dots, v_r, \dots, v_n$ של V . תהליך גרם-שמידט עליו יתן בסיס אורתוגונלי $u_1, \dots, u_r, \dots, u_n$. לפי תרגיל 10.15, $u_1 = v_1, \dots, u_r = v_r$. ■

משפט 10.17 (אי שוויון Cauchy-Schwarz): יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהיו v_1, v_2 שני וקטורים ב- V . אז מתקיים $|\langle v_1, v_2 \rangle| \leq ||v_1|| \cdot ||v_2||$ ויש כאן שוויון אם ורק אם v_1, v_2 תלויים לינארית.

הוכחה: אם $v_1 = 0$, יש שוויון ו- v_1, v_2 תלויים לינארית. לכן נניח $v_1 \neq 0$.

תהליך גרם-שמידט על v_1, v_2 נותן סדרה אורתוגונלית u_1, u_2 , בה $u_1 = v_1, u_2 = v_2 - c_1 u_1$, באשר $c_1 = \frac{\langle u_1, v_2 \rangle}{||u_1||^2}$. נעביר $c_1 u_1$ לאגף שני ונקבל $v_2 = c_1 u_1 + u_2$. לפי למת האיפיון 10.7(ג),

$$||v_2||^2 = |c_1|^2 \cdot ||u_1||^2 + ||u_2||^2 = \frac{|\langle v_1, v_2 \rangle|^2}{||u_1||^2} + ||u_2||^2 \geq \frac{|\langle v_1, v_2 \rangle|^2}{||u_1||^2}$$

יש שוויון אם ורק אם $||u_2|| = 0$, כלומר, $u_2 = 0$, כלומר (לפי התנאים של תהליך גרם-שמידט), $v_2 \in \text{Sp}(v_1)$, כלומר, v_1, v_2 תלויים לינארית. נכפיל את האי שוויון ב- $||u_1||^2$ כדי לקבל את מבוקש. ■

משפט 10.18 (אי שוויון המשולש): יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהיו $v_1, v_2 \in V$. אז $||v_1 + v_2|| \leq ||v_1|| + ||v_2||$.

הוכחה: נשתמש באי שוויון קושי-שוורץ כדי להוכיח $(||v_1 + v_2||)^2 \leq (||v_1|| + ||v_2||)^2$:

$$(||v_1 + v_2||)^2 = \langle v_1 + v_2, v_1 + v_2 \rangle = \langle v_1, v_1 \rangle + \langle v_1, v_2 \rangle + \langle v_2, v_1 \rangle + \langle v_2, v_2 \rangle =$$

$$||v_1||^2 + \langle v_1, v_2 \rangle + \overline{\langle v_1, v_2 \rangle} + ||v_2||^2 = ||v_1||^2 + 2\text{Re}(\langle v_1, v_2 \rangle) + ||v_2||^2 \leq$$

$$||v_1||^2 + 2|\langle v_1, v_2 \rangle| + ||v_2||^2 \leq ||v_1||^2 + 2||v_1|| \cdot ||v_2|| + ||v_2||^2 = (||v_1|| + ||v_2||)^2$$

תרגיל 10.19: אם v ניצב ל- u_k, \dots, u_1 אז הוא ניצב לכל $u \in \text{Sp}(u_1, \dots, u_k)$.

הגדרה 10.20: יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי U תת מרחב שלו. המשלים הניצב (האורתוגונלי) הוא

$$U^\perp = \{v \in V \mid \langle u, v \rangle = 0 \text{ לכל } u \in U\}$$

למה 10.21: (א) U^\perp הוא תת מרחב של V ;

$$U \cap U^\perp = \{0\} \quad (\text{ב})$$

הוכחה: (א) יהיו $v, v' \in U^\perp$ ויהי $\alpha \in F$. אז, לכל $u \in U$,

$$\langle u, v + v' \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, v' \rangle = 0 + 0 = 0$$

ולכן $v + v' \in U^\perp$.

כמו כן $\alpha v \in U^\perp$ ולכן $\langle u, \alpha v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle = \alpha \cdot 0 = 0$

לבסוף, $\langle u, 0 \rangle = 0$ לכל $u \in U$, לכן $0 \in U^\perp$.

(ב) יהי $u \in U \cap U^\perp$. אז $\langle u, u \rangle = \|u\|^2 = 0$ ולכן $u = 0$. ■

מציאת המשלים הניצב במרחב נוצר סופית:

יהי v_1, \dots, v_r בסיס של U . נשלים אותו לבסיס $v_1, \dots, v_r, \dots, v_n$ של V . תהליך גרס-שמידט יתן

בסיס אורתוגונלי $u_1, \dots, u_r, \dots, u_n$ כך ש- $\text{Sp}(u_1, \dots, u_r) = U = \text{Sp}(v_1, \dots, v_r)$. ואז:

משפט 10.22: יהי V מרחב מכפלה פנימית נוצר סופית. אז בסימונים לעיל

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U, U^\perp = \text{Sp}(u_{r+1}, \dots, u_n) \quad (\text{א})$$

$$U \oplus U^\perp = V, U + U^\perp = V \quad (\text{ב})$$

הוכחה: (א) תחילה נראה $U^\perp \supseteq \text{Sp}(u_{r+1}, \dots, u_n)$. לשם כך די להוכיח ש- $u_k \in U^\perp$ לכל $r+1 \leq k \leq n$.

יהי $u \in U$. אז יש $a_1, \dots, a_r \in F$ כך ש- $u = a_1 u_1 + \dots + a_r u_r$. מכאן

$$\langle u_k, u \rangle = a_1 \langle u_k, u_1 \rangle + \dots + a_r \langle u_k, u_r \rangle = 0$$

לכן $u_k \in U^\perp$.

להיפך, יהי $v \in U^\perp$. אז $v \in V$ ולכן יש $a_1, \dots, a_n \in F$ כך ש- $v = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n$. יהי

$1 \leq i \leq r$. אז $v \perp u_i$ ולכן, לפי למת האיפיון 10.7, $a_i = 0$. מכאן $v = a_{r+1} u_{r+1} + \dots + a_n u_n \in \text{Sp}(u_{r+1}, \dots, u_n)$.

(ב) לפי (א), $U + U^\perp = \text{Sp}(u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n) = V$. ■

מסקנה 10.23: אם V נוצר סופית אז $(U^\perp)^\perp = U$.

בפרק זה יהי $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$, ו- V הוא מרחב מכפלה פנימית בעל מימד סופי מעל F . תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית.

משפט 11.1: לכל $v \in V$ קיים $w = T^*(v) \in V$ יחיד שמקיים

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, w \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle \quad \text{לכל } u \in V \quad (1)$$

יתר על כן, ההעתקה $T^*: V \rightarrow V$ לינארית.

הוכחה: יהי u_1, \dots, u_n בסיס אורתונורמלי של V .

יחידות w : יהי $w \in V$. לפי למת האיפיון 10.7(א), $w = \sum_{i=1}^n \langle u_i, w \rangle u_i$. אם w מקיים (1), אז

$$w = \sum_{i=1}^n \langle T(u_i), v \rangle u_i \quad (2)$$

ומכאן היחידות.

קיום w : נגדיר w על ידי (2). לפי למת האיפיון 10.7(א), $\langle u_i, w \rangle = \langle T(u_i), v \rangle$ לכל i . לכן לפי למת

האיפיון 10.7(ב),

$$\langle u, w \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{\langle u_i, u \rangle} \langle u_i, w \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{\langle u_i, u \rangle} \langle T(u_i), v \rangle$$

אך מצד שני, לפי למת האיפיון 10.7(א), $u = \sum_{i=1}^n \langle u_i, u \rangle u_i$, לכן $T(u) = \sum_{i=1}^n \langle u_i, u \rangle T(u_i)$. מכאן

$$\langle T(u), v \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{\langle u_i, u \rangle} \langle T(u_i), v \rangle$$

לכן (1) מתקיים.

T^* לינארית: יהי $a \in F$. אז לכל $u \in V$

$$\langle T(u), av \rangle = a \langle T(u), v \rangle = a \langle u, T^*(v) \rangle = \langle u, aT^*(v) \rangle$$

ומכאן $T^*(av) = aT^*(v)$

יהיו $v_1, v_2 \in V$ אז

$$\langle T(u), v_1 + v_2 \rangle = \langle T(u), v_1 \rangle + \langle T(u), v_2 \rangle = \langle u, T^*(v_1) \rangle + \langle u, T^*(v_2) \rangle = \langle u, T^*(v_1) + T^*(v_2) \rangle$$

ומכאן $T^*(v_1 + v_2) = T^*(v_1) + T^*(v_2)$ ■

הגדרה 11.2: (א) T^* נקראת ההעתקה הצמודה של T .

(ב) אם $A \in M_n(F)$, אז המטריצה הצמודה לה $A^* \in M_n(F)$ מוגדרת על ידי

$$\text{לכל } 1 \leq i, j \leq n \quad (A^*)_{ij} = \overline{(A)_{ji}}$$

(כלומר, $A^* = \overline{A^t}$, אם $F = \mathbb{R}$ אז $A^* = A^t$).

בהמשך נסמן את המטריצה של העתקה T לפי בסיס \mathcal{B} ב- $[T]_{\mathcal{B}}$ (במקום $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$).

משפט 11.3: יהי $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ בסיס אורתונורמלי של V . אז $[T^*]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^*$.

הוכחה: לפי למת האיפיון 10.7 (א), הרכיב ה- j של העמודה ה- i של $[T]_{\mathcal{B}}$ הוא $\langle u_j, T(u_i) \rangle$. לכן

$$([T^*]_{\mathcal{B}})_{ij} = \overline{([T]_{\mathcal{B}})_{ji}} = \overline{\langle u_j, T(u_i) \rangle} = \langle T(u_i), u_j \rangle = \langle u_i, T^*(u_j) \rangle = ([T^*]_{\mathcal{B}})_{ij}$$

■

למה 11.4: יהי $a \in F$ ותהינה $T, S: V \rightarrow V$ העתקות לינאריות. אז

$$(T + S)^* = T^* + S^* \quad (\text{א})$$

$$(aT)^* = \bar{a}T^* \quad (\text{ב})$$

$$(TS)^* = S^*T^* \quad (\text{ג})$$

$$(T^*)^* = T \quad (\text{ד})$$

הוכחה: יהי \mathcal{B} בסיס אורתונורמלי של V ותהינה $A = [T]_{\mathcal{B}}, B = [S]_{\mathcal{B}}$. אז $[T + S]_{\mathcal{B}} = A + B$.

$$[aT]_{\mathcal{B}} = aA, [TS]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}[S]_{\mathcal{B}} = AB, \text{ ולכן די להוכיח}$$

$$(A + B)^* = A^* + B^* \quad (\text{א})$$

$$(aA)^* = \bar{a}A^* \quad (\text{ב})$$

$$(AB)^* = B^*A^* \quad (\text{ג})$$

$$(A^*)^* = A \quad (\text{ד})$$

וזה קל. למשל, (ג)

$$\begin{aligned} ((AB)^*)_{ij} &= \overline{(AB)_{ji}} = \overline{\sum_{k=1}^n (A)_{jk}(B)_{ki}} = \sum_{k=1}^n \overline{(A)_{jk}(B)_{ki}} = \sum_{k=1}^n \overline{(A)_{jk}} \overline{(B)_{ki}} = \\ &= \sum_{k=1}^n (B^*)_{ik} (A^*)_{kj} = (B^*A^*)_{ij} \end{aligned}$$

לכל i, j ולכן $(AB)^* = B^*A^*$.

אפשר לתת גם הוכחה ישירה, לא דרך המטריצות. למשל, (ד): לכל $u \in V$

$$\langle T^*(u), v \rangle = \overline{\langle v, T^*(u) \rangle} = \overline{\langle T(v), u \rangle} = \langle u, T(v) \rangle$$

ומכאן לפי ההגדרה $(T^*)^*(v) = T(v)$. ■

הגדרה 11.5: תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית ותהי $A \in M_n(F)$

T נקראת צמודה לעצמה אם $T = T^*$ ($A = A^*$).

T נקראת אוניטרית אם $T^*T = 1_V$ ($A^*A = I$).

T נקראת נורמלית אם $T^*T = TT^*$ ($A^*A = AA^*$).

אם $F = \mathbb{C}$, אומרים גם הרמיטית במקום "צמודה לעצמה".

אם $F = \mathbb{R}$, אומרים גם סימטרית במקום "צמודה לעצמה".

אם $F = \mathbb{R}$, אומרים גם אורתוגונלית במקום "אוניטרית". ■

מסקנה 11.6: יהי \mathcal{B} בסיס אורתונורמלי של V ותהי $A = [T]_{\mathcal{B}}$. אז T צמודה לעצמה/אוניטרית/נורמלית אם ורק אם A כזו.

תרגיל 11.7: אם $\langle u, T(v) \rangle = 0$ לכל $u, v \in V$ אז $T = 0$.

הוכחה: יהי $v \in V$. נקח $u = T(v)$. אז $\langle T(v), T(v) \rangle = 0$, לכן $T(v) = 0$. מכאן $T = 0$. ■

למה 11.8: נניח $\langle v, T(v) \rangle = 0$ לכל $v \in V$ וכי

(א) $F = \mathbb{C}$; או

(ב) $F = \mathbb{R}$ ו- T צמודה לעצמה.

אז $T = 0$.

הוכחה: יהיו $u, v \in V$ ויהי $a \in F$

$$\begin{aligned} 0 &= \langle u + av, T(u + av) \rangle = \langle u, T(u) \rangle + \bar{a}\langle v, T(u) \rangle + a\langle u, T(v) \rangle + \bar{a}a\langle v, T(v) \rangle = \\ &= \bar{a}\langle v, T(u) \rangle + a\langle u, T(v) \rangle \end{aligned}$$

(א) נניח כי $F = \mathbb{C}$. אם נציב בחישוב לעיל $a = 1$ ואח"כ $a = i$, נקבל

$$\langle v, T(u) \rangle + \langle u, T(v) \rangle = 0$$

$$-i\langle v, T(u) \rangle + i\langle u, T(v) \rangle = 0$$

ומכאן $\langle u, T(v) \rangle = 0$ לכל $u, v \in V$. לפי התרגיל, $T = 0$.

(ב) נניח כי $F = \mathbb{R}$ ו- $T^* = T$. אז (כיון ש- $\bar{b} = b$ לכל $b \in \mathbb{R}$)

$$\langle v, T(u) \rangle = \langle v, T^*(u) \rangle = \langle T(v), u \rangle = \langle u, T(v) \rangle$$

לכן אם נציב בחישוב לעיל $a = 1$, נקבל $2\langle u, T(v) \rangle = 0$, ומכאן $\langle u, T(v) \rangle = 0$ לכל $u, v \in V$. לפי

התרגיל, $T = 0$. ■

דוגמה 11.9: תנאים (א) או (ב) אכן נחוצים: יהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ הסיבוב ב- 90° סביב הראשית. אז $T \neq 0$, אך

■ $\langle v, T(v) \rangle = 0$ לכל $v \in V$.

משפט 11.10: נניח כי $F = \mathbb{C}$. אז $T = T^*$ אם ורק אם $\langle v, T(v) \rangle \in \mathbb{R}$ לכל $v \in V$.

הוכחה: נניח $T^* = T$. אז $\langle v, T(v) \rangle = \langle v, T^*(v) \rangle = \langle T(v), v \rangle = \overline{\langle v, T(v) \rangle}$ ולכן $\langle v, T(v) \rangle$ ממשי.

להיפך, נניח $\langle v, T(v) \rangle \in \mathbb{R}$ לכל $v \in V$. אז לכל $v \in V$

$$\langle v, (T - T^*)(v) \rangle = \langle v, T(v) \rangle - \langle v, T^*(v) \rangle = \langle v, T(v) \rangle - \langle T(v), v \rangle = \langle v, T(v) \rangle - \overline{\langle v, T(v) \rangle} = 0$$

ולכן לפי הלמה $T - T^* = 0$, כלומר, $T = T^*$. ■

תרגיל 11.11: ההעתקות $T^*T - 1_V$, TT^* , T^*T צמודות לעצמן.

משפט 11.12: התנאים הבאים שקולים זה לזה:

$$(1) \quad T^*T = 1_V \text{ כלומר, } T \text{ אוניטרית, כלומר,}$$

$$(2) \quad TT^* = 1_V$$

$$(3) \quad T \text{ מעתיקה כל בסיס אורתונורמלי של } V \text{ לבסיס אורתונורמלי של } V$$

$$(4) \quad T \text{ מעתיקה בסיס אורתונורמלי מסוים של } V \text{ לבסיס אורתונורמלי של } V$$

$$(5) \quad T \text{ משמרת מכפלה פנימית, כלומר: } \langle T(u), T(v) \rangle = \langle u, v \rangle \text{ לכל } u, v \in V$$

$$(6) \quad T \text{ משמרת נורמה, כלומר: } \|T(u)\| = \|u\| \text{ לכל } u \in V$$

$$(7) \quad T \text{ משמרת מרחק, כלומר: } \|T(u) - T(v)\| = \|u - v\| \text{ לכל } u, v \in V$$

הוכחה:

$$(1) \Leftrightarrow (2): \text{ אם } T^*T = 1_V \text{ אז } T, T^* \text{ הפיכות (} T \text{ חח"ע ו-} T^* \text{ על. בדוק!) לכן } T^* = T^{-1} \text{ מכאן}$$

$$TT^* = 1_V$$

$$(1) \Leftrightarrow (2): \text{ באותו אופן (החלף בין } T \text{ לבין } T^*).$$

(1) \Leftarrow (3): יהי בסיס אורתונורמלי של V . אז לכל $1 \leq i, j \leq n$

$$\langle T(u_i), T(u_j) \rangle = \langle u_i, T^*T(u_j) \rangle = \langle u_i, 1_V(u_j) \rangle = \langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$$

$T(u_1), \dots, T(u_n)$ אורתונורמלית. לכן היא בלתי תלויה לינארית: היות ו- $n = \dim V$, היא אף בסיס.

(3) \Leftarrow (4): טריביאלי.

(4) \Leftarrow (5): נניח כי בסיס אורתונורמלי וגם $T(u_1), \dots, T(u_n)$ בסיס אורתונורמלי. יהיו

$$u = \sum_{i=1}^n a_i u_i, v = \sum_{i=1}^n b_i u_i$$

$$\langle T(u), T(v) \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n a_i T(u_i), \sum_{i=1}^n b_i T(u_i) \right\rangle = \sum_{i=1}^n \bar{a}_i b_i$$

$$\langle u, v \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n a_i u_i, \sum_{i=1}^n b_i u_i \right\rangle = \sum_{i=1}^n \bar{a}_i b_i$$

כלומר, $\langle T(u), T(v) \rangle = \langle u, v \rangle$.

$$\|T(u)\|^2 = \langle T(u), T(u) \rangle = \langle u, u \rangle = \|u\|^2 \quad (5) \Leftarrow (6)$$

$$\|T(u) - T(v)\| = \|T(u - v)\| = \|u - v\| \quad (6) \Leftarrow (7)$$

$$(7) \Leftarrow (1): \text{יהי } u \in V. \text{ לפי ההנחה (עם } v = 0 \text{): } \|T(u)\| = \|u\|. \text{ לכן}$$

$$\langle u, T^*T(u) \rangle = \langle T(u), T(u) \rangle = \|T(u)\|^2 = \|u\|^2 = \langle u, u \rangle = \langle u, 1_V(u) \rangle$$

מכאן

$$u \in V \quad \langle u, (T^*T - 1_V)(u) \rangle = 0$$

לפי תרגיל 11.11, $T^*T - 1_V$ צמודה לעצמה, לכן לפי למה 11.8 (ב), $T^*T - 1_V = 0$. לכן $T^*T = 1_V$.

משפט 11.13: עבור $A \in M_n(F)$ שלושת התנאים הבאים שקולים זה לזה:

(א) A אוניטרית, כלומר, $A^*A = I$ (כלומר, $AA^* = I$).

(ב) העמודות של A מהוות בסיס אורתונורמלי של F^n (ביחס למכפלה הסטנדרטית על F^n).

(ג) השורות של A מהוות בסיס אורתונורמלי של F^n (ביחס למכפלה הסטנדרטית על F^n).

הוכחה: (אם u שורה או עמודה של מטריצה, נסמן ב- $(u)_k$ הרכיב ה- k שלה.)

(א) ⇔ (ב):

תהינה u_1, \dots, u_n העמודות של A . אז $\overline{u_1^t}, \dots, \overline{u_n^t}$ הן השורות של A^* . מכאן

$$(A^*A)_{ij} = \sum_{k=1}^n \overline{(u_i^t)_k} (u_j)_k = \sum_{k=1}^n \overline{(u_i)_k} (u_j)_k = \langle u_i, u_j \rangle_{st}$$

לכן $A^*A = I \iff i, j$ לכל $\langle u_i, u_j \rangle_{st} = \delta_{ij} \iff u_1, \dots, u_n$ אורתונורמלית

(א) ⇔ (ג): תהינה v_1, \dots, v_n השורות של A . אז $\overline{v_1^t}, \dots, \overline{v_n^t}$ הן העמודות של A^* . מכאן

$$(AA^*)_{ij} = \sum_{k=1}^n (v_i)_k \overline{(v_j^t)_k} = \sum_{k=1}^n \overline{(v_j)_k} (v_i)_k = \langle v_j, v_i \rangle_{st}$$

לכן $AA^* = I \iff i, j$ לכל $\langle v_j, v_i \rangle_{st} = \delta_{ji} \iff v_1, \dots, v_n$ אורתונורמלית. ■

תרגיל 11.14: תהי $A \in M_n(F)$ מטריצת המעבר מבסיס אורתונורמלי \mathcal{B} של V לבסיס \mathcal{B}' של V . אז \mathcal{B}' אורתונורמלי $\iff A$ אוניטרית.

הוכחה: נניח $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$, $\mathcal{B}' = (u'_1, \dots, u'_n)$. אז $A = ([u'_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [u'_n]_{\mathcal{B}})$, כלומר, רכיב $(A)_{ij}$ של A הוא הרכיב ה- i של u'_j לפי בסיס \mathcal{B} . לכן, לפי למת האיפיון 10.7(א), $(A)_{ij} = \langle u_i, u'_j \rangle$. מכאן לפי למת האיפיון 10.7(ב)

$$(A^*A)_{ij} = \sum_{k=1}^n (A^*)_{ik} (A)_{kj} = \sum_{k=1}^n \overline{(A)_{ki}} (A)_{kj} = \sum_{k=1}^n \langle u_k, u'_i \rangle \langle u_k, u'_j \rangle = \langle u'_i, u'_j \rangle$$

לכן $A^*A = I \iff (A^*A)_{ij} = \delta_{ij} \iff u'_1, \dots, u'_n$ אורתונורמלית. ■

דוגמה 11.15: מטריצה $A = (\lambda) \in M_1(F)$ אוניטרית אם ורק אם $|\lambda| = 1$.

(לפי משפט 11.13) $A \in M_2(\mathbb{R})$ אורתוגונלית (=אוניטרית מעל \mathbb{R}) אם ורק אם היא מהצורה

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{או} \quad A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

עבור איזה $\theta \in \mathbb{R}$. (הימנית מייצגת סיבוב סביב הראשית, השמאלית שיקוף ביחס לציר דרך הראשית). ■

תרגיל 11.16: תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית ויהי W תת מרחב שמור- T . אז W^\perp הוא שמור- T^* .

הוכחה: יהי $v \in W^\perp$. אז לכל $w \in W$ מתקיים $T(w) \in W$ ולכן $\langle T(w), v \rangle = \langle w, T^*(v) \rangle = 0$, כלומר,

■ $T^*(v) \in W^\perp$ מכאן W^\perp קטור ב- W . ■

למה 11.17: תהי $T: V \rightarrow V$ נורמלית ויהי $\lambda \in F, v \in V$ אם $T(v) = \lambda v$ אז $T^*(v) = \bar{\lambda}v$.

הוכחה: תחילה נניח כי $\lambda = 0$. אז $T(v) = 0$. מכאן

$$\begin{aligned} \|T^*(v)\|^2 &= \langle T^*(v), T^*(v) \rangle = \langle v, (T^*)^* T^*(v) \rangle = \langle v, TT^*(v) \rangle = \\ &= \langle v, T^*T(v) \rangle = \langle T(v), T(v) \rangle = \|T(v)\|^2 = 0 \end{aligned}$$

ולכן $T^*(v) = 0$ כנדרש.

המקרה הכללי: נסמן $N = T - \lambda 1_V$ אז $N^* = T^* - \bar{\lambda} 1_V = T^* - \bar{\lambda} 1_V$. לכן

$$\begin{aligned} NN^* &= (T - \lambda 1_V)(T^* - \bar{\lambda} 1_V) = TT^* - \lambda T^* - \bar{\lambda} T + \lambda \bar{\lambda} 1_V = \\ &= T^*T - \bar{\lambda} T - \lambda T^* + \lambda \bar{\lambda} 1_V = (T^* - \bar{\lambda} 1_V)(T - \lambda 1_V) = N^*N \end{aligned}$$

כלומר N נורמלית. כעת, $N(v) = T(v) - \lambda v = 0$. לכן לפי המקרה הקודם, $N^*(v) = 0$, כלומר,

$$\blacksquare \quad T^*(v) - \bar{\lambda}v = 0, \text{ כלומר, } T^*(v) = \bar{\lambda}v$$

למה 11.18: תהי $T: V \rightarrow V$ נורמלית. וקטורים עצמיים של T השייכים לערכים עצמיים שונים היום ניצבים זה לזה.

הוכחה: יהיו $v, w \in V$ כך ש- $T(v) = \lambda v, T(w) = \mu w$, באשר $\lambda, \mu \in F$ שונים. לפי הלמה הקודמת,

$$T^*(v) = \bar{\lambda}v \text{ לכן}$$

$$\mu \langle v, w \rangle = \langle v, \mu w \rangle = \langle v, T(w) \rangle = \langle T^*(v), w \rangle = \langle \bar{\lambda}v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$$

$$\blacksquare \quad \langle v, w \rangle = 0 \text{ לכן } \lambda - \mu \neq 0, \text{ אבל } (\lambda - \mu) \langle v, w \rangle = 0$$

שני המשפטים הבאים (11.20 ו-11.23) הם התוצאות המרכזיות של הפרק, האחד עבור $F = \mathbb{C}$ והשני עבור

$F = \mathbb{R}$. עיקר ההוכחה נעשית בלמה הבאה - באופן מאוחד לשני השדות:

למה 11.19: תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית כך ש- f_T הוא מכפלה של גורמים מהצורה $X - \lambda$, אז T

נורמלית אם ורק אם קיים בסיס אורתונורמלי \mathcal{B} של V המורכב מוקטורים עצמיים של T (כלומר, $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית).

הוכחה: \Rightarrow : נניח $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$, באשר $T(u_i) = \lambda_i u_i$ לכל $1 \leq i \leq n$. תהי $A = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$. לפי

$$\text{משפט 4.7, } A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \text{ ולכן } A^* = \text{Diag}(\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n) \text{ מכאן}$$

$$AA^* = \text{Diag}(\lambda_1 \bar{\lambda}_1, \dots, \lambda_n \bar{\lambda}_n) = \text{Diag}(\bar{\lambda}_1 \lambda_1, \dots, \bar{\lambda}_n \lambda_n) = A^*A$$

כלומר, A נורמלית. לפי מסקנה 11.6, T נורמלית.

\Leftarrow : יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in F$ הערכים העצמיים השונים של T . לכל מרחב עצמי V_{λ_i} נבחר בסיס

אורתונורמלי. לפי למה 11.18, צירוף הבסיסים האלה היא סדרה אורתונורמלית. נסמנה \mathcal{B} , ויהי $W = \text{Sp}(\mathcal{B})$. נשים

לב ש- $V_{\lambda_i} \subseteq W$ לכל i . נראה ש- $W = V$ ואז \mathcal{B} היא בסיס אורתונורמלי של V , לפי משפט 10.9.

די להראות כי $W^\perp = \{0\}$, כי אז לפי מסקנה 10.23, $W^\perp = \{0\}^\perp = V$.

טענה: W^\perp הוא שמור- T .

אם $u \in \mathcal{B}$, אז יש i כך ש- $u = \lambda_i u$; $T(u) = \lambda_i u$; לפי למה 11.17, $T^*(u) = \overline{\lambda_i} u$, ובפרט $T^*(u) \in \text{Sp}(\mathcal{B})$. לכן $T^*(W) = T^*(\text{Sp}(\mathcal{B})) = \text{Sp}(T^*(\mathcal{B})) \subseteq W$. לפי למה 11.4(ד), $(T^*)^* = T$. לכן לפי תרגיל 11.16, W^\perp הוא שמור- T .

ניח בשלילה כי $W^\perp \neq \{0\}$. יהי S הצמצום של T ל- W^\perp . אז $\deg f_S \geq 1$. לפי משפט 10.22, $V = W \oplus W^\perp$, לכן לפי מסקנה 7.9, f_S מחלק את f_T . מכאן שגם f_S הוא מכפלה של גורמים מהצורה $X - \lambda$, $\lambda \in F$. בפרט ל- f_S יש שורש $\lambda \in F$. אז λ ערך עצמי של S , כלומר, יש $u \in W^\perp \subseteq V$, $u \neq 0$ כך ש- $T(u) = S(u) = \lambda u$. מכאן ש- λ גם ערך עצמי של T , כלומר יש i כך ש- $\lambda = \lambda_i$. ולכן $u \in V_{\lambda_i} \subseteq W$. אבל אז $0 \neq u \in W \cap W^\perp = \{0\}$. סתירה. ■

אם $F = \mathbb{C}$, התנאי על f_T בלמה 11.19 מתקיים בגלל המשפט היסודי של אלגברה. לכן הוכחנו:

משפט 11.20: נניח $F = \mathbb{C}$. העתקה לינארית $T: V \rightarrow V$ היא נורמלית אם ורק אם קיים בסיס אורתונורמלי \mathcal{B} של V המורכב מוקטורים עצמיים של T (כלומר, $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית).

מסקנה 11.21: תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$. אז A נורמלית אם ורק אם קיימת $P \in M_n(\mathbb{C})$ אוניטרית כך ש- $P^{-1}AP = P^*AP$ אלכסונית.

הוכחה: יהי $V = \mathbb{C}^n$ ויהי St הבסיס הסטנדרטי שלו; אז St אורתונורמלי. תהי $T: V \rightarrow V$ נתונה על ידי $T(v) = Av$; אז $[T]_{\text{St}}^{\text{St}} = A$. לפי מסקנה 11.6, A נורמלית אם ורק אם T נורמלית. לפי המשפט הקודם T נורמלית אם ורק אם יש בסיס אורתונורמלי \mathcal{B} של V כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית.

אם זה קורה, תהי P מטריצת המעבר מ- St ל- \mathcal{B} ; לפי תרגיל 11.14, P אוניטרית. כידוע, $P^{-1}AP = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ לכן $P^{-1}AP$ אלכסונית.

להיפך, נניח כי $P \in M_n(\mathbb{C})$ אוניטרית כך ש- $P^{-1}AP$ אלכסונית. אז P מטריצת המעבר מ- St לסדרה \mathcal{B} כלשהי (ביתר דיוק, \mathcal{B} סדרת העמודות של P); לפי תרגיל 11.14, \mathcal{B} בסיס אורתונורמלי. כידוע, $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = P^{-1}AP$. לכן $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית. ■

מסקנה 11.22: תהי $A \in M_n(F)$ נורמלית. אז

(א) A צמודה לעצמה אם ורק אם כל שרשי $f_A(X)$ ב- \mathbb{C} (!) הם ממשיים.

(ב) A אוניטרית אם ורק אם כל שרשי $f_A(X)$ ב- \mathbb{C} (!) הם בעלי ערך מוחלט 1.

הוכחה: נתבונן ב- A כמטריצה מעל \mathbb{C} (גם אם $F = \mathbb{R}$). אז A נורמלית, לכן לפי מסקנה 11.21 יש $P \in M_n(\mathbb{C})$ אוניטרית כך ש- $P^{-1}AP = P^*AP = D = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, נאמר, אלכסונית, באשר $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$. אז $D^* = P^*A^*P$ ומכאן בקלות:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \text{ או } A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$f_T = f_A = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A = X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$$

$$[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ כן ש-} \mathcal{B}' \text{ יש בסיס אורתונורמלי אחר}$$

קעת נניח כי $\dim V \geq 3$ וכי המשפט הוכח עבור כל מרחב ממימד $\dim V > 3$.

טענה א: יש תת מרחב $W \subseteq V$ שמור- T כן ש- $0 < \dim W < \dim V$ אכן, אם ל- T יש וקטור עצמי $w \neq 0$,

אז $W = \operatorname{Sp}(w)$ הוא שמור- T ממימד 1. נניח, אם כן, של- T אין וקטורים עצמיים שונים מאפס.

יהי $V \rightarrow V: S = T + T^* = T + T^{-1}$. אז $S = T + T^* = T + T^{-1}$ לכן לפי

מסקנה 11.22(א), יש ל- S ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{R}$. אז $W = \{v \in V \mid S(v) = \lambda v\} = \operatorname{Ker}(S - \lambda 1_V)$ הוא

ממימד ≤ 1 . כיון ש- $T^*T = TT^*$ מתקיים

$$(S - \lambda 1_V)T = (T + T^* - \lambda 1_V)T = T(T + T^* - \lambda 1_V) = T(S - \lambda 1_V)$$

לכן לפי תרגיל 7.3, $W = \operatorname{Ker}(S - \lambda 1_V)$ הוא שמור- T . לכן אם $W \neq V$, הוכחנו את הטענה. נניח, אם כן, כי

$$W = V$$

כלל $v \in V$ מתקיים $S(v) = \lambda v$, ולכן $(T + T^{-1})(v) = \lambda v$ ונכפיל זאת ב- T

משמאל ונקבל

$$T^2 - \lambda T + 1_V = 0$$

נבחר $v \in V$, $v \neq 0$. אז $T(v)$ אינו כפולה שלו (אחרת v היה וקטור עצמי של T , סתירה), לכן $T(v)$ בלתי

תלויים לינארית. נסמן $W' = \operatorname{Sp}(v, T(v))$. אז W' בעל מימד 2 והוא שמור- T , כי $T(v) \in W'$ וגם

$$T(T(v)) = T^2(v) = (\lambda T - 1_V)(v) = \lambda T(v) - v \in W'$$

בזאת הוכחה טענה א.

טענה ב: אם $W \subseteq V$ תת מרחב שמור- T , אז גם W^\perp שמור- T . אכן, יהי $u \in W^\perp$, לפי תרגיל 11.16, W^\perp

שמור- T^* . היות ו- T^* חד חד ערכית (כי $TT^* = 1_V$) ומעתיקה את W^\perp לתוך W^\perp , היא מעתיקה את W^\perp על

$$W^\perp. \text{ לכן יש } v \in W^\perp \text{ ש-} T^*(v) = u. \text{ אז } u = T^*(v) \text{ ו-} v \in W^\perp \text{ כי } T^*(v) = 1_V(v) = v \in W^\perp.$$

טענה ג: סיום ההוכחה. יהי W כמו בטענה א. נסמן $W_1 = W, W_2 = W^\perp$. אז W_1, W_2 שמורי- T . לפי

משפט 10.22(ב), $V = W_1 \oplus W_2$, ו- $\dim W_1, \dim W_2 < \dim V$ (כי $\dim V = \dim W_1 + \dim W_2$).

לפי הנחת האינדוקציה יש בסיס אורתונורמלי \mathcal{B}_i של W_i כן ש- $[T]_{\mathcal{B}_i}^{\mathcal{B}_i}$ מהצורה המבוקשת. אז $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ הוא

בסיס של V , הוא אורתונורמלי, ו- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} [T]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_1} & 0 \\ 0 & [T]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2} \end{pmatrix}$ (עד כדי הסדר של אברי \mathcal{B}). ■

בפרק זה יהיו V, W מרחבים וקטוריים ממימד סופי מעל שדה F .

הגדרה 12.1: **תבנית בילינארית על $V \times W$** היא העתקה $f: V \times W \rightarrow F$ המקיימת

$$\begin{aligned} f(v + v', w) &= f(v, w) + f(v', w) \\ f(\alpha v, w) &= \alpha f(v, w) \\ f(v, w + w') &= f(v, w) + f(v, w') \\ f(v, \alpha w) &= \alpha f(v, w) \end{aligned}$$

לכל $w, w' \in W, v, v' \in V, \alpha \in F$.

תבנית בילינארית על $V \times V$ נקראת גם, בקיצור, **תבנית בילינארית על V** .

דוגמאות 12.2:

(א) תבנית האפס: $f(v, w) = 0$ לכל $v \in V, w \in W$.

(ב) מכפלה פנימית במרחב מכפלה פנימית מעל $F = \mathbb{R}$ היא תבנית בילינארית.

(ג) אם φ פונקציונל לינארי על V (כלומר, העתקה לינארית $\varphi: V \rightarrow F$) ו- ψ פונקציונל לינארי על W , אז

$f: V \times W \rightarrow F$, הנתונה על ידי $f(v, w) = \varphi(v)\psi(w)$, היא תבנית בילינארית.

(ד) יהיו $V = F^m, W = F^n$ (מרחבי עמודות). תהי $A \in M_{m \times n}(F)$. נתאים לה העתקה $f: F^m \times F^n \rightarrow F$

על ידי $f(v, w) = v^t A w \in F = M_1(F)$ (מזהים $M_1(F)$ עם F). במפורש: אם $A = (a_{ij})$

אז $w = (y_1, \dots, y_n)^t, v = (x_1, \dots, x_m)^t$

$$\begin{aligned} f(v, w) &= (x_1, \dots, x_m) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \\ &= (x_1, \dots, x_m) \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} y_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj} y_j \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i a_{ij} y_j \end{aligned}$$



נגדיר על אוסף התבניות הבילינאריות על $V \times W$ חיבור וכפל בסקלר:

$$(f + g)(v, w) = f(v, w) + g(v, w)$$

$$(\alpha f)(v, w) = \alpha f(v, w)$$

קל לבדוק שאם f, g תבניות בילינאריות, אז גם $f + g, \alpha f$ תבניות בילינאריות. יתר על כן, אוסף התבניות

הבילינאריות על $V \times W$ הוא מרחב וקטורי מעל F ביחס לפעולות הנ"ל. נסמנו $\text{Bil}(V, W)$.

משפט 12.3: יהיו $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_m)$ בסיס של V ו- $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_n)$ בסיס של W . לכל $f \in \text{Bil}(V, W)$ נתאים מטריצה $A = \theta(f) \in M_{m \times n}(F)$ על ידי

$$(A)_{ij} = f(v_i, w_j) \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n \quad (1)$$

(א) לכל $v \in V, w \in W$ מתקיים

$$f(v, w) = ([v]_{\mathcal{B}})^t A[w]_{\mathcal{C}} \quad (2)$$

(ב) תהי $A \in M_{m \times n}(F)$. נגדיר $f: V \times W \rightarrow F$ על ידי (2). אז f תבנית בלינארית ו- $A = \theta(f)$.

(ג) התאמה $f \mapsto A$ הנ"ל היא איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים $\theta: \text{Bil}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(F)$.

הוכחה: (א) נניח $v = \sum_{i=1}^m x_i v_i, w = \sum_{j=1}^n y_j w_j$ אז

$$f(v, w) = f\left(\sum_{i=1}^m x_i v_i, \sum_{j=1}^n y_j w_j\right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j f(v_i, w_j)$$

$$([v]_{\mathcal{B}})^t A[w]_{\mathcal{C}} = (x_1, \dots, x_m) A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i (A)_{ij} y_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j f(v_i, w_j)$$

(ב) קל לראות ש- f תבנית בלינארית. לפי (2), $(A)_{ij} = f(v_i, w_j) = ([v_i]_{\mathcal{B}})^t A[w_j]_{\mathcal{C}} = \mathbf{e}_i^t A \mathbf{e}_j = (A)_{ij}$.

לכן $\theta(f) = A$

(ג) לפי (ב), θ על. נראה שהיא לינארית וחד-חד ערכית.

טענה: θ לינארית. תהיינה $f, g \in \text{Bil}(V, W)$ ותהיינה $A = \theta(f), B = \theta(g)$. יהי $\alpha \in F$. אז

$$(f + g)(v_i, w_j) = f(v_i, w_j) + g(v_i, w_j) = (A)_{ij} + (B)_{ij} = (A + B)_{ij}$$

$$(\alpha f)(v_i, w_j) = \alpha f(v_i, w_j) = \alpha (A)_{ij} = (\alpha A)_{ij}$$

כלומר, $\theta(\alpha f) = \alpha A, \theta(f + g) = A + B$.

טענה: θ חד-חד ערכית. אם $\theta(f) = \theta(g) = A$ אז לפי (א) מתקיים לכל $v \in V, w \in W$

$$f(v, w) = ([v]_{\mathcal{B}})^t A[w]_{\mathcal{C}} = g(v, w)$$

לכן $f = g$. ■

מסקנה 12.4: (א) $\dim \text{Bil}(V, W) = \dim V \cdot \dim W$

(ב) $\dim \text{Bil}(V, V) = (\dim V)^2$

משפט 12.5: יהיו $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ שני בסיסים של V ויהיו $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ שני בסיסים של W . תהי A המטריצה המתאימה ל- f לפי הבסיסים \mathcal{B}, \mathcal{C} , ותהי A' המטריצה המתאימה ל- f לפי הבסיסים $\mathcal{B}', \mathcal{C}'$. אז $A' = P^t A Q$, כאשר P מטריצת המעבר מ- \mathcal{B} ל- \mathcal{B}' , ו- Q מטריצת המעבר מ- \mathcal{C} ל- \mathcal{C}' .

הוכחה: נזכור שמתקיים $[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{B}'}$ לכל $v \in V$, ובאותו אופן $[w]_{\mathcal{C}} = Q[w]_{\mathcal{C}'}$ לכל $w \in W$. לכן לפי (2)

$$f(v, w) = ([v]_{\mathcal{B}})^t A [w]_{\mathcal{C}} = (P[v]_{\mathcal{B}'})^t A (Q[w]_{\mathcal{C}'}) = ([v]_{\mathcal{B}'})^t P^t A Q [w]_{\mathcal{C}'}$$

מכאן, לפי משפט 12.3 (ב), $A' = P^t A Q$. ■

הגדרה 12.6: מטריצות $A, A' \in M_{m \times n}(F)$ נקראות **שקולות** אם יש $P \in M_m(F), Q \in M_n(F)$ הפיכות כך ש- $A' = P^t A Q$.

מטריצות ריבועיות $A, A' \in M_n(F)$ נקראות **חופפות** אם יש $P \in M_n(F)$ הפיכה כך ש- $A' = P^t A P$. ■

מסקנה 12.7: (א) $A, A' \in M_{m \times n}(F)$ שקולות אם ורק אם הן מייצגות אותה תבנית בילינארית (כ"א ביחס לבסיס מתאים).

(ב) $A, A' \in M_{m \times n}(F)$ שקולות אם ורק אם $\text{rk } A = \text{rk } A'$.

(ג) $A, A' \in M_n(F)$ חופפות אם ורק אם הן מייצגות אותה תבנית בילינארית על מרחב וקטורי V מממד n (כ"א ביחס לבסיס מתאים).

הוכחה: נוכיח רק (ג): לפי משפט 12.5, אם A מייצגת את f לפי בסיס \mathcal{B} ו- A' לפי בסיס \mathcal{B}' , אז $A' = P^t A P$, כאשר P מטריצת המעבר מ- \mathcal{B} ל- \mathcal{B}' . לכן A, A' חופפות.

להיפך, נניח $A' = P^t A P$, כאשר $P \in M_n(F)$ הפיכה. יהי \mathcal{B} בסיס כלשהו של V . אזי קיים בסיס יחיד

\mathcal{B}' של V כך ש- P מטריצת המעבר מ- \mathcal{B} ל- \mathcal{B}' . לפי משפט 12.3 יש $f \in \text{Bil}(V, V)$ כך שהמטריצה שלה לפי \mathcal{B}

היא A . לפי משפט 12.5, A' היא המטריצה של f לפי \mathcal{B}' . ■

תרגיל 12.8: חפיפה היא יחס שקילות. בפרט: אם A חופפת ל- B ו- B חופפת ל- C אז A חופפת ל- C .

טענה 12.9: תהינה $A, A' \in M_n(F)$ חופפות. אז $\text{rk } A' = \text{rk } A$ ו- $\det A' = c^2 \det A$ עבור איזה $0 \neq c \in F$.

הוכחה: לפי ההנחה קיימת $P \in M_n(F)$ הפיכה כך ש- $A' = P^t A P$. אז גם P^t הפיכה וכפל במטריצה הפיכה אינו משנה את הדרגה, לכן $\text{rk } A' = \text{rk } P^t A P = \text{rk } A$. כמו כן $\det A' = \det P^t \det A \det P =$

$(\det P)^2 \det A$. ■

תבניות בילינאריות סימטריות ותבניות ריבועיות.

הגדרה 12.10: תבנית $f \in \text{Bil}(V, V)$ נקראת **סימטרית** אם $f(v, w) = f(w, v)$ לכל $v, w \in V$. עבור f כזאת

הפונקציה $q: V \rightarrow F$, המוגדרת על ידי $q(v) = f(v, v)$, נקראת **תבנית ריבועית**. ■

למה 12.11: תהי $f \in \text{Bil}(V, V)$, יהי \mathcal{B} בסיס של V ותהי A המטריצה של f לפי \mathcal{B} . אזי f סימטרית אם ורק אם A סימטרית (כלומר, $A = A^t$).

הוכחה: נזכור שלפי ההגדרה $(A)_{ij} = f(v_i, v_j)$, לכל $1 \leq i, j \leq n$, באשר $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$.
אם f סימטרית, אז $(A)_{ij} = f(v_i, v_j) = f(v_j, v_i) = (A)_{ji} = (A^t)_{ij}$, לכן $A^t = A$.
אם A סימטרית, אז לפי (2)

$$f(w, v) = ([w]_{\mathcal{B}})^t A [v]_{\mathcal{B}} = \left(([w]_{\mathcal{B}})^t A [v]_{\mathcal{B}} \right)^t = ([v]_{\mathcal{B}})^t A^t [w]_{\mathcal{B}} = ([v]_{\mathcal{B}})^t A [w]_{\mathcal{B}} = f(v, w)$$

■

למה 12.12: תהי $f \in \text{Bil}(V, V)$ סימטרית. אזי

(א) (למת הקיטוב): $2f(v, w) = f(v + w, v + w) - f(v, v) - f(w, w)$, לכל $v, w \in V$.

(ב) אם $\text{char} F \neq 2$ ו- $f \neq 0$, אז יש $u \in V$ כך ש- $f(u, u) \neq 0$.

הוכחה: (א)

$$f(v + w, v + w) = f(v, v) + f(v, w) + f(w, v) + f(w, w) = f(v, v) + 2f(v, w) + f(w, w)$$

(ב) נניח בשלילה ש- $f(u, u) = 0$ לכל $u \in V$. לפי (א), $2f(v, w) = 0$ לכל $v, w \in W$. אבל $2 \neq 0$

ב- F , לכן $f(v, w) = 0$ לכל $v, w \in W$. מכאן $f = 0$, סתירה. ■

משפט 12.13: תהי $f \in \text{Bil}(V, V)$ סימטרית. אם $\text{char} F \neq 2$, קיים בסיס $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ של V , כך

$$f(u_i, u_j) = 0 \text{ לכל } i \neq j \text{ בפרט}$$

(א) המטריצה של f לפי \mathcal{B} היא אלכסונית $\text{Diag}(c_1, \dots, c_n)$, באשר $c_i = f(u_i, u_i)$ לכל i .

(ב) אם $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$, $w = \sum_{i=1}^n b_i v_i$, אז $f(v, w) = \sum_{i=1}^n a_i b_i c_i$.

הוכחה: טענות (א), (ב) נובעות מהטענה הראשונה לפי משפט 12.3.

נוכיח את קיום \mathcal{B} באינדוקציה על $\dim V = n$.

עבור $n = 1$ אין מה להוכיח. נניח כי $n > 1$. אם $f = 0$, נבחר \mathcal{B} כלשהו. אם $f \neq 0$, לפי הלמה יש

$$u_1 \in V \text{ כך ש-} c_1 = f(u_1, u_1) \neq 0 \text{ בפרט } u_1 \neq 0. \text{ נסמן } V_1 = \text{Sp}(u_1) \text{ ויהי}$$

$$V_2 = \{v \in V \mid f(u_1, v) = 0\}$$

ברור ש- V_2 תת מרחב של V (בדוק!).

טענה: $V = V_1 \oplus V_2$. אכן, יהי $v \in V$ כך ש- $v = v_1 + v_2$, באשר $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$. נראה שהצגה זו של v הינה יחידה: יש $a \in F$ כך ש- $au_1 = v_1$. אז

$$f(u_1, v) = f(u_1, au_1 + v_2) = af(u_1, u_1) + f(u_1, v_2) = ac_1 + 0 = ac_1$$

ומכאן $a = c_1^{-1}f(u_1, v)$ ולכן

$$v_1 = c_1^{-1}f(u_1, v)u_1, \quad v_2 = v - c_1^{-1}f(u_1, v)u_1 \quad (3)$$

מכאן היחידות.

קיום ההצגה: נגדיר v_1, v_2 על פי (3). אז $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ (בדוק!), ומתקיים $v = v_1 + v_2$.

כעת $\dim V = \dim V_1 + \dim V_2$, $\dim V = n-1$, $\dim V_1 = 1$, לכן $\dim V_2 = n-1$. הצמצום של f ל- V_2 היא תבנית בילינארית סימטרית על V_2 . לפי הנחת האינדוקציה קיים בסיס u_2, \dots, u_n של V_2 כך ש- $f(u_i, u_j) = 0$ לכל $i \neq j$. לפי הטענה, u_1, u_2, \dots, u_n בסיס של V , ולפי הגדרת V_2 מתקיים גם

$$\blacksquare \quad f(u_1, u_i) = f(u_i, u_1) = 0 \quad \text{לכל } i \neq 1$$

מסקנה 12.14: תהי $A \in M_n(F)$ סימטרית ו- $\text{char} F \neq 2$. אז A חופפת למטריצה אלכסונית.

הוכחה: יהי V מרחב וקטורי ממימד n ויהי \mathcal{B} בסיסו. לפי משפט 12.3 יש $f \in \text{Bil}(V, V)$ כך ש- A היא המטריצה של f לפי \mathcal{B} . לפי למה 12.11, f סימטרית. לפי משפט 12.13 יש בסיס \mathcal{B}' כך שהמטריצה A' לפיו היא אלכסונית. כיון ש- A, A' מייצגות אותה תבנית f , הן חופפות. \blacksquare

12.15 הגדרה: הדרגה $\text{rk } f$ של $f \in \text{Bil}(V, V)$ סימטרית היא הדרגה של המטריצה המייצגת את f לפי בסיס כלשהו של V . (ההגדרה טובה: המטריצות המייצגות את f לפי בסיסים שונים הן חופפות ולכן שוות דרגה.) \blacksquare

משפט 12.16: יהי V מרחב וקטורי מעל \mathbb{C} ותהי $f \in \text{Bil}(V, V)$ סימטרית. אז

$$(א) \quad \text{יש בסיס ל-} V \text{ כך שהמטריצה של } f \text{ לפיו היא מהצורה } D_r = \text{Diag}(\overbrace{1, \dots, 1}^r, 0, \dots, 0)$$

$$(ב) \quad r = \text{rk } f \text{ (ולכן נקבע על ידי } f).$$

הוכחה: (א) לפי משפט 11.13 יש בסיס u_1, \dots, u_n ל- V כך ש- $f(u_i, u_j) = 0$ עבור $i \neq j$. נסמן $c_i := f(u_i, u_i)$. בלי הגבלת הכלליות, אחרי סידור מחדש של אברי הבסיס, $c_{r+1}, \dots, c_n = 0$, $c_1, \dots, c_r \neq 0$. נגדיר בסיס אחר u'_1, \dots, u'_n של V על ידי $u'_i = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{c_i}}u_i & 1 \leq i \leq r \\ u_i & r < i \leq n \end{cases}$. אז ברור ש- $f(u'_i, u'_j) = 0$ לכל $i \neq j$ אם $1 \leq i \leq r$ אז

$$f(u'_i, u'_i) = f\left(\frac{1}{\sqrt{c_i}}u_i, \frac{1}{\sqrt{c_i}}u_i\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{c_i}}\right)^2 f(u_i, u_i) = \frac{1}{c_i}c_i = 1$$

ואם $r < i$ אז $f(u'_i, u'_i) = f(u_i, u_i) = c_i = 0$ לכן f מיוצגת לפי u'_1, \dots, u'_n על ידי D_r .
 ■ $\text{rk } f = \text{rk } D_r = r$ (ב)

מסקנה 12.17: (א) כל מטריצה סימטרית מעל \mathbb{C} חופפת למטריצה יחידה מהצורה D_r .
 (ב) תהיינה $A, B \in M_m(\mathbb{C})$ סימטריות. אז A, B חופפות $\Leftrightarrow \text{rk } A = \text{rk } B$.

הוכחה: (ב) \Leftarrow : טענה 12.9; \Rightarrow : נניח $\text{rk } A = \text{rk } B = r$. אז A, B חופפות ל- D_r , ולכן חופפות. ■

משפט 12.18: יהי V מרחב וקטורי מעל \mathbb{R} ותהי $f \in \text{Bil}(V, V)$ סימטרית. אז יש בסיס ל- V כך שהמטריצה של f לפיו היא אלכסונית. אם במטריצה זו p רכיבים חיוביים ו- q שליליים, אז יש בסיס ל- V כך שהמטריצה של f לפיו היא

$$D_{p,q} = \text{Diag}(\overbrace{1, \dots, 1}^p, \overbrace{-1, \dots, -1}^q, 0, \dots, 0)$$

הוכחה: לפי משפט 11.13 יש בסיס u_1, \dots, u_n ל- V כך ש- $f(u_i, u_j) = 0$ נסמן $c_i := f(u_i, u_i)$. המטריצה של f לפי בסיס זה היא אלכסונית: $\text{Diag}(c_1, \dots, c_n)$. בלי הגבלת הכלליות, אחרי סידור מחדש של אברי הבסיס,

$$c_1, \dots, c_p > 0, \quad c_{p+1}, \dots, c_{p+q} < 0, \quad c_{p+q+1} = \dots = c_n = 0$$

$$u'_i = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{c_i}} u_i & 1 \leq i \leq p \\ \frac{1}{\sqrt{-c_i}} u_i & p < i \leq p+q \\ u_i & p+q < i \leq n \end{cases}$$

נגדיר בסיס אחר u'_1, \dots, u'_n של V על ידי

אזי

- ברור ש- $f(u'_i, u'_j) = 0$ לכל $i \neq j$.
- אם $1 \leq i \leq p$ אז $f(u'_i, u'_i) = (\frac{1}{\sqrt{c_i}})^2 f(u_i, u_i) = 1$.
- אם $p < i \leq p+q$ אז $f(u'_i, u'_i) = (\frac{1}{\sqrt{-c_i}})^2 f(u_i, u_i) = -1$.
- ואם $p+q < i \leq n$ אז $f(u'_i, u'_i) = f(u_i, u_i) = 0$.

■ לכן המטריצה של f לפי בסיס זה היא $D_{p,q}$.

משפט 12.19 (משפט Sylvester): יהי V מרחב וקטורי מממד n מעל \mathbb{R} ותהי $f \in \text{Bil}(V, V)$ סימטרית. נניח ש- f מיוצגת לפי בסיס u_1, \dots, u_n על ידי מטריצה אלכסונית $D'_{p,q}$ בעלת p רכיבים חיוביים ו- q רכיבים שליליים, ולפי בסיס v_1, \dots, v_n על ידי מטריצה אלכסונית $D'_{s,t}$ בעלת s רכיבים חיוביים ו- t רכיבים שליליים. אז $p = s, q = t$.

הוכחה: $p + q = \text{rk } D'_{p,q} = \text{rk } f = \text{rk } D'_{s,t} = s + t$. לכן די להוכיח כי $p = s$.

נניח בשלילה כי, למשל, $p > s$. בלי הגבלת הכלליות $f(u_i, u_i) = (D'_{p,q})_{ii} > 0$ עבור $1 \leq i \leq p$ ו- $f(v_i, v_i) = (D'_{s,t})_{ii} \leq 0$ עבור $s < i \leq n$, אחרת נשנה את הסדר של האיברים בשני הבסיסים.

אז סדרה ב- V בת יותר מ- n אברים, ולכן תלויה לינארית מעל \mathbb{R} . לכן יש
 $a_1, \dots, a_p, b_{s+1}, \dots, b_n$, לא כולם 0, כך ש-

$$\sum_{i=1}^p a_i u_i + \sum_{i=s+1}^n b_i v_i = 0 \quad (4)$$

יתר על כן, מכאן נובע שיש $1 \leq i \leq p$ כך ש- $a_i \neq 0$. אכן, אחרת לפי (4), $\sum_{i=s+1}^n b_i v_i = 0$, ומכאן
 $b_{s+1} = \dots = b_n = 0$, כי v_{s+1}, \dots, v_n בלתי תלויים לינארית, סתירה. כעת,

$$f\left(\sum_{i=1}^p a_i u_i, \sum_{i=1}^p a_i u_i\right) = \sum_{i=1}^p a_i^2 f(u_i, u_i) > 0$$

כי $f(u_i, u_i) > 0$ לכל $1 \leq i \leq p$ ויש $1 \leq i \leq p$ כך ש- $a_i \neq 0$. מצד שני, לפי (4),

$$f\left(\sum_{i=1}^p a_i u_i, \sum_{i=1}^p a_i u_i\right) = f\left(-\sum_{i=s+1}^n b_i v_i, -\sum_{i=s+1}^n b_i v_i\right) = \sum_{i=s+1}^n b_i^2 f(v_i, v_i) \leq 0$$

כי $f(v_i, v_i) \leq 0$ לכל $s+1 \leq i \leq n$. סתירה. לכן $p = s$. ■

מסקנה 12.20: תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה סימטרית ממשית. אז

(א) A חופפת למטריצה יחידה מהצורה $D_{p,q}$.

(ב) אם A חופפת ל- $D_{p,q}$, נגדיר $\sigma(A) = p - q$ להיות הסיגנטורה של A . אז $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ סימטריות הינן חופפות אם ורק אם יש להן אותה הדרגה ואותה הסיגנטורה.

הגדרה 12.21: יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי מעל \mathbb{R} . תבנית $f \in \text{Bil}(V, V)$ סימטרית נקראת

- **חיובית (positive)** אם $f(v, v) \geq 0$ לכל $v \in V$;
- **חיובית גמורה (positive definite)** אם $f(v, v) > 0$ לכל $v \in V, v \neq 0$. ■

משפט 12.22: יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי מעל \mathbb{R} תהי $f \in \text{Bil}(V, V)$ סימטרית ותהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ המטריצה

של f לפי איזשהו בסיס \mathcal{B} של V . התנאי הבאים שקולים זה לזה:

- (1) f חיובית גמורה, כלומר $f(v, v) > 0$ לכל $v \in V, v \neq 0$.
- (2) A חופפת ל- $D = \text{Diag}(c_1, \dots, c_n)$, באשר $c_1, \dots, c_n > 0$.
- (3) A חופפת ל- I_n .

(4) $A = P^t P$, באשר $P \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה.

(5) $\sigma(A) = n$ (= הסיגנטורה של A).

(6) f היא מכפלה פנימית על V .

(7) כל שרשי f_A ב- \mathbb{C} הם ממשיים חיוביים.

הוכחה:

(1) \Leftrightarrow (2): יש בסיס u_1, \dots, u_n של V כך שהמטריצה D של f לפיו היא אלכסונית. נזכור שמתקיים $(D)_{ij} = f(u_i, u_j)$ לכל i, j . לכן $D = \text{Diag}(c_1, \dots, c_n)$, באשר, לפי (1), לכל i אף $c_i = f(u_i, u_i) > 0$.
 A, D מייצגות את f , לכן חופפות.

(2) \Leftrightarrow (3): f מיוצגת על ידי D לפי איזה בסיס u_1, \dots, u_n . גם $\frac{1}{\sqrt{c_1}}u_1, \dots, \frac{1}{\sqrt{c_n}}u_n$ בסיס של V , ו- f מיוצגת על ידי I_n לפיו. לכן D, I_n חופפות.

(3) \Leftrightarrow (1): יש בסיס u_1, \dots, u_n לפיו f מיוצגת על ידי I_n , כלומר, $f(u_i, u_j) = \delta_{ij}$. יהי $v \in V, v \neq 0$.
נאמר, $v = \sum_{i=1}^n a_i u_i$. אז יש i כך ש- $a_i \neq 0$. מכאן $f(v, v) = \sum_{i,j} a_i a_j \delta_{ij} = \sum_{i=1}^n a_i^2 > 0$.
(3) \Leftrightarrow (4): ברור, כי $P^t P = P^t I_n P$.

(3) \Leftrightarrow (5): לפי הגדרת הסיגנטורה, $\sigma(A) = n$ אם ורק אם A חופפת ל- I_n .

(1) \Leftrightarrow (6): לפי הגדרת מכפלה פנימית.

לבסוף, כדי להוכיח (2) \Leftrightarrow (7), נזכור ש- A סימטרית, לכן לפי מסקנה 11.24 יש $P \in M_n(\mathbb{R})$ אורתוגונית כך ש- $P^t A P = P^{-1} A P$ אלכסונית, נאמר, $D' = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. כעת, D', A דומות, לכן יש להן אותו פולינום אופייני, $f_A = f_{D'} = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n)$. אבל A, D' גם חופפות. לכן:

(2) \Leftrightarrow (7): D, D' חופפות, ולכן לפי משפט סילבסטר $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$.

(7) \Leftrightarrow (2): נקח $D = D'$. ■

סימון 12.23: עבור $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ נסמן

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ - & \cdots & - \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix} \in M_k(\mathbb{R}), \quad k = 1, \dots, n$$

■ מטריצות אלה (או הדטרמיננטות שלהן) נקראות המינורים הראשיים של A .

משפט 12.24: תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סימטרית נניח כי $\det A_1, \dots, \det A_n \neq 0$. אזי A חופפת ל- $D_{p,q}$, באשר q הוא מספר החלפות הסימן בסדרה $\det A_1, \det A_2, \dots, \det A_n$ ו- p הוא מספר אי החלפות הסימן סדרה זו.

הוכחה: נכתוב $A = (a_{ij})$.

1. אז $a_{11} = \det A_1 \neq 0$. נחסיר כפולות מתאימות של העמודה הראשונה מהעמודות האחרות ואחר כך נחסיר אותן הכפולות של השורה הראשונה מהשורות האחרות של A . פעולות אלה אינן משנות את $\det A_1, \dots, \det A_n$, ו- A תעבור למטריצה חופפת (כי פעולה אלמנטרית על העמודות מתאימה להכפלה במטריצה אלמנטרית P מימין, ופעולה מקבילה על השורות מתאימה להכפלה ב- P^t). לכן בלי הגבלת הכלליות

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

2. אז $a_{11}a_{22} = \det A_2 \neq 0$. בפרט $a_{22} \neq 0$. נחסיר כפולות מתאימות של העמודה השנייה מהעמודות שאחריה ואחר כך נחסיר אותן הכפולות של השורה השנייה מהשורות שמתחתיה של A . פעולות אלה אינן משנות את $\det A_1, \dots, \det A_n$ (וגם לא את השורה הראשונה ואת העמודה הראשונה של A), ו- A תעבור למטריצה חופפת. לכן בלי הגבלת הכלליות

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

3. באינדוקציה, בלי הגבלת הכלליות, $A = \text{Diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$, באשר $a_{11}, \dots, a_{nn} \neq 0$. לכן p הוא מספר החיוביים ו- q מספר השליליים בסדרה a_{11}, \dots, a_{nn} . אבל

$$\det A_{k-1}, \det A_k \iff \frac{\det A_k}{\det A_{k-1}} > 0 \iff a_{kk} > 0, \quad k = 1, \dots, n$$

■ (הגדרנו $\det A_0 = 1$, כדי שלמשוואה זו תהיה משמעות גם עבור $k = 1$). מכאן המסקנה.

תרגיל 12.25: תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סימטרית ויהי $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$. אז

$$\sigma(\alpha A) = \begin{cases} \sigma(A) & \alpha > 0 \\ -\sigma(A) & \alpha < 0 \end{cases} \quad (\text{א})$$

$$f_{\alpha A}(X) = \alpha^n f_A(\alpha^{-1}X) \quad (\text{ב})$$

בפרט, אם $f_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$, אז $f_{\alpha A}(X) = \prod_{i=1}^n (X - \alpha\lambda_i)$.

הוכחה: (א) לפי משפט 12.3 יש תבנית בילינארית f על \mathbb{R}^n כך שהמטריצה של f לפי הבסיס הסטנדרטי היא A . לפי למה 12.11, f סימטרית. לפי משפט 12.18 יש בסיס $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ של \mathbb{R}^n כך שהמטריצה של f לפי \mathcal{B} היא $D_{p,q}$.

כעת, המטריצות של αf לפי הבסיס הסטנדרטי ולפי \mathcal{B} הן αA ו- $\alpha D_{p,q}$, בהתאמה. אם $\alpha > 0$, אז $\alpha D_{p,q}$ אלכסונית, בעלת p רכיבים חיוביים ו- q רכיבים שליליים, לכן לפי משפט סילבסטר חופפת ל- $D_{p,q}$. לכן

$\sigma(\alpha A) = p - q = \sigma(A)$ אם $\alpha < 0$, אז $\alpha D_{p,q}$ אלכסונית, בעלת q רכיבים חיוביים ו- p רכיבים שליליים, לכן

לפי משפט סילבסטר חופפת ל- $D_{q,p}$. לכן $\sigma(\alpha A) = q - p = -\sigma(A)$.

■ $f_{\alpha A}(X) = \det(XI - \alpha A) = \alpha^n \det(\alpha^{-1}XI - A) = \alpha^n f_A(\alpha^{-1}X)$ (ב)

נספח זה מכיל חומר מאלגברה לינארית 1 אודות מטריצת מעבר.

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס שלו.

הגדרה 15.1: תהי $\mathcal{B}' = (v'_1, \dots, v'_n)$ סדרה של אברי V . אז $P = ([v'_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [v'_n]_{\mathcal{B}}) \in M_n(F)$ נקראת **מטריצת המעבר מ- \mathcal{B} ל- \mathcal{B}'** .

דוגמה 15.2: מטריצת המעבר מ- $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ ל- $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$ היא $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

תרגיל 15.3: תהי $P \in M_n(F)$. אז קיימת סדרה $\mathcal{B}' = (v'_1, \dots, v'_n)$ של אברי V כך ש- P היא מטריצת המעבר מ- \mathcal{B} ל- \mathcal{B}' .

פתרון: ההעתקה $v \mapsto [v]_{\mathcal{B}}$ היא על F^n . לכן לכל $1 \leq j \leq n$ קיים $v'_j \in V$ כך ש- $[v'_j]_{\mathcal{B}}$ היא העמודה ה- j של P . נגדיר $\mathcal{B}' = (v'_1, \dots, v'_n)$, אז P מטריצת המעבר מ- \mathcal{B} ל- \mathcal{B}' . ■

משפט 15.4: מטריצת המעבר מ- \mathcal{B} ל- \mathcal{B}' הפיכה אם ורק אם \mathcal{B} בסיס.

הוכחה: הוכחה: P הפיכה $\Leftrightarrow \dim(C(P)) = \text{rk } P = n \Leftrightarrow \dim(\text{Sp}([v'_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [v'_n]_{\mathcal{B}})) = n$

$\Leftrightarrow [v'_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [v'_n]_{\mathcal{B}}$ בסיס של F^n . (כאן $C(P)$ הוא מרחב העמודות של P .)

אך האיזומורפיזם $F^n \rightarrow V$ הנתון על ידי $v \mapsto [v]_{\mathcal{B}}$ וגם ההופכי שלו $F^n \rightarrow V$ מעתיקים בסיסים

לבסיסים. לכן $[v'_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [v'_n]_{\mathcal{B}}$ בסיס של $F^n \Leftrightarrow v'_1, \dots, v'_n$ בסיס של V . ■

טענה 15.5: יהי $\mathcal{B}' = (v'_1, \dots, v'_n)$ בסיס של V ויהי $v \in V$. אז $[v]_{\mathcal{B}'} = P[v]_{\mathcal{B}}$.

הוכחה: נניח תחילה ש- $v \in \mathcal{B}'$ או $v = v'_j$ אז $[v]_{\mathcal{B}'} = e_j$, לכן

$$P[v]_{\mathcal{B}'} = P e_j = \text{העמודה ה-} j \text{ של } P = [v]_{\mathcal{B}}$$

במקרה הכללי יש $a_1, \dots, a_n \in F$ כך ש- $v = \sum_{j=1}^n a_j v'_j$, אז, לפי המקרה הקודם,

$$P\left[\sum_{j=1}^n a_j v'_j\right]_{\mathcal{B}'} = P\left(\sum_{j=1}^n a_j [v'_j]_{\mathcal{B}'}\right) = \sum_{j=1}^n a_j P[v'_j]_{\mathcal{B}'} = \sum_{j=1}^n a_j [v'_j]_{\mathcal{B}} = \left[\sum_{j=1}^n a_j v'_j\right]_{\mathcal{B}}$$

כלומר, $P[v]_{\mathcal{B}'} = [v]_{\mathcal{B}}$. ■

הגדרה 13.1: שניונית (quadric) X במרחב \mathbb{R}^n היא קבוצה X של \mathbb{R}^n של $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ שהרכיבים x_1, \dots, x_n שלהם מקיימים משוואה מהצורה:

$$a + \sum_{i=1}^n 2b_i x_i + \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2a_{ij} x_i x_j = 0 \quad (1)$$

ו- a_{ij} לא כולם 0. אגף שמאל של המשוואה הוא פולינום כלשהו ממעלה שניה ב- x_1, \dots, x_n . (המקדמים 2 שרירותיים, תפקידם יתברר בהמשך.)

דוגמה 13.2: (א) משוואה $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0$ מתארת שניונית ב- \mathbb{R}^3 . זוהי סֶפֶרָה (פני כדור).

(ב) משוואה $(x_1 + x_2 + 1)(x_1 + x_2 - 1) = 0$ מתארת זוג ישרים ב- \mathbb{R}^2 (או זוג מישורים ב- \mathbb{R}^3).

(ג) משוואה $x_1 x_2 - 1 = 0$ מתארת היפרבולה במישור (או היפרבולואיד ב- \mathbb{R}^3). ■

הערה 13.3: שיטות רישום אחרות של שניוניות. אם X נתונה על ידי (1), נגדיר $a_{ji} = a_{ij}$ לכל $1 \leq i < j \leq n$, $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$, $u = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ אז A סימטרית, $A \neq 0$. את (1) אפשר לרשום כך (נזהה את $M_1(\mathbb{R})$ עם \mathbb{R}):

$$a + 2u^t v + v^t A v = 0 \quad (2)$$

A תקרא המטריצה המצומצמת של השניונית.

מטריצת הגושים $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ a & u^t \\ u & A \end{pmatrix} \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ תקרא המטריצה המורחבת של השניונית. גם היא

סימטרית. את (2) אפשר לרשום בעזרתה כך:

$$\cdot \begin{pmatrix} 1 \\ v \end{pmatrix}^t \tilde{A} \begin{pmatrix} 1 \\ v \end{pmatrix} = 0 \quad (3) \quad \blacksquare$$

דיון 13.4: פעולות על שניוניות. מטרתנו להגיע למשוואה פשוטה יותר של X על ידי סדרה של הפעולות הבאות:

(I) שינוי בסיס אורתונורמלי: נבחר בסיס אורתונורמלי \mathcal{B} של \mathbb{R}^n ונחליף את מערכת הצירים המקורית בזו שנתונה

על ידי \mathcal{B} . מטריצת המעבר $P \in M_n(\mathbb{R})$ מהבסיס הסטנדרטי ל- \mathcal{B} היא אורתוגונלית. אם $v' = [v]_{\mathcal{B}}$ אז

$$v = P v', \text{ ולכן (2) שקולה ל- } a + 2u^t P v' + (P v')^t A (P v') = 0 \text{ כלומר}$$

$$a + 2(P^t u)^t v' + (v')^t (P^t A P) v' = 0 \quad (2')$$

אגף שמאל הוא פולינום ממעלה שניה בקואורדינטות של v' . המטריצה המצומצמת של השניונית בקואורדינטות

החדשות היא $A' = P^t A P$, והמורחבת

$$\tilde{A}' = \begin{pmatrix} a & u^t P \\ P^t u & P^t A P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & u^t \\ u & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix} = \tilde{P}^t \tilde{A} \tilde{P}$$

באשר $\tilde{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix} \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ הפיכה.

(II) הזזת צירים: נזיז את ראשית הצירים ל- $w \in \mathbb{R}^n$. אם v'' הוא וקטור הקואורדינטות של v במערכת המוזזת, אז

$$(2) \text{ שקולה ל-} 0 = a + 2u^t(w + v'') + (w + v'')^t A(w + v'')$$

כלומר, $v'' = v - w$

$$(2'') \quad (a + 2u^t w + w^t A w) + 2(u + A w)^t v'' + v''^t A v'' = 0$$

זוהי שוב משוואה של שניונית, מהצורה (2), עם המטריצה המצומצמת A והמטריצה המורחבת

$$\begin{pmatrix} a + 2u^t w + w^t A w & u^t + w^t A \\ u + A w & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & w^t \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & u^t \\ u & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ w & I_n \end{pmatrix} = \tilde{P}^t \tilde{A} \tilde{P}$$

באשר $\tilde{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ w & I_n \end{pmatrix} \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ הפיכה (אך לא אורתוגונלית, אם $w \neq 0$).

(III) הכפלה בקבוע. נכפיל את המשוואה של השניונית בסקלר $c \in \mathbb{R}, c \neq 0$. המשוואה המתקבלת מתארת את X ,

והמטריצה המצומצמת והמורחבת שלה הן $c\tilde{A}, cA$. ■

מסקנה 13.5: ביצוע I, II מעביר את המשוואה של השניונית למשוואה בקואורדינטות אחרות, אבל הגדלים הבאים אינם

משתנים:

$$(1) \text{rk}(A), \text{rk}(\tilde{A})$$

$$(2) \sigma(A), \sigma(\tilde{A})$$

$$(3) \det \tilde{A}, \det A$$

$$(4) \text{ הערכים העצמיים של } A$$

הכפלה ב- $c \neq 0$ שומרת (1) ומכפילה את (4) ב- c . אם $c > 0$, היא שומרת גם (2), (3). אם $c < 0$, היא מכפילה (2) ב- -1 ,

$$\text{ו-} (3) \text{ ב-} (-1)^n, (-1)^{n+1} \text{, בהתאמה.}$$

למה 13.6: תהיינה $X, X' \in \mathbb{R}^n$ שניוניות ותהיינה \tilde{A}, \tilde{A}' המטריצות המורחבות שלהן, בהתאמה. אז X' מתקבלת

מ- X על ידי סדרה של פעולות מסוג I, II אם ורק אם $\tilde{A}' = \tilde{P}^t \tilde{A} \tilde{P}$, באשר $\tilde{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ w & P \end{pmatrix} \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ מטריצת

גושים, בה $P \in M_n(\mathbb{R})$ אורתוגונלית ו- $w \in \mathbb{R}^n$ עמודה.

הוכחה: " \Leftarrow ": בדיון לעיל ראינו שהתנאי מתקיים אם X' מתקבלת מ- X על ידי פעולה אחת. אכן, אם הפעולה מסוג

I, נקח P להיות מטריצת המעבר ו- $w = 0$; אם הפעולה מסוג II, ניקח $P = I_n$ ו- w וקטור ההזזה של הראשית.

אם $u \neq 0$, אז $\bar{u} = \begin{pmatrix} b_{r+1} \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n-r}$, $0 \neq \bar{u}$ יהי $\beta = \|\bar{u}\| > 0$. אז $\|\frac{1}{\beta}\bar{u}\| = 1$, לכן אפשר להשלים את $-\frac{1}{\beta}\bar{u}$ לבסיס אורתונורמלי של \mathbb{R}^{n-r} . לכן לפי משפט 11.13 יש $\bar{P} \in M_{n-r}(\mathbb{R})$ אורתוגונלית כך ש- $\frac{1}{\beta}\bar{u}$ היא העמודה הראשונה שלה, כלומר, $\bar{P} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\beta}\bar{u}$, מכאן $\bar{P}^t \bar{u} = \bar{P}^{-1} \bar{u} = \begin{pmatrix} -\beta \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ אז $P = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & \bar{P} \end{pmatrix}$ אורתוגונלית ומתקיים

$$P^t A P = A, \quad P^t u = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & \bar{P}^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \bar{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \bar{P}^t \bar{u} \end{pmatrix} = -\beta \mathbf{e}_{r+1}$$

לכן, אחרי פעולה מסוג I, בלי הגבלת הכלליות $u = 0$ או $u = -\beta \mathbf{e}_{r+1}$, באשר $\beta > 0$.

- אם $u = 0$, קיבלנו את (4) עם $\Phi = \alpha \in \mathbb{R}$.
- אם $u = -\beta \mathbf{e}_{r+1}$ ו- $a = 0$, קיבלנו את (4) עם $\Phi = 2\beta x_{r+1}$.
- אם $u = -\beta \mathbf{e}_{r+1}$ ו- $a \neq 0$, נגדיר $w = \frac{a}{2\beta} \mathbf{e}_{r+1}$ אז $Aw = 0$ ו-

$$a' = a + 2u^t w + w^t A w = a + 2(-\beta \mathbf{e}_{r+1})^t \frac{a}{2\beta} \mathbf{e}_{r+1} = a + 2(-\beta) \frac{a}{2\beta} \mathbf{e}_{r+1}^t \mathbf{e}_{r+1} = 0$$

לכן, אחרי שנעשה פעולה מסוג II עם w זה, בלי הגבלת הכלליות $a = 0$ (ושאר המרכיבים של המטריצה המורחבת של השניונית לא ישתנו).

- (ב) המטריצה המצומצמת של (4) היא $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_s, 0, \dots, 0)$. היא דומה ל- A . לכן:
- $s = r$ ו- $\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0$ הם הערכים העצמיים של A (על ריבוייהם).
- (ג) המטריצה המורחבת של (4) היא, לפי המקרים השונים של Φ ,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_s \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\alpha & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_s \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\alpha & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_s \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\beta \\ 0 & \lambda_1 & \cdots \\ -\beta & \cdots & \lambda_s \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| $\Phi = 0$ | $\Phi = \alpha > 0$ | $\Phi = \alpha < 0$ | $\Phi = 2\beta x_{r+1}$ |
| $\tilde{r} = r, r = s$ | $\tilde{r} = r + 1, r = s$ | $\tilde{r} = r + 1, r = s$ | $\tilde{r} = r + 2, r = s$ |
| $\tilde{\sigma} = ?$ (לא חשוב) | $\tilde{\sigma} = \sigma - 1$ | $\tilde{\sigma} = \sigma + 1$ | $\tilde{\sigma} = ?$ (לא חשוב) |
| | אם $\sigma \neq 0$ אז | אם $\sigma \neq 0$ אז | |
| | $ \tilde{\sigma} = \sigma - 1$ | $ \tilde{\sigma} = \sigma + 1$ | |

ומכאן, לפי מסקנה 13.5, (ג). (שתי השורות האחרונות נועדו בשביל המשפט הבא).

(א) יחידות: לפי (ב) נקבעים באופן יחיד $r, \lambda_1, \dots, \lambda_r$. לפי (ג) נקבע "הסוג" של Φ נותר רק להוכיח שאם

X יכולה לעבור

(i) לשניונית (4) עם $\Phi = \alpha$ וגם לשניונית (4) עם $\Phi = \alpha'$ אז $\alpha = \alpha'$;

(ii) לשניונית (4) עם $\Phi = -2\beta x_{r+1}$ וגם לשניונית (4) עם $\Phi = -2\beta' x_{r+1}$ אז $\beta = \beta'$.

תהינה \tilde{A}, \tilde{A}' המטריצות המורחבות של שתי השניוניות האלה. כיון שאפשר לעבור בפעולות מסוג I, II

מאחת לשנייה, לפי למה 13.6 יש $\tilde{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ w & P \end{pmatrix}$ עם $\tilde{P}^{-1} w = (w_1, \dots, w_n)^t \in \mathbb{R}^n$ ו- P^{-1} אורתוגונלית כך

ש- $\tilde{A}' = \tilde{P}^t \tilde{A} \tilde{P}$. נבדיל בין שני המקרים:

(i) $\tilde{A} = \begin{pmatrix} -\alpha & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}, \tilde{A}' = \begin{pmatrix} -\alpha' & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$ באשר $A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$. לכן

$$\begin{pmatrix} -\alpha' & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & w^t \\ 0 & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\alpha & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ w & P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha + w^t A w & w^t A P \\ P^t A w & P^t A P \end{pmatrix}$$

מכאן $P^t A w = 0$ ולכן $A w = 0$ (כי P^t הפיכה). לכן $w^t A w = 0$ מכאן $\alpha = \alpha'$.

(ii) $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & u^t \\ u & A \end{pmatrix}, \tilde{A}' = \begin{pmatrix} 0 & (u')^t \\ u' & A \end{pmatrix}$ באשר $u = -\beta e_{r+1}, u' = -\beta' e_{r+1}$ ו- A כמו

קודם. בלי הגבלת הכלליות $\beta' \leq \beta$ אז

$$\begin{pmatrix} 0 & (u')^t \\ u' & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & w^t \\ 0 & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & u^t \\ u & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ w & P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2u^t w + w^t A w & u^t P + w^t A P \\ P^t u + P^t A w & P^t A P \end{pmatrix}$$

מכאן $u' = P^t(u + A w)$. כיון ש- P^t אורתוגונלית, ההעתקה $v \mapsto P^t v$ היא אוניטרית (מסקנה 11.6). לפי

משפט 11.12 היא משמרת נורמה. לכן

$$\begin{aligned} (\beta')^2 &= \|u'\|^2 = \|u + A w\|^2 = \|-\beta e_{r+1} + (\lambda_1 w_1, \dots, \lambda_r w_r, 0, \dots, 0)^t\|^2 = \\ &= \|(\lambda_1 w_1, \dots, \lambda_r w_r, -\beta, 0, \dots, 0)^t\|^2 = \lambda_1^2 w_1^2 + \dots + \lambda_r^2 w_r^2 + \beta^2 \geq \beta^2 \end{aligned}$$

לכן $\beta' \geq \beta$. מכאן $\beta' = \beta$. ■

אם נרשה גם פעולה III (הכפלה בסקלר שונה מאפס) הערכים העצמיים של המטריצה המצומצמת לא יישמרו,

אך אפשר לקבל $\alpha = \pm 1$ או $\alpha = 0, \beta = 1$ (תיאור "מנורמל"):

משפט 13.8: תהי X שניונית. נסמן $r = \text{rk}(A), \sigma = \sigma(A), \tilde{r} = \text{rk}(\tilde{A}), \tilde{\sigma} = \sigma(\tilde{A})$.

(א) על ידי פעולות I, II, III לעיל אפשר להעביר את המשוואה של X למשוואה מהצורה

$$\lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_p x_p^2 + \lambda_{p+1} x_{p+1}^2 + \dots + \lambda_{p+q} x_{p+q}^2 = \Phi \quad (4')$$

$$p \geq 1, p \geq q \geq 0, \lambda_1, \dots, \lambda_p > 0 > \lambda_{p+1}, \dots, \lambda_{p+q} \quad \text{באשר} \quad (5')$$

ו- $\Phi = 0$ או $\Phi = \pm 1$ או $\Phi = 2x_{p+q+1}$.

יתר עלן, משוואה (4') – תחת תנאי (5') – היא יחידה במונן הבא:

$$; p - q = |\sigma|, p + q = r \quad (1b)$$

(2b) יש $\gamma \in \mathbb{R} \neq 0$ כך ש- $\gamma \lambda_1, \dots, \gamma \lambda_{p+q}, 0, \dots, 0$ הם הערכים העצמיים של A (על ריבוייהם);

$$\Phi = \begin{cases} 0 & \tilde{r} = r \\ +1 & \tilde{r} = r + 1, \quad \sigma \neq 0, \quad |\tilde{\sigma}| = |\sigma| - 1 \\ -1 & \tilde{r} = r + 1, \quad \sigma \neq 0, \quad |\tilde{\sigma}| = |\sigma| + 1 \\ \pm 1^*) & \tilde{r} = r + 1, \quad \sigma = 0 \\ 2x_{p+q+1} & \tilde{r} = r + 2 \end{cases} \quad (g)$$

*הערה: כאשר $\tilde{r} = r + 1, \sigma = 0$, אפשר להגיע לצורה (4') עם $\Phi = 1$ וגם עם $\Phi = -1$. אכן, אם ל- X משוואה

$$\lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_p x_p^2 + \lambda_{p+1} x_{p+1}^2 + \dots + \lambda_{2p} x_{2p}^2 = 1$$

אז גם המשוואה הבאה מתארת את X :

$$(-\lambda_{p+1})x_{p+1}^2 + \dots + (-\lambda_{2p})x_{2p}^2 + (-\lambda_1)x_1^2 + \dots + (-\lambda_p)x_p^2 = -1$$

ולאחר שינוי הסדר של אברי הבסיס היא מהצורה (4'). ■

הוכחת המשפט: (א) על ידי הכפלת המשוואה ב- -1 , אם צריך, אפשר להניח בלי הגבלת הכלליות ש- $\sigma(A) \geq 0$. (דבר זה אינו משנה את r ומחליף את σ ב- $|\sigma|$). לכן לפי המשפט הקודם אפשר לעבור על ידי פעולות I, II למשוואה (4) עם תנאי (5) ו- $\Phi = \alpha \in \mathbb{R}$ או $\Phi = 2\beta x_{p+q+1}$, $\beta > 0$. פעולות אלה אינן משנות את r ואת $\sigma \geq 0$. לכן $s = r$ ואם נסמן ב- p את מספר איברים החיוביים והשליליים בסדרת הערכים העצמיים $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, אז $\sigma \geq 0$ ו- $p - q = |\sigma| \geq 0$, לכן $p \geq q$. ו- $p + q = r \geq 1$, לכן $p \geq 1$. נכפיל את (4) בסקלר מתאים $\gamma \neq 0$, $\frac{1}{|\alpha|}$, אם $\Phi = \alpha \neq 0$ או $\frac{1}{\beta}$, אם $\Phi = 2\beta x_{p+q+1}$ ונקבל Φ כמבוקש.

(ב) פעולות I, II, III אינן משנות את $r, |\sigma|$ ואת סדרת הערכים העצמיים של A , עד כדי כפל בסקלר.

(ג) כמו במשפט הקודם. נבחן את המטריצה המורחבת של (4') לפי המקרים השונים של Φ . למעשה כבר

עשינו זאת שם. נזכור ש- $|\tilde{\sigma}|, |\sigma|$ נשמרים. ■

תרגיל 13.9: בסימונים של משפט 13.8 נניח $\det A \neq 0, \det \tilde{A} \neq 0$. אז

$$(א) \quad \tilde{r} = n + 1, r = n, \text{ ולכן } \Phi = +1 \text{ או } \Phi = -1.$$

נניח גם כי $\sigma(A) > 0$. הוכח:

$$(ב) \quad \det \tilde{A}, \det A \text{ שוות סימן, אז } \Phi = -1.$$

$$(ג) \quad \det \tilde{A}, \det A \text{ מנוגדות סימן, אז } \Phi = +1.$$

הוכחה: (ב), (ג) נחליף את העמודה הראשונה של \tilde{A} עם יתר העמודות ואחר כך נחליף את השורה הראשונה עם יתר השורות. על ידי כך נקבל מ- $\tilde{A} = \begin{pmatrix} a & u^t \\ u & A \end{pmatrix}$ מטריצה חופפת $\tilde{A}' := \begin{pmatrix} A & u \\ u^t & a \end{pmatrix}$ ובפרט בעלת אותה סיגנטורה וגם אותו סימן של דטרמיננטה. כיון ש- Φ נקבע לפי הסיגנטורות, אפשר להחליף את \tilde{A} ב- \tilde{A}' .
 סדרת המינורים הראשיים של \tilde{A}' היא סדרת המינורים הראשיים של A , בתוספת $\det \tilde{A}'$. לפי משפט 12.24, $\det \tilde{A}' = \det A$ אם $\sigma(\tilde{A}') = \sigma + 1$ ו- $\sigma(\tilde{A}') = \sigma - 1$ אם $\det \tilde{A}' = -\det A$ מנוגדות סימן. מכאן המסקנה לפי משפט 13.8. ■

הטבלה הבאה מתארת את הצורה הגיאומטרית של שניונות בעלת משוואה קנונית. באתרים

<http://en.wikipedia.org/wiki/Quadric>

<http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcIII/QuadricSurfaces.aspx>

מופיעים גם ציורים של חלק מצורות אלה.

טבלה של מיון שניוניות

מקרא: $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}, r = \text{rk}(A), \tilde{r} = \text{rk}(\tilde{A}), \sigma = \text{Sign}(A), \tilde{\sigma} = \text{Sign}(\tilde{A})$: שונים מאפס.

• ב- \mathbb{R}^3 :

| תיאור קנוני (מנורמל) | r | $ \sigma $ | \tilde{r} | $ \tilde{\sigma} $ | שם השניונית |
|--|-----|------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 + \gamma^2 z^2 = 0$ | 3 | 3 | 3 | 3 | נקודה |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 + \gamma^2 z^2 = 1$ | 3 | 3 | 4 | 2 | אליפסואיד |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 + \gamma^2 z^2 = -1$ | 3 | 3 | 4 | 4 | קבוצה ריקה |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 - \gamma^2 z^2 = 0$ | 3 | 1 | 3 | 1 | חרוט אליפטי |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 - \gamma^2 z^2 = 1$ | 3 | 1 | 4 | 0 | היפרבולואיד אליפטי בעל יריעה אחת |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 - \gamma^2 z^2 = -1$ | 3 | 1 | 4 | 2 | היפרבולואיד אליפטי בעל שתי יריעות |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 = 0$ | 2 | 2 | 2 | 2 | ישר |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 = 1$ | 2 | 2 | 3 | 1 | גליל אליפטי |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 = -1$ | 2 | 2 | 3 | 3 | קבוצה ריקה |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 = 2z$ | 2 | 2 | 4 | 2 | פרבולואיד אליפטי |
| $\alpha^2 x^2 - \beta^2 y^2 = 0$ | 2 | 0 | 2 | 0 | שני מישורים נחתכים |
| $\alpha^2 x^2 - \beta^2 y^2 = \pm 1$ | 2 | 0 | 3 | 1 | גליל היפרבולי |
| $\alpha^2 x^2 - \beta^2 y^2 = 2z$ | 2 | 0 | 4 | 0 | פרבולואיד היפרבולי |
| $\alpha^2 x^2 = 0$ | 1 | 1 | 1 | 1 | מישור (כפול) |
| $\alpha^2 x^2 = 1$ | 1 | 1 | 0 | 0 | שני מישורים מקבילים |
| $\alpha^2 x^2 = -1$ | 1 | 1 | 2 | 2 | קבוצה ריקה |
| $\alpha^2 x^2 = 2y$ | 1 | 1 | 3 | 1 | גליל פרבולי |

• ב- \mathbb{R}^2 :

| תיאור קנוני (מנורמל) | r | $ \sigma $ | \tilde{r} | $ \tilde{\sigma} $ | שם השניונית |
|--------------------------------------|-----|------------|-------------|--------------------|-------------------|
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 = 0$ | 2 | 2 | 2 | 2 | נקודה |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 = 1$ | 2 | 2 | 3 | 1 | אליפסה |
| $\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 = -1$ | 2 | 2 | 3 | 3 | קבוצה ריקה |
| $\alpha^2 x^2 - \beta^2 y^2 = 0$ | 2 | 0 | 2 | 0 | שני ישרים נחתכים |
| $\alpha^2 x^2 - \beta^2 y^2 = \pm 1$ | 2 | 0 | 3 | 1 | היפרבולה |
| $\alpha^2 x^2 = 0$ | 1 | 1 | 1 | 1 | ישר כפול |
| $\alpha^2 x^2 = 1$ | 1 | 1 | 0 | 0 | שני ישרים מקבילים |
| $\alpha^2 x^2 = -1$ | 1 | 1 | 2 | 2 | קבוצה ריקה |
| $\alpha^2 x^2 = 2y$ | 1 | 1 | 3 | 1 | פרבולה |

דוגמה 13.10: מה מתארת השניונית $-2 + 4x - 4y + 3x^2 + 2y^2 = 0$ ב- \mathbb{R}^2 ?

המטריצה המצומצמת שלה היא $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ והמורחבת $\tilde{A} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. בפרט

$\sigma(A) = 2 > 0$. כמו כן $\det A = 6 > 0$, $\det \tilde{A} = -8 < 0$, לכן לפי תרגיל 13.9, $\Phi = +1$, כלומר, אפשר להביא את השניונית לצורה

$$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 = 1, \quad \lambda_1, \lambda_2 > 0$$

זוהי משוואה של אליפסה. יתר על כן, $(\lambda_1 : \lambda_2) = (3 : 2)$.

דוגמה 13.11: מה מתארת השניונית $1 + 2z + 4xy - 4xz - 2x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 0$ ב- \mathbb{R}^3 ?

המטריצה המצומצמת שלה היא $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ והמורחבת $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

סדרת (הדטרמיננטות של) המינורים הראשיים של A היא $-2, -10, -8$, לכן $\sigma(A) = 2 - 1 = 1$. כמו

כן $\det A = -8 < 0$, $\det \tilde{A} = 2 > 0$, לכן לפי תרגיל 13.9, $\Phi = +1$, כלומר, אפשר להביא את השניונית לצורה

$$\alpha x^2 + \beta y^2 - \gamma z^2 = 1, \quad \alpha, \beta, \gamma > 0$$

זוהי היפרבולואיד אליפטי בעל יריעה אחת.

יהי F שדה. מטריצה מסדר $\sum_{k=1}^r m_k \times \sum_{k=1}^s n_k$ מעל F ניתן לחלק ל- $r \times s$ גושים: המטריצה נראית כך

$$\begin{matrix} & n_1 & n_2 & \dots & n_s \\ m_1 & \left(\begin{matrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1s} \end{matrix} \right) \\ m_2 & \left(\begin{matrix} A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2s} \end{matrix} \right) \\ \vdots & \left(\begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \right) \\ m_r & \left(\begin{matrix} A_{r1} & A_{r2} & \dots & A_{rs} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

באשר (המספרים משמאל ומעל למטריצה מסמנים את גדלי הגושים) $A_{ij} \in M_{m_i \times n_j}(F)$ לכל i, j . מטריצה שרשומה כך נקראת **מטריצה של גושים**.

משפט 14.1 (מכפלה של מטריצות של גושים): מכפלה של מטריצות גושים היא מטריצת גושים:

$$\begin{matrix} & p_1 & p_2 & \dots & p_s \\ m_1 & \left(\begin{matrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1s} \end{matrix} \right) \\ m_2 & \left(\begin{matrix} A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2s} \end{matrix} \right) \\ \vdots & \left(\begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \right) \\ m_r & \left(\begin{matrix} A_{r1} & A_{r2} & \dots & A_{rs} \end{matrix} \right) \end{matrix} \begin{matrix} & n_1 & n_2 & \dots & n_t \\ p_1 & \left(\begin{matrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1t} \end{matrix} \right) \\ p_2 & \left(\begin{matrix} B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2t} \end{matrix} \right) \\ \vdots & \left(\begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \right) \\ p_s & \left(\begin{matrix} B_{s1} & B_{s2} & \dots & B_{st} \end{matrix} \right) \end{matrix} = \begin{matrix} & n_1 & n_2 & \dots & n_t \\ m_1 & \left(\begin{matrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1t} \end{matrix} \right) \\ m_2 & \left(\begin{matrix} C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2t} \end{matrix} \right) \\ \vdots & \left(\begin{matrix} \dots & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \right) \\ m_r & \left(\begin{matrix} C_{r1} & C_{r2} & \dots & C_{rt} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

באשר $C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \dots + A_{is}B_{sj} = \sum_{k=1}^s A_{ik}B_{kj}$ לכל i, j .

הוכחה: כיון שהסימונים מסובכים (בגלל הרבה אינדקסים) נטפל קודם במקרה פרטי של מטריצות בעלות 2×2 גושים. במקרה זה אפשר לנסח את המשפט כך:

$$\begin{matrix} & p_1 & p_2 \\ m_1 & \left(\begin{matrix} A & B \end{matrix} \right) \\ m_2 & \left(\begin{matrix} C & D \end{matrix} \right) \end{matrix} \begin{matrix} & n_1 & n_2 \\ p_1 & \left(\begin{matrix} P & Q \end{matrix} \right) \\ p_2 & \left(\begin{matrix} R & S \end{matrix} \right) \end{matrix} = \begin{matrix} & n_1 & n_2 \\ m_1 & \left(\begin{matrix} AP + BR & AQ + BS \end{matrix} \right) \\ m_2 & \left(\begin{matrix} CP + DR & CQ + DS \end{matrix} \right) \end{matrix}$$

נוכיח נוסחה זו: תחילה נשים לב שהמכפלות $AP, BR, AQ, BS, CP, DR, CQ, DS$ מוגדרות וכן מוגדרים הסכומים $AP + BR, AQ + BS, CP + DR, CQ + DS$, והמטריצה בשני האגפים מאותו הסדר $(m_1 + m_2) \times (n_1 + n_2)$. נותר לבדוק שהרכיבים המתאימים בשני האגפים שווים.

למשל, נחשב את הרכיב ה- $(m_1 + i, j)$ בשני האגפים, כאשר $1 \leq i \leq m_2, 1 \leq j \leq n_1$. באגף שמאל רכיב זה מתקבל על ידי הכפלת השורה ה- $m_1 + i$ של $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ שהיא

$$((C)_{i1}, (C)_{i2}, \dots, (C)_{ip_1}, (D)_{i1}, (D)_{i2}, \dots, (D)_{ip_2})$$

בעמודה ה- j של $\begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$ שהיא

$$((P)_{1j}, (P)_{2j}, \dots, (P)_{p_1 j}, (R)_{1j}, (R)_{2j}, \dots, (R)_{p_2 j})^t$$

מכפלתן היא

$$(C)_{i1}(P)_{1j} + (C)_{i2}(P)_{2j} + \dots + (C)_{ip_1}(P)_{p_1 j} + (D)_{i1}(R)_{1j} + (D)_{i2}(R)_{2j} + \dots + (D)_{ip_2}(R)_{p_2 j} = (CP)_{ij} + (DR)_{ij} = (CP + DR)_{ij}$$

וזה בדיוק הרכיב ה- $(m_1 + i, j)$ באגף ימין. בזאת הסתיימה ההוכחה של המקרה הפרטי.

המקרה הכללי דומה: תחילה נשים לב שהמכפלות $A_{ik}B_{kj}$ מוגדרות וכן מוגדרים הסכומים $\sum_{k=1}^s A_{ik}B_{kj}$ והמטריצות בשני האגפים מאותו הסדר $(m_1 + m_2 + \dots + m_r) \times (n_1 + n_2 + \dots + n_t)$. נותר לבדוק שהרכיבים המתאימים בשני האגפים שווים.

למשל, נחשב את הרכיב ה- $(m_1 + i, j)$ בשני האגפים, כאשר $1 \leq i \leq m_2, 1 \leq j \leq n_1$. באגף שמאל רכיב זה מתקבל על ידי הכפלת השורה ה- $m_1 + i$ של המטריצה (A_{ij}) שהיא

$$((A_{21})_{i1}, (A_{21})_{i2}, \dots, (A_{21})_{ip_1}, \dots, (A_{2s})_{i1}, (A_{2s})_{i2}, \dots, (A_{2s})_{ip_s})$$

בעמודה ה- j של המטריצה (B_{ij}) שהיא

$$((B_{11})_{1j}, (B_{11})_{2j}, \dots, (B_{11})_{p_1 j}, \dots, (B_{s1})_{1j}, (B_{s1})_{2j}, \dots, (B_{s1})_{p_s j})^t$$

מכפלתן היא

$$(A_{21})_{i1}(B_{11})_{1j} + (A_{21})_{i2}(B_{11})_{2j} + \dots + (A_{21})_{ip_1}(B_{11})_{p_1 j} + \dots + (A_{2s})_{i1}(B_{s1})_{1j} + (A_{2s})_{i2}(B_{s1})_{2j} + \dots + (A_{2s})_{ip_s}(B_{s1})_{p_s j} = \sum_{k=1}^{p_1} (A_{21})_{ik}(B_{11})_{kj} + \dots + \sum_{k=1}^{p_s} (A_{2s})_{ik}(B_{s1})_{kj}$$

■ וזה בדיוק הרכיב ה- $(m_1 + i, j)$ של המטריצה (C_{ij}) .

מסקנה 14.2: תהינה $A \in M_{m \times p}(F)$, $B \in M_{p \times n}(F)$, תהינה A_1, \dots, A_p העמודות של A , ו- B_1, \dots, B_p השורות של B . אז

$$AB = (A_1, \dots, A_p) \begin{pmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_p \end{pmatrix} = \left(\sum_{k=1}^p A_k B_k \right) \in M_{m \times n}(F)$$

הוכחה: הפעל את המשפט עם $r = 1, s = p, t = 1, p_1 = \dots = p_s = 1$.

תרגיל 14.3: תהינה $v_1, \dots, v_n \in F^m$ העמודות של $A \in M_{m \times n}(F)$, ויהי $c_1, \dots, c_n \in F$. אז

$$A \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

הוכחה: לפי המסקנה, אגף ימין שווה למטריצה $v_1(c_1) + \dots + v_n(c_n)$. כעת רק צריך לשים לב ש- $v_i(c_i) = c_i v_i$.
 לכל i ($v_i(c_i)$ הוא מטריצה מסדר $m \times 1$, מכפלת המטריצה v_i מסדר $m \times 1$ במטריצה (c_i) מסדר 1×1).

תרגיל 14.4: תהינה $A \in M_{m \times n}(F)$ ו- $P \in M_m(F)$. תהינה $A_1, \dots, A_m \in F^n$ השורות של A . אז השורות של PA הן

$$(P)_{i1}A_1 + (P)_{i2}A_2 + \dots + (P)_{im}A_m = \sum_{k=1}^m (P)_{ik}A_k, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

הוכחה: לפי המשפט,

$$PA = \begin{pmatrix} (P)_{11} & \dots & (P)_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ (P)_{m1} & \dots & (P)_{mm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^m (P)_{1k}A_k \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^m (P)_{mk}A_k \end{pmatrix}$$

תרגיל 14.5: הוכח כי מטריצת הגושים $M = \begin{pmatrix} m & n \\ A & B \\ n & 0 & D \end{pmatrix}$ הפיכה אם ורק אם A, D הפיכות ואם זה קורה אז

$$N = \begin{pmatrix} m & n \\ A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ n & 0 & D^{-1} \end{pmatrix} \text{ ההופכי שלה.}$$

בפרט, $M_0 = \begin{pmatrix} m & n \\ A & 0 \\ n & 0 & D \end{pmatrix}$ הפיכה אם ורק אם A, D הפיכות ואז $M_0^{-1} = \begin{pmatrix} m & n \\ A^{-1} & 0 \\ n & 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$

הוכחה: אם M הפיכה אז $M^{-1} = \begin{matrix} m & n \\ m & n \end{matrix} \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$ ומתקיים $I_{m+n} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$, כלומר, לפי המשפט,

$$\begin{pmatrix} AP + BR & AQ + BS \\ DR & DS \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

מכאן

$$AP + BR = I_m, DS = I_n, DR = 0, AQ + BS = 0$$

מתוך $DS = I_n$ נסיק ש- D הפיכה ו- $S = D^{-1}$. מכאן, מתוך $DR = 0$, נסיק ש- $R = D^{-1}(DR) = 0$.
 לכן $AP + BR = I_m$ הופך להיות ל- $AP = I_m$ ומכאן נסיק ש- A הפיכה ו- $P = A^{-1}$. לבסוף, מתוך $AQ + BS = 0$ נסיק כי $Q = -A^{-1}BS = -A^{-1}BD^{-1}$.
 להיפך, אם A, D מטריצות הפיכות, אז לפי המשפט, $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix} = I_{m+n}$

$$\blacksquare \quad M^{-1} = N \text{ הפיכה ו-} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = I_{m+n}$$

תרגיל 14.6: הוכח כי מטריצת הגושים $M = \begin{matrix} n & m \\ m & n \end{matrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix}$ הפיכה אם ורק אם B, C הפיכות ואם זה קורה אז

$$N = \begin{matrix} m & n \\ n & m \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}AC^{-1} \end{pmatrix} \text{ ההופכי שלה.}$$

$$M_0 = \begin{matrix} m & n \\ m & n \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ B^{-1} & 0 \end{pmatrix} \text{ הפיכה אם ורק אם } B, C \text{ הפיכות ואז } M_0^{-1} = \begin{matrix} n & m \\ m & n \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \text{ בפרט,}$$

הוכחה: כמו בתרגיל הקודם. יש לשים לב שסדרי הגושים של N שונים מהסדרים של הגושים ב- M , אך המכפלה

MN מוגדרת ומתאימה לתנאי המשפט. \blacksquare

$$\text{תרגיל 14.7: הוכח כי } \begin{matrix} m & n \\ m & n \end{matrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \text{ דומה למטריצה } \begin{matrix} n & m \\ m & n \end{matrix} \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

הוכחה: לפי תרגיל 14.6, הפיכה ו- ההופכי שלה. לפי המשפט

$$n \begin{pmatrix} m & n \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \quad m \begin{pmatrix} n & m \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$$

$$n \begin{pmatrix} m & n \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \quad m \begin{pmatrix} m & n \\ A & 0 \end{pmatrix} \quad m \begin{pmatrix} n & m \\ 0 & I_m \end{pmatrix} = n \begin{pmatrix} n & m \\ D & 0 \end{pmatrix} \\ m \begin{pmatrix} m & n \\ I_m & 0 \end{pmatrix} \quad n \begin{pmatrix} m & n \\ 0 & D \end{pmatrix} \quad n \begin{pmatrix} n & m \\ I_n & 0 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} n & m \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

■